

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Strepsils Zuckerfrei Erdbeere 1,2mg/0,6mg Lutschtabletten

Dichlorobenzylalkohol und Amylmetacresol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Strepsils Zuckerfrei Erdbeere und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Strepsils Zuckerfrei Erdbeere beachten?
3. Wie ist Strepsils Zuckerfrei Erdbeere anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Strepsils Zuckerfrei Erdbeere aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Strepsils Zuckerfrei Erdbeere und wofür wird es angewendet?

- Strepsils sind desinfizierende Lutschtabletten die langsam im Mund zergehen. Ferner sind erhältlich: Strepsils Honig & Zitrone, Strepsils Zuckerfrei Zitrone, Strepsils Vit C Apfelsine und Strepsils Cool Mint, Lutschtabletten.
Strepsils + Lidocaine ist als Lutschtabletten und als Halsspray erhältlich.
- Strepsils wird zur Linderung der Symptome von akuten Halsschmerzen angewendet. Strepsils kann auch als ergänzende örtliche Behandlung von Rachenentzündung, Mandelentzündung und Entzündung der Mundschleimhäute (Zahnfleischentzündung, Aphthen) angewendet werden.

Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Strepsils Zuckerfrei Erdbeere beachten?

Strepsils darf nicht angewendet werden:

- Von Kindern unter 5 Jahren.
- Wenn Sie allergisch gegen Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- bei Halsschmerzen, die länger als 3 bis 4 Tage dauern und/oder zusammen mit Fieber auftreten; wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Arzt;
- wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, sollten Sie auch den Abschnitt „Anwendung von Strepsils zusammen mit anderen Arzneimitteln“ lesen.

- Dieses Arzneimittel ist nicht geeignet für kleine Kinder wegen der Erstickengefahr.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt, wenn einer der oben angegebenen Hinweise auf Sie zutrifft oder in der Vergangenheit zugetroffen hat.

Anwendung von Strepsils zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Strepsils hat keine Wechselwirkungen mit Antibiotika; deshalb ist ein gleichzeitiger Gebrauch möglich.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Es gibt keine oder nur begrenzten Daten über die Anwendung dieses Arzneimittels während dieser Perioden. So Strepsils ist nicht für den Einsatz während der Schwangerschaft und Stillzeit empfohlen.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Wegen der Eigenschaften dieses Produkts ist es unwahrscheinlich, dass Strepsils Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen hat.

Strepsils enthält Natrium, Maltitol und Isomalt

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Dosis, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

Strepsils enthält Maltitol und Isomalt. Bitte nehmen Sie erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Kann eine leicht abführende Wirkung haben. Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g Maltitol (oder Isomalt).

Dieses Arzneimittel enthält den Duft Benzylalkohol. Benzylalkohol kann allergische Reaktionen hervorrufen.

3. Wie ist Strepsils Zuckerfrei Erdbeere anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die niedrigste wirksame Dosis sollte für möglichst kurze Zeit verwendet werden, die notwendig ist, um die Symptome zu lindern.

Da Halsschmerzen wird auch empfohlen, kann ein Zeichen für andere schwere Krankheiten sein, die Pastillen zu verwenden, um mehr als 3 oder 4 Tage ohne ärztlichen Rat.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene

Alle 2 bis 3 Stunden eine Lutschtablette langsam in Mund zergehen lassen.

Höchstens 6 Lutschtabletten pro Tag (24 Stunden).

Kindern

Kinder ab 15 Jahren: siehe Erwachsene

Kinder ab 8 bis 15 Jahre: 1 Lutschtablette 4 x täglich

Kinder von 5 bis 7 Jahre - 1 Lutschtablette 3 x täglich

Ältere Personen

Eine Dosisanpassung ist bei älteren Personen nicht erforderlich.

Wenn Sie eine größere Menge von Strepsils angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel Strepsils angewendet haben, verständigen Sie unverzüglich Ihren Arzt, Apotheker oder den Giftnotruf (070/245.245).

Eine Überdosierung dürfte keine weiteren Probleme als Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen.

Angesichts der Form, des niedrigen Gehalts an arzneilich wirksamen Bestandteilen und der Unschädlichkeit des Arzneimittels ist das Auftreten von Problemen praktisch ausgeschlossen.

Die Behandlung ist symptomatisch

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Frequenz nicht bekannt

- Überempfindlichkeit.
- Bauchschmerzen, Übelkeit, Mundbeschwerden wie Brenngefühl oder prickelndes Gefühl in Mund oder Rachen und eine Schwellung von Mund oder Rachen.
- Ausschlag

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen.

Belgien :

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Abteilung Vigilanz, Postfach 97, 1000 BRÜSSEL, Madou, Website: www.notifieruneffetindesirable.be, e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg:

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél.: (+352) 2478 5592, e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu
Link pour le formulaire : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Strepsils Zuckerfrei Erdbeere aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen Strepsils nach dem auf dem Blisterpackung und dem Umkarton nach „exp“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Strepsils Zuckerfrei Erdbeere enthält

- Die Wirkstoffe sind: 1,2 mg Dichlorbenzylalkohol und 0,6 mg Amylmetacresol.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Erdbeeraroma, Antho P-WS rosa (E163), Saccharin-Natrium, Weinsäure, Maltitol-Lösung und Isomalt.

Wie Strepsils aussieht und Inhalt der Packung

Strepsils Zuckerfrei Erdbeere sind runde rosa Lutschtabletten erhältlich in Alu/PVC/PVdC-Blisterpackungen zu 24 und 36 Lutschtabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer

Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA,
Researchdreef 20, B-1070 Brussel

Hersteller

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Nottingham Site,
Thane Road, Nottingham NG90 2DB, United Kingdom
oder

Reckitt Benckiser NL Brands B.V., Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande

Zulassungsnummer:

BE094412

Verkaufsabgrenzung

Arzneimittel, das nicht der Verschreibungspflicht unterliegt.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 10/2021