GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Strepsils Honig & Zitrone 1,2mg/0,6mg Lutschtabletten

Dichlorobenzylalkohol und Amylmetacresol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht
1. Was ist Strepsils Honig & Zitrone und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Strepsils Honig & Zitrone beachten?
3. Wie ist Strepsils Honig & Zitrone Lutschtabletten anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Strepsils Honig & Zitrone aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Strepsils Honig & Zitrone und wofür wird es angewendet ?
- Strepsils sind desinfizierende Lutschtabletten die langsam im Mund zergehen. Ferner sind erhältlich: Strepsils Zuckerfrei Erdbeere, Strepsils Zuckerfrei Zitrone, Strepsils Vit C Apfelsine und Strepsils Cool Mint, Lutschtabletten.
  Strepsils + Lidocaïne ist als Lutschtabletten und als Halsspray erhältlich.
- Strepsils wird zur Linderung der Symptome von akuten Halsschmerzen angewendet. Strepsils kann auch als ergänzende örtliche Behandlung von Rachenentzündung, Mandelentzündung und Entzündung der Mundschleimhäute (Zahnfleischentzündung, Aphthen) angewendet werden.

Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Strepsils Honig & Zitrone beachten?
Strepsils darf nicht angewendet werden
- Von Kindern unter 5 Jahren.
- Wenn Sie allergisch gegen Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
- bei Halsschmerzen, die länger als 3 bis 4 Tage dauern und/oder zusammen mit Fieber auftreten; wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Arzt;
- wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, sollten Sie auch den Abschnitt „Anwendung von Strepsils zusammen mit anderen Arzneimitteln“ lesen.
- Dieses Arzneimittel ist nicht geeignet für kleine Kinder wegen der Erstickungsgefahr

Bitte informieren Sie Ihren Arzt, wenn einer der oben angegebenen Hinweise auf Sie zutrifft oder in der Vergangenheit zugetroffen hat.

Anwendung von Strepsils zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden. Strepsils hat keine Wechselwirkungen mit Antibiotika; deshalb ist ein gleichzeitiger Gebrauch möglich.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit
Es gibt keine oder nur begrenzte Daten über die Anwendung dieses Arzneimittels während dieser Perioden. So Strepsils ist nicht für den Einsatz während der Schwangerschaft und Stillzeit empfohlen.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Wegen der Eigenschaften dieses Produkts ist es unwahrscheinlich, dass Strepsils Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen hat.

Strepsils enthält Glucose und Saccharose
Dieses Arzneimittel enthält pro Lutschtablette ; 0.98 g Glucose und 1.44 g Sucrose. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.Bitte nehmen sie dieses arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoffe mit Citral, Geraniol, d-Limonen und Linalool. Citral, Geraniol, d-Limonen und Linalool können allergische Reaktionen hervorrufen.

3. Wie ist Strepsils Honig & Zitrone anzuwenden?
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die niedrigste wirksame Dosis sollte für möglichst kurze Zeit verwendet werden, die notwendig ist, um die Symptome zu lindern.

Da Halsschmerzen wird auch empfohlen, kann ein Zeichen für andere schwere Krankheiten sein, die Pastillen zu verwenden, um mehr als 3 oder 4 Tage ohne ärztlichen Rat.

Die empfohlene Dosis beträgt
Erwachsene .
Alle 2 bis 3 Stunden eine Lutschtablette langsam in Mund zergehen lassen.
Höchstens 6 Lutschtabletten pro Tag (24 Stunden).

Kindern
Kinder ab 15 Jahren: siehe Erwachsene
Kinder ab 8 bis 15 Jahre: 1 Lutschtablette 4 x täglich

Kinder ab 5 bis 7 Jahre: 1 Lutschtablette 3 x täglich

Ältere Personen
Eine Dosisanpassung ist bei älteren Personen nicht erforderlich.

Wenn Sie eine größere Menge von Strepsils angewendet haben, als Sie sollten
Wenn Sie zu viel Strepsils angewendet haben, verständigen Sie unverzüglich Ihren Arzt, Apotheker oder den Giftnotruf (070/245.245).

Eine Überdosierung dürfte keine weiteren Probleme als Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen.

Angesichts der Form, des niedrigen Gehalts an arzneilich wirksamen Bestandteilen und der Unschädlichkeit des Arzneimittels ist das Auftreten von Problemen praktisch ausgeschlossen.

Die Behandlung ist symptomatisch.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Frequenz nicht bekannt

- Überempfindlichkeit in Form von Hautausschlag; Schnelle Schwellung unter der Haut in Bereichen wie Gesicht, Hals, Armen und Beinen, die lebensbedrohlich sein kann, wenn die Schwellung des Halses die Atemwege blockiert; juckender Ausschlag; Übermäßige Kontraktion der Atemwegsmuskulatur, die zu Atembeschwerden und niedrigem Blutdruck mit Ohnmacht führt.
- Bauchschmerzen, Übelkeit, Mundbeschwerden wie Brenngefühl oder prickelndes Gefühl in Mund oder Rachen und eine Schwellung von Mund oder Rachen.
- Ausschlag

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen.
Belgien :
Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
www.afmps.be
Abteilung Vigilanz
Website www.notifieruneffetindesirable.be
E-Mail: adr@fagg-afmps.be
Luxemburg:
Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél.: (+352) 2478 5592, e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu
Link pour le formulaire :
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Strepsils Honig & Zitrone aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern.
Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen Strepsils nach dem auf dem Blisterpackung oder dem Tube und dem Umkarton nach „exp“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Strepsils Honig & Zitrone enthält

- Die Wirkstoffe sind: 1,2 mg Dichlorbenzylalkohol und 0,6 mg Amylmetacresol.
- Die sonstigen Bestandteile sind: terpenfreies Citronenöl, Honig, Pfefferminzöl, Weinsteinsäure, flüssige Saccharose und Glucose.

Wie Strepsils aussieht und Inhalt der Packung

Strepsils Honig & Zitrone sind runde Lutschtabletten erhältlich in Alu/PVC/PVdC-Blisterpackungen zu 24 und 36 Lutschtabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer

Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) SA/NV
Industrielaan 13B
1070 Brussel

Hersteller

Reckitt Benckiser NL Brands B.V., Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande

Zulassungsnummer:

BE147506, LU 2006078948

Verkaufsabgrenzung

Arzneimittel, das nicht der Verschreibungspflicht unterliegt.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 11/2025