

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

### Strepsils Suikervrij Aardbei 1,2mg/0,6mg zuigtabletten dichlorobenzylalcohol en amylmetacresol

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 à 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Wat is **Strepsils Suikervrij Aardbei** en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u **Strepsils Suikervrij Aardbei** niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u **Strepsils Suikervrij Aardbei**?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u **Strepsils Suikervrij Aardbei**?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Strepsils Suikervrij Aardbei en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

- Strepsils zijn ontsmettende zuigtabletten die langzaam in de mond oplossen  
Ook verkrijgbaar zijn Strepsils Honing & Citroen, Strepsils Suikervrij Citroen, Strepsils Vit C Sinaasappel en Strepsils Cool Mint, zuigtabletten.  
Strepsils + Lidocaïne is verkrijgbaar als zuigtabletten en als keelspray.
- Strepsils wordt gebruikt voor het verlichten van de symptomen van acute keelpijn.  
Strepsils kan ook gebruikt worden als aanvullende lokale behandeling van keelontsteking, ontsteking van de amandelen en de mondslimvlieszen (tandvleesontsteking, aften).  
Wordt uw klacht na 3 à 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **2. Wanneer mag u Strepsils Suikervrij Aardbei niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u Strepsils niet gebruiken?**

- Bij kinderen jonger dan 5 jaar.
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Strepsils?**

- Elke keelpijn die langer dan 3 à 4 dagen aanhoudt en/of gepaard gaat met koorts, noodzaakt het advies van uw dokter.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
- Dit geneesmiddel is niet geschikt voor jonge kinderen wegens het risico op verstikking.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Strepsils nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Strepsils geeft geen interactie met antibiotica, wat geassocieerd gebruik mogelijk maakt.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid.**

Er zijn geen of beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van dit geneesmiddel tijdens deze periodes. Aldus wordt Strepsils niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Bent u zwanger denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Gezien de aard van het product is het onwaarschijnlijk dat Strepsils enige invloed heeft op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

### **Strepsils bevat natrium, maltitol en isomalt**

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

Strepsils bevat maltitol en isomalt. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Kan een licht laxerende werking hebben. Calorische waarde 2,3 Kcal/g maltitol (of isomalt).

Dit geneesmiddel bevat Geurbenzylalcohol. Benzylalcohol kan allergische reacties veroorzaken.

## **3. Hoe gebruikt u Strepsils Suikervrij Aardbei?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De laagste efficiënte dosis moet worden gebruikt voor de kortst mogelijke periode die nodig is om de symptomen te verlichten.

Omdat keelpijn ook een teken kan zijn van andere ernstige aandoeningen wordt aangeraden de zuigtabletten niet langer dan 3 à 4 dagen te gebruiken zonder medisch advies.

De aanbevolen dosering is:

#### **Volwassenen.**

Eén zuigtablet om de 2 à 3 uur langzaam in de mond laten smelten.

Maximaal 6 zuigpastilles per dag (24 uur).

#### **Kinderen**

Kinderen vanaf 15 jaar en ouder: zie volwassenen.

Kinderen vanaf 8 tot 15 jaar: één zuigtablet 4 x per dag.

Kinderen vanaf 5 tot 7 jaar: één zuigtablet 3 x per dag.

### **Ouderen**

Er is geen dosisaanpassing nodig bij oudere mensen.

### **Heeft u te veel van Strepsils gebruikt?**

Indien u meer Strepsils ingenomen heeft dan toegelaten, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).

Overdosering zou geen andere problemen dan gastro-intestinaal ongemak mogen veroorzaken.

Gezien de vorm, het lage gehalte aan actieve stoffen en de onschadelijkheid ervan, is het praktisch uitgesloten dat er zich problemen zouden voordoen.

De behandeling is symptomatisch.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

### **Frequentie niet gekend.**

- Overgevoeligheid in de vorm van huiduitslag, snelle zwelling onder de huid in gebieden zoals het gezicht, de keel, de armen en de benen wat levensbedreigend kan zijn als de zwelling van de keel de luchtwegen blokkeert, jeukende uitslag, overmatige samentrekking van de luchtwegspieren waardoor ademhalingsmoeilijkheden ontstaan en lage bloeddruk met flauwvallen.
- Buikpijn, misselijkheid, oraal ongemak zoals branderig gevoel of tintelingen in de mond en zwelling van de mond of keel.
- Huiduitslag.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem.

#### **België:**

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

[www.fagg.be](http://www.fagg.be)

Afdeling Vigilantie :

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

E-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

#### **Luxemburg:**

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél.: (+352) 2478 5592, e-mail: [pharmacovigilance@ms.etat.lu](mailto:pharmacovigilance@ms.etat.lu)

Link pour le formulaire :

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. Hoe bewaart u Strepsils Suikervrij Aardbei?**

Bewaren beneden 25 °C

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de blisterverpakking na “exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in Strepsils Suikervrij Aardbei?**

- De werkzame stoffen in dit middel zijn 1,2 mg dichlorobenzylalcohol en 0,6 mg amylmetacresol.
- De andere stoffen in dit middel zijn aardbeiensmaakstof, Antho P-WS roze (E163), natriumsacharine, wijnsteenzuur, vloeibare maltitol en isomalt.

### **Hoe ziet Strepsils eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

- Strepsils Suikervrij Aardbei zijn ronde roze zuigtabletten, verpakt per 24 of 36 in een Alu/PVC/PVdC blisterverpakking.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) SA/NV  
Industrielaan 13B  
1070 Brussel

#### **Fabrikant**

Reckitt Benckiser NL Brands B.V., Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Nederland

### **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

BE094412, LU 2006078947

### **Indeling voor de aflevering**

Niet aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel.

**Deze bijsluiter is goedgekeurd in 11/2025**