

**NOTICE**

## Notice : information du patient

Atacand 4 mg, comprimés  
 Atacand 8 mg, comprimés  
 Atacand 16 mg, comprimés  
 Atacand 32 mg, comprimés

candésartan cilexetil

### **Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

### **Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce qu'Atacand et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Atacand
3. Comment prendre Atacand
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Atacand
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### **1. Qu'est-ce qu'Atacand et dans quel cas est-il utilisé ?**

Votre médicament s'appelle Atacand. La substance active est le candésartan cilexetil. Il appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Il agit en relâchant et en dilatant vos vaisseaux sanguins, ce qui aide à abaisser votre pression artérielle. Il aide également votre cœur à pomper plus facilement le sang vers toutes les parties de votre corps.

Atacand peut être utilisé pour :

- traiter la pression artérielle élevée (hypertension) chez les patients adultes et chez les enfants et adolescents âgés de 6 à <18 ans.
- traiter les patients adultes atteints d'une insuffisance cardiaque avec une réduction de la fonction musculaire cardiaque lorsque les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) ne peuvent pas être utilisés ou, en association avec des IEC, quand des symptômes persistent malgré le traitement et que des antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes (ARM) ne peuvent pas être utilisés (les IEC et les ARM sont des médicaments utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque).

### **2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Atacand ?**

#### **Ne prenez jamais Atacand**

- si vous êtes allergique au candésartan cilexetil ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre Atacand en début de grossesse) (voir rubrique « Grossesse »).
- si vous souffrez d'une maladie sévère du foie ou d'une obstruction biliaire (problème d'obstruction des voies biliaires qui empêche la bile de sortir de la vésicule biliaire).

- si le patient est un enfant de moins de 1 an.
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Atacand.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Atacand

- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
- si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
- si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou hyperaldostéronisme primaire).
- si votre pression artérielle est basse.
- si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.
- vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Atacand n'est pas recommandé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique « Grossesse »).
- si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension:
  - un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète.
  - aliskiren.
- si vous prenez un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) avec un autre médicament appartenant à une classe de médicaments connus sous le nom d'antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes. Ces médicaments sont utilisés pour le traitement de l'insuffisance cardiaque (voir « Autres médicaments et Atacand »).

Votre médecin pourra être amené à surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Voir aussi les informations dans la rubrique « Ne prenez jamais Atacand ».

Il est possible que votre médecin veuille vous voir plus souvent et réaliser certains examens si vous souffrez de l'une de ces pathologies.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin ou votre dentiste que vous prenez Atacand. En effet, associé à certains médicaments anesthésiques, Atacand peut provoquer une baisse excessive de votre pression artérielle.

### **Enfants et adolescents**

Atacand a été étudié chez les enfants. Pour plus d'informations, parlez-en à votre médecin. Atacand ne doit pas être donné aux enfants de moins d'un an, étant donné le risque potentiel pour le développement des reins.

### **Autres médicaments et Atacand**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Atacand peut modifier l'action d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur l'action d'Atacand. Si vous prenez certains médicaments, votre médecin pourrait avoir besoin de réaliser des examens sanguins de temps en temps.

Veillez en particulier informer votre médecin si vous utilisez l'un des médicaments suivants car votre médecin pourrait avoir besoin de modifier la dose de vos médicaments et/ou prendre d'autres précautions :

- Autres médicaments qui aident à abaisser votre pression artérielle, tels que les bêta-bloquants, le diazoxide et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), par exemple l'énalapril, le captopril, le lisinopril ou le ramipril.
- Anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS), tels que l'ibuprofène, le naproxène, le diclofénac, le célécoxib ou l'étoricoxib (médicaments contre la douleur et l'inflammation).
- Acide acétylsalicylique (si vous prenez plus de 3 g par jour) (médicament contre la douleur et l'inflammation).
- Suppléments de potassium ou substituts du sel contenant du potassium (médicaments qui augmentent le taux de potassium dans votre sang).
- Héparine (un médicament destiné à fluidifier le sang).
- Cotrimoxazole (un antibiotique), également connu comme triméthoprim/sulfaméthoxazole.
- Comprimés favorisant l'élimination de l'eau (diurétiques).
- Lithium (un médicament utilisé en cas de problèmes de santé mentale).
- Si vous prenez un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) ou de l'aliskiren (voir aussi les informations dans les rubriques « Ne prenez jamais Atacand » et « Avertissements et précautions »).
- Si vous êtes traité(e) pour une insuffisance cardiaque par un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) associé à certains autres médicaments, connus sous le nom d'antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes (par exemple la spironolactone, l'éplérénone).

#### **Atacand avec des aliments, boissons et de l'alcool**

- Vous pouvez prendre Atacand avec ou sans aliments.
- Lorsque vous prenez Atacand, veuillez demander conseil à votre médecin avant de boire de l'alcool. L'alcool peut provoquer des vertiges ou des étourdissements.

#### **Grossesse et allaitement**

##### Grossesse

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre Atacand avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place d'Atacand. Atacand n'est pas recommandé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

##### Allaitement

Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. Atacand n'est pas recommandé chez les femmes qui allaitent et votre médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prématuré.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Certaines personnes peuvent se sentir fatiguées ou avoir des vertiges lorsqu'elles prennent Atacand. Si c'est votre cas, vous ne devez pas conduire de véhicules ni utiliser de machines.

**Atacand contient du lactose.** Le lactose est un type de sucre. Si votre médecin vous a indiqué que vous avez une intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

### **3. Comment prendre Atacand ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Il est important de continuer à prendre Atacand chaque jour.

Vous pouvez prendre Atacand avec ou sans aliments.

Le comprimé est à avaler avec un verre d'eau.

Essayez de le prendre tous les jours à la même heure. Cela vous aidera à ne pas l'oublier.

Pression artérielle élevée :

- La dose recommandée d'Atacand est de 8 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter cette dose à 16 mg une fois par jour et puis jusqu'à 32 mg une fois par jour en fonction de l'évolution de votre pression artérielle.
- Chez certains patients, notamment ceux souffrant de problèmes hépatiques, de problèmes rénaux ou ceux ayant récemment perdu des liquides corporels, par exemple à la suite de vomissements ou de diarrhées ou de l'utilisation de comprimés diurétiques, le médecin peut prescrire une dose initiale plus faible.
- Certains patients noirs peuvent présenter une réponse réduite à ce type de médicament, lorsqu'il est pris comme traitement unique et peuvent donc nécessiter une dose plus élevée.

#### **Utilisation chez les enfants et les adolescents présentant une pression sanguine élevée :**

Enfants âgés de 6 à <18 ans :

La dose initiale recommandée est de 4 mg une fois par jour.

Pour les patients pesant moins de 50 kg: chez certains patients, lorsque la pression sanguine n'est pas contrôlée de manière adéquate, le médecin peut décider d'augmenter la dose jusqu'à un maximum de 8 mg une fois par jour, si nécessaire.

Pour les patients pesant 50 kg et plus : chez certains patients, lorsque la pression sanguine n'est pas contrôlée de manière adéquate, le médecin peut décider d'augmenter la dose jusqu'à 8 mg une fois par jour et jusqu'à 16 mg une fois par jour, si nécessaire.

Insuffisance cardiaque chez l'adulte :

- La dose initiale recommandée d'Atacand est de 4 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter votre dose en doublant la dose à intervalle d'au moins 2 semaines jusqu'à 32 mg une fois par jour. Atacand peut être pris avec d'autres médicaments pour l'insuffisance cardiaque, et votre médecin décidera du traitement le plus adapté pour vous.

#### **Si vous avez pris plus d'Atacand que vous n'auriez dû**

Si vous avez pris trop d'Atacand, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le *Centre Antipoison (070/245 245)*.

#### **Si vous oubliez de prendre Atacand**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Prenez la prochaine dose normalement.

#### **Si vous arrêtez de prendre Atacand**

Si vous arrêtez de prendre Atacand, votre pression artérielle peut augmenter à nouveau. En conséquence, vous ne devez pas arrêter de prendre Atacand sans en avoir parlé au préalable à votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Il est important que vous les connaissiez.

**Arrêtez de prendre Atacand et consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'une des réactions allergiques suivantes :**

- difficultés à respirer, avec ou sans gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge, susceptible de provoquer des difficultés à avaler
- démangeaisons cutanées sévères (accompagnées de boutons)

Atacand peut entraîner une diminution du nombre de globules blancs. Votre résistance à l'infection peut être diminuée et vous pouvez remarquer une fatigue, une infection ou une fièvre. Si vous présentez l'une de ces réactions, contactez votre médecin. Votre médecin peut occasionnellement réaliser des examens sanguins destinés à vérifier si Atacand a eu des effets sur votre sang (agranulocytose).

Autres effets indésirables possibles :

**Fréquents (affectent 1 à 10 patients sur 100)**

- Vertiges/sensation de tournoiement.
- Maux de tête.
- Infection respiratoire.
- Chute de la pression artérielle. Vous pouvez alors avoir des étourdissements ou des vertiges.
- Modification des résultats des examens sanguins :
  - Augmentation de la quantité de potassium dans votre sang, en particulier si vous souffrez déjà de problèmes rénaux ou d'insuffisance cardiaque. Si cette augmentation est sévère, vous pouvez vous sentir fatigué(e), faible, avoir des battements de cœur irréguliers ou ressentir des fourmillements ou des picotements.
- Modification du fonctionnement de vos reins, en particulier si vous souffrez déjà de problèmes rénaux ou d'insuffisance cardiaque. Dans de très rares cas, une insuffisance rénale peut survenir.

**Très rares (affectent moins d'1 patient sur 10 000)**

- Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge.
- Réduction du nombre de vos globules rouges ou de vos globules blancs. Vous pouvez ressentir une fatigue, contracter une infection ou avoir de la fièvre.
- Éruption cutanée, éruption cutanée grumeleuse (urticaire).
- Démangeaisons.
- Douleurs dans le dos, douleurs dans les articulations et dans les muscles.
- Modifications du fonctionnement de votre foie, y compris inflammation du foie (hépatite). Vous pouvez vous sentir fatigué(e), présenter un jaunissement de votre peau et du blanc de vos yeux ainsi que des symptômes pseudo-grippaux.
- Nausées.
- Modification des résultats des examens sanguins :
  - Réduction de la quantité de sodium dans votre sang. Si cette baisse est sévère, vous pouvez vous sentir faible, manquer d'énergie ou avoir des crampes musculaires.
- Toux.

**Indéterminés (fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles)**

- Diarrhée.

**Effets indésirables supplémentaires chez les enfants**

Les effets indésirables chez les enfants traités pour une pression sanguine élevée apparaissent comme comparables à ceux observés chez les adultes mais se produisent plus souvent. Le mal de gorge est un

effet indésirable très fréquent chez les enfants mais n'est pas rapporté chez les adultes et le nez qui coule, la fièvre et l'augmentation du rythme cardiaque sont fréquents chez les enfants mais ne sont pas rapportés chez les adultes.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement (voir détails ci-dessous). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### **Belgique**

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Division Vigilance:

Site internet: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

### **Luxembourg**

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet : [www.guichet.lu/pharmacovigilance](http://www.guichet.lu/pharmacovigilance)

## **5. Comment conserver Atacand ?**

- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
- N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le carton, la plaquette ou le flacon après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
- Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. Contenu de l'emballage et autres informations**

### **Ce que contient Atacand**

- La substance active est le candésartan cilexetil. Les comprimés contiennent chacun 4 mg, 8 mg, 16 mg ou 32 mg de candésartan cilexetil.
- Les autres composants sont: carmellose calcique, hydroxypropylcellulose, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, amidon de maïs et macrogol. Les comprimés de 8, 16 et 32 mg contiennent aussi de l'oxyde de fer (E172).

### **Aspect d'Atacand et contenu de l'emballage extérieur**

- Les comprimés de 4 mg sont des comprimés de couleur blanche, de forme ronde avec une entaille et gravés de l'inscription A/CF d'un côté et 004 de l'autre.
- Les comprimés de 8 mg sont des comprimés de couleur rose pâle, de forme ronde avec une entaille et gravés de l'inscription A/CG d'un côté et 008 de l'autre.
- Les comprimés de 16 mg sont des comprimés de couleur rose, de forme ronde avec une entaille et gravés de l'inscription A/CH d'un côté et 016 de l'autre.

- Les comprimés de 32 mg sont des comprimés de couleur rose, de forme ronde avec une entaille et gravés de l'inscription A/CL d'un côté et 032 de l'autre.

Le comprimé peut être divisé en doses égales en coupant le long de l'entaille.

Les comprimés se présentent sous la forme d'un flacon en plastique contenant 100 comprimés ou d'une plaquette contenant 7, 14, 28, 30, 56, 90 et 98 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

**Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché**

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Allemagne

**Fabricant**

Klocke Pharma-Service GmbH

Straßburger Str. 77

77767 Appenweier

Allemagne

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 23-24

17489 Greifswald

Allemagne

AstraZeneca AB, Gärtnavägen, SE-152 57 Södertälje, Suède

AstraZeneca Dunkerque Production - AstraZeneca Reims Production, Parc Industriel de la Pompelle, Chemin de Vrilly, 51100 Reims, France

**Numéros de l'Autorisation de Mise sur le Marché**

ATACAND 4 mg (plaquette) : BE190644

ATACAND 4 mg (flacon) : BE190574

ATACAND 8 mg (plaquette) : BE190617

ATACAND 8 mg (flacon) : BE190556

ATACAND 16 mg (plaquette) : BE190592

ATACAND 16 mg (flacon) : BE190531

ATACAND 32 mg (plaquette) : BE267924

ATACAND 32 mg (flacon) : BE267906

LU:

ATACAND 4 mg : 2010010673

ATACAND 8 mg : 2010010675

ATACAND 16 mg : 2010010676

ATACAND 32 mg : 2010010677

**Mode de délivrance**

Médicament soumis à prescription médicale.

**Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :**

<b>Etat Membre</b>	<b>Nom</b>
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède	Atacand
Italie	Ratacand

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 03/2024.**