

## **PACKUNGSBEILAGE**

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

### **Nebivolol Mylan 5 mg Tabletten**

*Nebivolol*

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Nebivolol Mylan und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Nebivolol Mylan beachten?
3. Wie ist Nebivolol Mylan einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Nebivolol Mylan aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Nebivolol Mylan und wofür wird es angewendet?**

Nebivolol Mylan gehört zur Arzneimittelgruppe der sogenannten Betablocker, die zur Senkung des Blutdrucks angewendet werden.

Nebivolol Mylan wird zur Behandlung von folgenden Krankheiten angewendet:

- Bluthochdruck (Hypertonie)
- bei älteren Patienten, die an einem leichten bis mäßigen Herzversagen leiden, zusätzlich zur Standardtherapie (z. B. mit Diuretika, Digoxin, ACE-Hemmer, Angiotensin-II-Antagonisten)

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Nebivolol Mylan beachten?**

**Nebivolol Mylan darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Nebivolol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind. Eine allergische Reaktion kann Ausschlag, Juckreiz, Schwellung oder Atmungsschwierigkeiten einschließen
- wenn Sie an Leberbeschwerden leiden
- wenn Sie bereits einen Herzinfarkt hatten; wenn Sie Herzversagen haben, das sich möglicherweise verschlechtert oder wenn Sie sich einer intravenösen Behandlung wegen Herzversagens unterzogen haben
- wenn Sie an Herzschlagausssetzungen leiden (Krankheiten wie Sick-Sinus-Syndrom, sinoatrialer Block oder Herzblock 2. oder 3. Grades), jedoch keinen Herzschrittmacher haben
- wenn Sie an Asthma oder schweren Atmungsbeschwerden leiden oder gelitten haben
- wenn Sie an einem unbehandelten Nebennierentumor, sog. Phäochromozytom, leiden
- wenn Sie an einer Krankheit, sog. metabolische Azidose, leiden
- wenn Sie an einem langsamen Herzschlag (weniger als 60 Schläge pro Minute, sog. Bradykardie) leiden
- wenn Sie an niedrigem Blutdruck oder Kreislaufproblem leiden
- wenn Sie Arzneimittel anwenden, die Floctafenin oder Sultoprid enthalten

## Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Nebivolol Mylan einnehmen:

- wenn Sie an Herzbeschwerden leiden, die nicht behandelt werden, da Nebivolol Mylan diese verschlimmern kann.
- wenn Sie an der Raynaud Krankheit leiden, einer schlechten Durchblutung der Arme oder Beine, oder wenn Ihnen das Gehen zeitweise schwerfällt einschließlich Episoden von Hinken oder Lähmung, da Nebivolol Mylan diese Beschwerden verschlimmern kann.
- wenn Ihnen Ihr Arzt gesagt hat, dass Sie an einem Herzblock des 1. Grades (Herzschlagausssetzungen) leiden, da Nebivolol Mylan diesen verschlimmern oder Ihren Herzschlag verlangsamen kann. Ihr Arzt wird Ihr Herz beobachten und, falls erforderlich, Ihre Dosierung verändern.
- wenn Sie an der Prinzmetal Angina leiden, da Nebivolol Mylan Ihre Angina-Anfälle verschlimmern kann.
- wenn Sie Diabetiker sind, da Nebivolol Mylan einige der Anzeichen, die auf einen niedrigen Blutzuckerspiegel (Hypoglykämie) hinweisen, maskieren kann.
- wenn Sie an einer überaktiven Schilddrüse leiden (Hyperthyroidismus), da Nebivolol Mylan einige Anzeichen dieser Krankheit, wie ein schneller Herzschlag (Tachykardie), maskieren kann.
- wenn Sie an Lungenbeschwerden leiden, da Nebivolol Mylan weitere Atmungsschwierigkeiten hervorrufen kann. Ihr Arzt wird Sie beraten, wenn Sie ein Risiko aufweisen.
- wenn Sie an einer Hautkrankheit, sog. Psoriasis, oder an Heuschnupfen oder an anderen Allergien leiden, da Nebivolol Mylan diese Krankheiten verschlimmern kann. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
- wenn Sie Kontaktlinsen tragen, da Nebivolol Mylan Augentrockenheit hervorrufen kann.

## Einnahme von Nebivolol Mylan zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Nehmen Sie Nebivolol Mylan nicht ein, wenn Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, die Floctafenin oder Sultoprid enthalten (siehe Abschnitt „Nebivolol Mylan darf nicht angewendet werden“ weiter oben).

Die Einnahme einiger dieser Arzneimittel gleichzeitig mit Nebivolol Mylan kann Ihren Blutdruck zu stark senken oder Herzbeschwerden hervorrufen.

- Arzneimittel zur Blutdrucksenkung, wie Verapamil, Diltiazem, Clonidin, Guanfacin, Moxonidin, Methyldopa, Rilmenidin, Amlodipin, Felodipin, Lacidipin, Nifedipin, Nicardipin, Nimodipin, Nitrendipin)
- Arzneimittel zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen, wie Amiodaron, Chinidin Hydrochinidin, Cibenzolin, Flecainid, Disopyramid, Lidocain, Mexiletin, Propafenon.
- Arzneimittel zur Behandlung der Depression oder von sonstigen Geisteskrankheiten, wie Paroxetin, Fluoxetin, Thioridazin
- Barbiturate (bei Epilepsie, Angstzuständen oder Schlaflosigkeit)
- Baclofen (Muskelrelaxans)
- Amifostin (zur Krebsbehandlung)
- Mefloquin (zur Malariabehandlung)
- Organische Nitrate (zur Behandlung von Schmerzen in der Brust)
- Chinidin (zur Verlangsamung des Herzrhythmus)
- Terbinafin (zur Behandlung von Pilz- oder Hefe-Infektionen)
- Bupropion (zur Tabakentwöhnung)
- Chloroquin (zur Behandlung von Malaria oder rheumatoider Arthritis)

- Levomepromazin (zur Behandlung von Geisteskrankheiten)

#### Ebenfalls:

- Stimulanzien, die Dopamin enthalten, oder Dekongestiva, die Ephedrin enthalten, da sie Ihren Blutdruck zu stark erhöhen oder Herzbeschwerden hervorrufen können
- Insulin oder sonstige orale Antidiabetika, da Nebivolol Mylan die Symptome einer Hypoglykämie (niedriger Blutzuckerspiegel), wie ein schneller Herzschlag oder Herzklopfen, maskieren kann.

#### Chirurgie

Nebivolol Mylan kann mit bestimmten Anästhetika reagieren, die bei Operationen angewendet werden. Falls Sie sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen müssen, müssen Sie den Arzt, Zahnarzt oder das medizinische Personal des Krankenhauses darüber informieren, dass Sie Nebivolol Mylan einnehmen.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Nebivolol Mylan darf schwangeren oder stillenden Frauen nicht verabreicht werden, es sei denn, dass der Nutzen für die Mutter die Risiken für das Baby überwiegt.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Dieses Arzneimittel kann Schwindel oder Ohnmachtsanfälle als Folge der Blutdrucksenkung hervorrufen. Falls diese auftreten, sollten Sie kein Fahrzeug führen oder keine Maschine bedienen. Diese Wirkungen treten eher am Anfang der Behandlung oder nach einer Dosiserhöhung auf (siehe auch Abschnitt 4).

#### **Nebivolol Mylan enthält Lactose**

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit, wie für Lactose, leiden.

### **3. Wie ist Nebivolol Mylan einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Prüfen Sie immer, ob Sie genug Tabletten haben und sehen Sie zu, dass Sie immer welche da haben. Versuchen Sie, Ihre Tabletten immer zur gleichen Tageszeit einzunehmen. Schlucken Sie die Tablette mit einem Glas Wasser. Sie dürfen Ihre Tabletten mit oder ohne Nahrungsmittel einnehmen.

Die Tablette kann in 4 gleiche Dosen geteilt werden.

#### **Behandlung des Bluthochdrucks:**

*Anwendung bei Erwachsenen:* die übliche Dosis beträgt 5 mg Nebivolol Mylan einmal täglich. Es dauert normalerweise 1 bis 2 Wochen, bis das Arzneimittel vollständig wirkt; jedoch kann es gelegentlich bis zu 4 Wochen dauern.

*Ältere Personen:* wenn Sie über 65 Jahre sind und Nebivolol Mylan einnehmen, um Ihren Blutdruck zu senken, beträgt die übliche Anfangsdosis 2,5 mg täglich. Jedoch kann Ihr Arzt diese Dosis auf 5 mg täglich erhöhen, wenn er/sie es für erforderlich erachtet.

*Patienten mit einer Nierenkrankheit:* die übliche Dosis beträgt 2,5 mg einmal täglich. Jedoch kann Ihr Arzt Ihre Dosis auf 5 mg täglich erhöhen, falls erforderlich.

**Patienten, die Nebivolol Mylan und ein anderes Arzneimittel zur Blutdrucksenkung einnehmen:**

Wenn Nebivolol Mylan gleichzeitig mit Hydrochlorothiazid eingenommen wird, beträgt die übliche tägliche Dosis 5 mg Nebivolol Mylan und 12,5 – 25 mg Hydrochlorothiazid täglich.

**Behandlung nach einem Herzversagen:**

*Anwendung bei Erwachsenen und älteren Personen:* Ihr Arzt wird mit einer niedrigen Dosis beginnen und Ihre Dosis in 1- bis 2-wöchigen Intervallen allmählich erhöhen, bis sich Ihre Krankheit stabilisiert hat. Die übliche Anfangsdosis beträgt 1,25 mg einmal täglich über 1-2 Wochen; diese Dosis kann auf 2,5 mg einmal täglich, danach auf 5 mg einmal täglich und danach auf 10 mg einmal täglich erhöht werden. Die empfohlene Maximaldosis beträgt 10 mg einmal täglich. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, welche Menge Sie einnehmen müssen.

**Patienten mit einer Nierenkrankheit:**

Von der Anwendung von Nebivolol Mylan bei Patienten mit einer schweren Nierenkrankheit wird abgeraten. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, ob Nebivolol für Ihre Krankheit geeignet ist.

**Patienten mit einer Leberkrankheit:**

Wenn Sie an einer Leberkrankheit leiden, dürfen Sie Nebivolol Mylan **nicht** einnehmen.

**Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:**

Von der Anwendung von Nebivolol Mylan bei Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren wird abgeraten.

**Wenn Sie eine größere Menge von Nebivolol Mylan eingenommen haben, als Sie sollten**

Nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt oder mit der Notaufnahme auf. Nehmen Sie den Behälter und die restlichen Tabletten mit. Anzeichen und Symptome einer Überdosis schließen folgendes ein: langsamer Herzschlag, niedriger Blutdruck, pfeifende Atmung und Atmungsschwierigkeiten und plötzliche Herzbeschwerden.

Wenn Sie zu viel Nebivolol Mylan eingenommen haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Antigiftzentrum auf (070/245.245).

**Wenn Sie die Einnahme von Nebivolol Mylan vergessen haben**

Nehmen Sie **nicht** die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Nehmen Sie die nächste Dosis zum vorgesehenen Zeitpunkt ein. Wenn Sie mehrere Dosen vergessen haben, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt auf.

**Wenn Sie die Einnahme von Nebivolol Mylan abbrechen**

Wenn Sie die Einnahme von Nebivolol Mylan plötzlich abbrechen, werden wahrscheinlich Nebenwirkungen auftreten oder Ihre Erkrankung kann sich verschlechtern. Wenn Sie die Einnahme dieses Arzneimittels abbrechen müssen, wird Ihr Arzt Ihre Dosis über einen Zeitraum von 2 Wochen allmählich reduzieren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn eine der folgenden Nebenwirkungen auftritt, brechen Sie die Einnahme von Nebivolol Mylan ab und informieren Sie sofort Ihren Arzt oder begeben Sie sich zur Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses:

- Verengungsgefühl in der Brust und Atmungsschwierigkeiten.
- schwere allergische Reaktionen, die Ausschlag, Juckreiz, Quaddeln oder eine Anschwellung des Gesichts, der Lippen, des Mundes oder Rachens hervorrufen kann und somit zu Schluck- oder Atmungsschwierigkeiten führen kann
- Herzversagen, das Kurzatmigkeit, schnelle Ermüdung nach leichter körperlicher Anstrengung oder Anschwellung der Füße oder Beine wegen der Flüssigkeitsansammlung hervorrufen kann
- Veränderungen der elektrischen Aktivität des Herzens, die zu Herzschlagaussetzungen führen können
- Augenprobleme, wie Entzündung, Augentrockenheit, Rötung oder kratzende Reizung der Augenlider, die zur Schädigung der Augen führen können
- Geistesstörungen (Psychosen), die dazu führen können, dass Sie Dinge hören, sehen oder fühlen, die es nicht gibt (Halluzinationen) oder falsche Dinge glauben (Wahnvorstellungen), verwirrt sind oder gestörte oder ungewöhnliche Gedanken oder Verhaltensweisen haben

#### **Weitere mögliche Nebenwirkungen umfassen:**

**Häufige Nebenwirkungen** (können bei bis zu 1 von 10 Personen auftreten):

- Kopfschmerzen
- Prickeln oder Kribbeln
- Ohnmachtsanfall beim Aufstehen
- Verstopfung, Übelkeit oder Durchfall
- Müdigkeitsgefühl
- Flüssigkeitsretention (Schwellung)
- Kurzatmigkeit

**Gelegentliche Nebenwirkungen** (können bei bis zu 1 von 100 Personen auftreten):

- Alpträume
- Gefühle von Depression
- Sehstörungen
- Langsamer Herzschlag oder andere Herzbeschwerden
- Andere Veränderungen Ihrer Herzfunktion, die bei Herzuntersuchungen nachgewiesen werden können
- niedriger Blutdruck
- Schwierigkeiten oder Schmerzen beim Gehen, einschließlich Muskelkrämpfe, Hinken oder Lähmung
- Atemnot wie bei Asthma aufgrund plötzlicher Krämpfe der Muskeln um die Atemwege (Bronchospasmus)
- Verdauungsstörung, Flatulenzen (Winde), Erbrechen
- Unfähigkeit, eine Erektion zu bekommen oder sie aufrechtzuerhalten
- Hautausschlag, Jucken der Haut

**Sehr seltene Nebenwirkungen** (können bei bis zu 1 von 10.000 Patienten auftreten):

- Ohnmachtsanfälle
- Verschlimmerung Ihrer Psoriasis oder Ihres Psoriasis-artigen Hautausschlags (dicke Flecken roter Haut, häufig mit silbrigen Schuppen)

**Nicht bekannt** (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

- Allergische Ganzkörperreaktionen mit generalisierten Hautausschlägen (Überempfindlichkeitsreaktionen);
- schnell einsetzendes Anschwellen, insbesondere um die Lippen oder der Zunge, möglicherweise mit plötzlichen Atmungsschwierigkeiten (Angioödem);

- eine Art von Hautausschlag, gekennzeichnet durch blass-rote, erhabene juckende Pusteln aufgrund von allergischen oder nicht-allergischen Ursachen (Nesselsucht).

Über die folgenden Nebenwirkungen wurde mit Arzneimitteln desselben Typs wie Nebivolol berichtet. Sie können daher auch mit diesem Arzneimittel beobachtet werden. **Die Häufigkeit ist aufgrund der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.**

- Kalte Finger und Zehen mit bläulicher Verfärbung der Haut (Raynaud Phänomen)
- Augentrockenheit

In einer klinischen Studie zu Herzversagen wurden folgende Nebenwirkungen beobachtet:

**Sehr häufige Nebenwirkungen** (können bei mehr als 1 von 10 Personen auftreten):

- Schwindel
- langsamer Herzschlag

**Häufige Nebenwirkungen** (können bei bis zu 1 von 10 Personen auftreten):

- Verschlechterung des Herzversagens
- Niedriger Blutdruck (wie Ohnmachtsanfall beim schnellen Aufstehen)
- Unverträglichkeit von Nebivolol
- eine Form von leichter Herzleitungsstörung, die den Herzrhythmus beeinflusst (AV-Block des 1. Grades)
- Anschwellen der unteren Gliedmaßen (wie geschwollene Fußknöchel).

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte  
Abteilung Vigilanz  
Postfach 97  
B-1000 Brussel  
Madou  
Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)  
E-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist Nebivolol aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Blisterpackung, dem Umkarton oder dem Etikett nach "EXP." angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht anwenden, wenn Sie eine Entfärbung der Tabletten bemerken.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Nebivolol Mylan enthält**

Der Wirkstoff ist Nebivolol. Jede Tablette enthält 5,45 mg Nebivolol-Hydrochlorid entsprechend 5 mg Nebivolol.

Die sonstigen Bestandteile sind Lactose-Monohydrat (siehe Abschnitt 2 „Nebivolol enthält Lactose“), Croscarmellose-Natrium, Maisstärke, Polysorbat 80, Hypromellose, mikrokristalline Cellulose, wasserfreies hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat.

### **Wie Nebivolol Mylan aussieht und Inhalt der Packung**

Nebivolol Mylan Tabletten sind weiße, ovale, 9,5 mm x 8,5 mm große, vierkantige, flache Tabletten mit abgeschrägter Kante. Jede Tablette ist nur auf einer Seite mit « N » im oberen linken Quadranten und « L » im oberen rechten Quadranten gekennzeichnet.

Dieses Arzneimittel ist in PVC/PVdC – Alu-Blisterpackungen in Packungen mit 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 und 100 Tabletten erhältlich, in undurchsichtigen Plastik-Flaschen mit 100 oder 500 Tabletten oder in perforierten Einzeldosis PVC/PVdC – Alu-Blisterpackungen mit 28 x 1, 56 x 1, 100 x 1 Tabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

## **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Mylan bvba/sprl  
Terhulpesteenweg 6A  
B-1560 Hoeilaart

### **Hersteller**

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland.

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Ungarn.

Mylan S. A. S., 117 allée des Parcs, 69 800 Saint Priest, Frankreich.

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Niederlande

### **Zulassungsnummer:**

BE335797 (Blisterpackung)  
BE335806 (Flasche)

## **Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

Belgien: Nebivolol Mylan 5 mg Tabletten  
Frankreich: Nebivolol Mylan 5 mg comprimé quadriséculaire

Griechenland : Nebivolol Generics 5 mg Tablets  
Irland: Nelet 5 mg Tablets  
Italien: NIVOLON 5 mg compresse  
Niederlande: Nebivolol Mylan 5 mg tabletten  
Portugal: Nebivolol Mylan 5 mg comprimidos  
Spanien: Nebivolol Mylan 5 mg comprimidos EFG  
Niederlande: Nebivolol Mylan 5 mg tabletten  
Vereinigtes Königreich: Nebivolol 5 mg Tablets

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 07/2021**  
**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 07/2021**