

NOTICE
COLUMBA émulsion injectable

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant :

Pharmagal Bio, spol. s r. o.
Murgašova 5
949 01 Nitra
République slovaque

Fabricant responsable de la libération des lots:

Pharmagal Bio, spol. s r. o.
Murgašova 5
949 01 Nitra
République slovaque

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

COLUMBA émulsion injectable

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Une dose de 0,3 ml contient:

Principes actifs:

Paramyxovirus 1 columbae inactivatum phyl. 988M-ca provoquant chez les poulets un 5,8 log₂ HI* d'unités

* Inhibition de l'héماغlutination

Adjuvants:

Emulsion contenant de l'huile non minérale

Excipients:

Thiomersal

4. INDICATION(S)

Pour une immunisation active des pigeons, contre l'infection provoquée par PPMV1.

Début d'immunité: 14 jours après la dernière dose du vaccin

Durée d'immunité: 1 année est proposée selon le taux d'anticorps sériques mesuré

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas vacciner des animaux malades.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de rares cas, la piqûre peut provoquer un gonflement qui se résorbe au cours de dix jours. Pendant les essais menés en laboratoire, nous avons observé chez 0,5% de pigeons un léger gonflement suite à l'application sous-cutanée du vaccin, qui ne s'est pas résorbé en 28 jours.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Pigeon.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Administration par injection sous-cutanée sur la face dorsale de la nuque vers la queue et non vers la tête ou administration par injection intra-musculaire dans le muscle pectoral. La dose vaccinale pour toutes les catégories d'âge d'animaux est 0,3 ml.

Primovaccination: première injection à partir de la 4^{ème} semaine de vie
Deuxième injection dans 21-28 jours

Revaccination: une dose chaque 12 mois, au plus tard 21 jours avant le début de la saison des vols et des concours.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Avant utilisation du vaccin, l'amener à température ambiante.

Secouer avant et occasionnellement pendant l'utilisation.

Appliquer dans des conditions stériles.

Utiliser uniquement des aiguilles et des seringues stériles.

10. TEMPS D'ATTENTE

Zéro jour

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

À conserver à une température entre 2 - 8°C. À conserver à l'abri du gel. À conserver à l'abri de la lumière.

Après ouverture, utiliser avant 4 heures ou éliminer.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étiquette.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Aucune information n'est disponible concernant l'utilisation du vaccin pendant la période de reproduction.

Ne pas utiliser pendant la période de reproduction.

Aucune information n'est disponible concernant l'innocuité et l'efficacité de ce vaccin lorsqu'il est utilisé avec un autre médicament vétérinaire. Par conséquent, la décision d'utiliser ce vaccin avant ou après un autre médicament vétérinaire doit être prise au cas par cas.

Ne pas mélanger avec d'autres médicaments vétérinaires .

En cas d'auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquetage.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Mars 2014

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

BE-V 330522

A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire