NOTICE

Notice : information de l'utilisateur

Ropinirole Viatris 0,25 mg comprimés pelliculés
Ropinirole Viatris 0,5 mg comprimés pelliculés
Ropinirole Viatris 1 mg comprimés pelliculés
Ropinirole Viatris 2 mg comprimés pelliculés

Ropinirole (sous forme de chlorhydrate)

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Ropinirole Viatris et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ropinirole Viatris
3. Comment prendre Ropinirole Viatris
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Ropinirole Viatris
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Ropinirole Viatris et dans quel cas est-il utilisé ?

La substance active de Ropinirole Viatris est le ropinirole, qui appartient à un groupe de médicaments appelés agonistes de la dopamine. Ces produits affectent le cerveau de façon similaire à une substance naturelle nommée dopamine.

Ropinirole Viatris est utilisé pour traiter la maladie de Parkinson.

Les personnes qui souffrent de cette maladie présentent de faibles taux de dopamine dans certaines régions de leur cerveau. C'est parce que ropinirole exerce des effets similaires à ceux de la dopamine naturelle qu'il contribue à réduire les symptômes de la maladie de Parkinson.

Ropinirole Viatris est également utilisé pour traiter les symptômes du syndrome des jambes sans repos idiopathique modéré à sévère.

Les patients qui souffrent d'un syndrome des jambes sans repos modéré à sévère présentent classiquement des difficultés à dormir ou des sensations très désagréables dans les membres inférieurs ou supérieurs.

Le syndrome des jambes sans repos est une affection qui se caractérise par un besoin irrésistible de remuer les membres inférieurs et occasionnellement les bras, et qui s'accompagne habituellement de sensations inconfortables, telles que fourmillements, brûlures ou picotements. Ces impressions surviennent pendant les périodes de repos ou d'inactivité, telles que la position assise ou couchée, particulièrement au lit, et empirent le soir ou la nuit.

Les patients ne peuvent habituellement les soulager qu'en marchant ou remuant les membres affectés, ce qui provoque souvent des troubles du sommeil.

Ropinirole Viatris soulage cet inconfort et réduit le besoin de remuer les membres qui interrompt la nuit de sommeil.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ropinirole Viatris ?

Ne prenez jamais Ropinirole Viatris :
- si vous êtes **allergique** au ropinirole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)
- si vous souffrez d'une maladie rénale grave
- si vous présentez une maladie du foie

Prévenez votre médecin si vous pensez qu'une de ces propositions vous concerne.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Ropinirole Viatris. Tous les médicaments ne conviennent pas à tout le monde. Avant que vous ne preniez ropinirole, votre médecin doit savoir si vous souffrez ou avez souffert par le passé de l'une des affections suivantes:

- si vous êtes enceinte ou pensez pouvoir l'être
- si vous allaitez
- si vous avez moins de 18 ans
- si vous souffrez d'une affection cardiaque grave
- si vous présentez un problème de santé mentale sérieux
- si vous avez eu des **pulsions et/ou des comportements inhabituels** (tels qu'une addiction aux jeux de hasard ou un comportement sexuel excessif)
- si **vous ne tolérez pas certains sucres** (tels que le lactose)

Informez votre médecin si vous présentez des symptômes tels que **dépression, apathie, anxiété, la fatigue, sueurs ou douleurs** après l'arrêt ou la diminution du traitement par Ropinirole Viatris **(syndrome de sevrage des agonistes de la dopamine ou DAWS)**. Si les problèmes persistent plus de quelques semaines, votre médecin pourrait procéder à un ajustement de votre dose.

Dites à votre médecin si vous-même ou votre famille/soignant remarquez que vous développez des envies ou des besoins impérieux de vous comporter de manières inhabituelles pour vous et si vous ne pouvez résister à l'impulsion, à la pulsion ou à la tentation de réaliser certaines activités qui pourraient faire du mal à vous-même ou à d'autres personnes. Ceux-ci sont appelés troubles du contrôle des impulsions comprenant des comportements tels que le jeu addictif, le fait de manger trop ou des dépenses excessives, une pulsion sexuelle anormalement élevée ou une augmentation des pensées ou des sensations sexuelles, ou des comportements agressifs. Un ajustement ou un arrêt du traitement par votre médecin est possible.

Informez votre médecin si vous ou votre famille/soignant constatez que vous développez des épisodes de suractivité, d'exaltation ou d'irritabilité (symptômes de manie). Ceux-ci peuvent survenir avec ou sans les symptômes des troubles du contrôle des impulsions (voir ci-dessus). Votre médecin pourrait devoir adapter votre dose ou arrêter votre traitement.

Informez votre médecin si vous pensez correspondre à l'un de ces cas. Votre médecin pourrait décider que Ropinirole Viatris ne vous convient pas ou que vous devez être plus étroitement surveillé pendant votre traitement.

Pendant que vous prendrez Ropinirole Viatris
Prévenez votre médecin si vous-même ou votre famille remarquez l'apparition de comportements inaccoutumés (tels qu'une propension inhabituelle à faire des paris ou une exagération de vos besoins

et/ou comportements sexuels) pendant que vous prenez Ropinirole Viatris. Il se peut que votre médecin doive ajuster ou arrêter l'administration de ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ropinirole peut vous rendre somnolent. **Certaines personnes sont même extrêmement somnolentes**, voire s'endorment parfois très soudainement sans signe prémonitoire.

Ropinirole peut provoquer des hallucinations ("voir", "entendre" ou "ressentir" des choses qui ne sont pas réellement là). Si cela est votre cas, vous ne devez ni conduire, ni utiliser de machines.

Si vous présentez ces effets, vous ne devez pas conduire de véhicule ou utiliser de machine, ni vous mettre dans une situation dans laquelle une somnolence ou un endormissement pourraient vous exposer (ou d'autres personnes) à un risque d'accident grave ou de décès. N'exercez pas ces activités jusqu'à disparition de ces effets.

Parlez-en avec votre médecin si ceci vous pose un problème particulier.

Autres médicaments et Ropinirole Viatris
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris un médicament à base de plantes ou obtenu sans ordonnance. N'oubliez pas de prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous commencez un nouveau médicament pendant que vous prenez Ropinirole Viatris.

Certains médicaments peuvent affecter l'action de Ropinirole Viatris ou augmenter le risque d'apparition d'effets secondaires. Inversement, Ropinirole Viatris peut également affecter l'action d'autres médicaments, tels que :

- l'antidépresseur fluvoxamine
- les médicaments destinés à d'autres problèmes de santé mentale, par exemple le sulpiride
- un THS (traitement hormonal de substitution)
- le métoclopramide, qui sert au traitement des nausées et des brûlures d'estomac
- les antibiotiques ciprofloxacine ou énoxacine
- les autres médicaments de la maladie de Parkinson ou le syndrome des jambes sans repos

Prévenez votre médecin si vous prenez ou avez récemment pris un de ces produits.

Vous aurez besoin de tests sanguins supplémentaires si vous prenez les médicaments suivants en même temps que le ropinirole :

- antagonistes de la vitamine K (utilisés pour réduire la coagulation sanguine), tels que la warfarine (coumadine).

Consommation de tabac et de Ropinirole Viatris
Prévenez votre médecin si vous arrêtez ou commencez une consommation de tabac pendant que vous prenez Ropinirole Viatris. Il se peut que votre médecin doive ajuster votre posologie.

Ropinirole Viatris avec des aliments et boissons
Comme il est possible que vous vous sentiez moins nauséeux ou que vous vomissiez moins souvent en avalant Ropinirole Viatris avec des aliments, prenez cette précaution si vous le pouvez.

Grossesse et allaitement
Ropinirole Viatris ne vous est pas recommandé si vous êtes enceinte, sauf si votre médecin juge que l'avantage que vous tirez de votre médicament surpasse le risque qu'il représente pour le bébé non encore né. **Ropinirole Viatris n'est pas recommandé si vous allaitez**, car il peut affecter la production de

lait.

Prévenez votre médecin immédiatement si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous pourriez l'être ou encore si vous planifiez une grossesse. Votre médecin vous guidera également si vous allaitez ou souhaitez le faire. Il est possible qu'il vous conseille d'arrêter la prise de Ropinirole Viatris.

Informations importantes à propos de certains ingrédients de Ropinirole Viatris
Lactose
Les comprimés de Ropinirole Viatris contiennent une petite quantité de sucre appelé lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Sodium
Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Ropinirole Viatris

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Ropinirole Viatris peut vous être administré seul, pour traiter les symptômes d'une maladie de Parkinson ou d'un syndrome des jambes sans repos. Ou il est également possible que vous receviez Ropinirole Viatris en plus d'un autre médicament portant le nom de L-dopa (ou lévodopa).

Ne donnez pas de ropinirole à des enfants. Normalement, ce médicament n'est pas prescrit aux personnes de moins de 18.

Avalez le(s) comprimé(s) de Ropinirole Viatris entiers, avec un verre d'eau. Ne mâchez pas ou n'écrasez pas les comprimés.

La dose exacte de ropinirole peut différer d'une personne à l'autre. Votre médecin choisira celle qui vous devrez prendre chaque jour ; respectez ses instructions. Si vous prenez Ropinirole Viatris pour la première fois, votre dose sera augmentée progressivement.

Quelle quantité de Ropinirole Viatris devrez-vous prendre ?

Maladie de Parkinson
Il faudra peut-être un certain temps pour trouver la dose de Ropinirole Viatris qui vous convient le mieux.

La posologie initiale habituelle est de 0,25 mg de ropinirole trois fois par jour pendant la première semaine. Votre médecin l'augmentera ensuite chaque semaine, pendant les trois semaines suivantes. Après cela, il l'élèvera encore progressivement jusqu'à celle qui vous convient le mieux. La posologie habituelle est de 1 mg à 3 mg trois fois par jour (soit une quantité quotidienne totale de 3 à 9 mg). Si les symptômes de votre maladie de Parkinson ne se sont pas suffisamment améliorés, il est possible que votre médecin décide de poursuivre progressivement l'augmentation de votre posologie. Certaines personnes prennent jusqu'à 8 mg de Ropinirole Viatris trois fois par jour (24 mg par jour au total).

Si vous prenez en outre d'autres médicaments pour la maladie de Parkinson, votre médecin vous conseillera peut-être d'en réduire progressivement la dose. Si vous prenez déjà de la lévodopa (L-dopa) au moment de l'instauration du traitement par Ropinirole Viatris, vous pouvez avoir des

mouvements incontrôlés (dyskinésies). Si cela arrive, parlez-en à votre médecin. Il pourra être amené à ajuster les doses de vos médicaments.

Syndrome des jambes sans repos
Prenez Ropinirole Viatris une fois par jour par la bouche, tous les jours au même moment. Ropinirole Viatris se prend habituellement immédiatement avant le coucher, mais il peut l'être jusqu'à 3 heures avant d'aller au lit.

La posologie de départ est de 0,25 mg une fois par jour. Après deux jours, votre médecin la fera probablement passer à 0,5 mg une fois par jour pour le restant de la première semaine de traitement. Il se peut qu'il l'augmente ensuite progressivement pendant trois semaines jusqu'à une dose de 2 mg par jour.

En cas d'amélioration insuffisante, il l'élèvera peut-être progressivement jusqu'à un maximum de 4 mg par jour. Après trois mois de traitement par Ropinirole Viatris, il est possible qu'il ajuste la dose une nouvelle fois ou qu'il arrête le traitement en fonction de vos symptômes et de ce que vous ressentez.

Ne prenez pas plus de Ropinirole Viatris que ce que votre médecin vous a recommandé.

Vous devrez peut-être patienter quelques semaines avant de ressentir l'action de Ropinirole Viatris.

Si vos symptômes s'aggravent
Dans certains cas, il arrive que les symptômes du syndrome des jambes sans repos s'aggravent chez les personnes prenant Ropinirole Viatris. Les symptômes peuvent par exemple débuter plus tôt dans la journée, ou après un délai plus court au repos. Ou encore, les symptômes peuvent toucher d'autres parties du corps, telles que les bras. Si c'est votre cas, **veuillez consulter votre médecin**.

Prise de votre dose de Ropinirole Viatris
Avalez le(s) comprimé(s) de Ropinirole Viatris entier(s), avec un verre d'eau. Il est préférable de prendre Ropinirole Viatris avec de la nourriture pour diminuer le risque de nausées.

Si vous avez pris plus de Ropinirole Viatris que vous n'auriez dû
Si vous avez utilisé ou pris trop de Ropinirole Viatris, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien, ou le centre Antipoison (070/245.245).

Contactez un médecin ou un pharmacien immédiatement. Si possible, montrez-leur l'emballage de Ropinirole Viatris.

Les personnes victimes d'un surdosage en Ropinirole Viatris peuvent présenter les symptômes suivants: nausées, vomissements, étourdissements (sensation de tournoiement), somnolence, fatigue mentale ou physique, perte de connaissance, voir, sentir ou entendre des choses qui ne sont pas là (hallucinations).

Si vous oubliez de prendre Ropinirole Viatris
Ne prenez pas de comprimés supplémentaires ou de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Contentez-vous de prendre la dose suivante à l'heure habituelle.

Si vous avez sauté la prise de Ropinirole Viatris pendant un jour ou plus, demandez conseil à votre médecin sur la façon de le reprendre.

N'arrêtez pas Ropinirole Viatris sans demander conseil
Prenez Ropinirole Viatris aussi longtemps que votre médecin vous le recommande. Ne l'arrêtez pas sans son conseil.

Si vous arrêtiez soudainement la prise de Ropinirole Viatris, vos symptômes pourraient empirer fortement et rapidement. Un arrêt brutal pourrait également entraîner un trouble médical connu sous le

nom de syndrome malin des neuroleptiques, qui peut représenter un risque majeur pour votre santé. Les symptômes incluent : akinésie (perte des mouvements musculaires), rigidité musculaire, fièvre, tension artérielle instable, tachycardie (rythme cardiaque accéléré), confusion, diminution du niveau de conscience (p. ex. coma).

Si vous devez arrêter Ropinirole Viatris, votre médecin réduira votre dose progressivement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets secondaires de Ropinirole Viatris ont plus de chances de survenir quand on commence à le prendre ou quand la dose vient d'être augmentée. Ils sont habituellement légers et peuvent devenir moins gênants quand on prend la même dose pendant un certain temps. Si ces effets secondaires vous préoccupent, parlez-en avec votre médecin.

Effets indésirables très fréquents
Ils peuvent toucher plus d'1 personne sur 10 prenant Ropinirole Viatris :
- évanouissement (syncope)
- sensation de somnolence
- nausées

Effets indésirables fréquents
Ils peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 10 prenant Ropinirole Viatris :
- hallucinations («vision» de choses en réalité absentes)
- vomissements
- étourdissements (sensation de tournoiement)
- brûlures d'estomac
- douleur abdominale
- gonflement des jambes, des pieds ou des mains
- nervosité
- aggravation d'un syndrome des jambes sans repos (les symptômes peuvent débuter plus tôt que d'habitude ou être plus intenses, ou affecter d'autres membres précédemment non affectés tels que les bras, ou réapparaître tôt le matin)

Effets indésirables peu fréquents
Ils peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 100 prenant Ropinirole Viatris :
- une tension artérielle faible (hypotension)
- vertiges ou perte de connaissance, particulièrement lorsqu'on se redresse soudainement (ce phénomène est dû à une chute de la pression artérielle)
- extrême somnolence pendant la journée
- endormissement très soudain sans somnolence préalable
- problèmes mentaux, tels que délire (confusion profonde), idées délirantes (idées déraisonnables) ou paranoïa (soupçons déraisonnables)
- hoquet

Certains patients peuvent présenter les effets indésirables suivants (fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles)
- réactions allergiques telles que gonflements rouges prurigineux sur la peau (urticaire), gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge pouvant entrainer

des difficultés pour avaler ou respirer, éruption cutanée ou démangeaisons intenses (voir rubrique 2)
- agressivité
- usage excessif de Ropinirole Viatris (besoin de doses importantes de médicaments dopaminergiques, supérieures aux doses nécessaires pour contrôler les symptômes moteurs, connu sous le nom de syndrome de dysrégulation dopaminergique)
- après avoir arrêté ou réduit le traitement par ropinirole : dépression, apathie (indifférence), anxiété, manque d'énergie, transpiration ou douleurs peuvent apparaître (c'est ce que l'on appelle le syndrome de sevrage des agonistes dopaminergiques ou SSAD)
- modifications de la fonction hépatique, qui se sont manifestées dans les tests sanguins
- érection spontanée

Vous pourriez ressentir les effets indésirables suivants :
- incapacité à résister à cette impulsion, envie ou tentation de réaliser une action qui pourrait être préjudiciable pour vous ou pour les autres, notamment:
- forte impulsion à jouer à l'excès malgré des conséquences graves pour soi-même ou pour la famille
- modification ou augmentation de l'intérêt sexuel et comportement significatif pour vous ou pour d'autres personnes, par exemple, une pulsion sexuelle accrue
- achats ou dépenses excessifs incontrôlables
- crises boulimiques (consommer de grandes quantités de nourriture en une courte période) ou alimentation compulsive (ingérer plus de nourriture que nécessaire pour satisfaire votre faim)
- des épisodes de suractivité, d'exaltation ou d'irritabilité

Prévenez votre médecin si vous ressentez un de ces comportements, il cherchera un moyen de gérer ou de réduire les symptômes.

Si vous prenez Ropinirole Viatris avec de la L-dopa
Les personnes qui prennent Ropinirole Viatris avec de la L-dopa peuvent présenter d'autres effets secondaires avec le temps:
- des mouvements incontrôlables (dyskinésies) sont un effet indésirable très fréquent. Si vous prenez déjà de la L-dopa au moment de l'instauration du traitement par Ropinirole Viatris, vous pouvez avoir des mouvements incontrôlés (dyskinésies). Si cela arrive, parlez-en à votre médecin. Il pourra être amené à ajuster les doses de vos médicaments.
- la confusion est un effet indésirable fréquent

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
www.afmps.be
Division Vigilance
Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail : adr@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Ropinirole Viatris

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’étiquette et la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Ropinirole Viatris
La substance active est le ropinirole.

Chaque comprimé pelliculé contient 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, ou 2 mg de ropinirole (sous la forme de chlorhydrate).

Les autres composants sont : cellulose microcristalline, lactose monohydraté (voir rubrique 2, « Ropinirole Viatris contient du lactose »), croscarmellose sodique, hypromellose, stéarate de magnésium.

L’enrobage comprend:

0,25 mg : Hypromellose, dioxyde de titane (E171), macrogol , polysorbate

0,5 mg : Hypromellose, dioxyde de titane (E171), macrogol , oxyde ferrique jaune (E172)

1 mg : Hypromellose, macrogol , oxyde ferrique (E172), dioxyde de titane (E171), indigo carmine (E132)

2 mg : Hypromellose, dioxyde de titane (E171), macrogol, oxyde ferrique rouge (E172), oxyde ferrique jaune (E172)

Aspect de Ropinirole Viatris et contenu de l’emballage extérieur
Votre médicament se présente sous la forme de comprimés pelliculés.

Ropinirole Viatris 0,25 mg: Comprimés pelliculés de forme biconvexe, oblongs, comportant une barre de cassure des deux côtés et de couleur blanche à blanc cassé.
Ropinirole Viatris 0,5 mg: Comprimés pelliculés de forme biconvexe, oblongs, comportant une barre de cassure des deux côtés et de couleur jaune.
Ropinirole Viatris 1 mg: Comprimés pelliculés de forme biconvexe, oblongs, comportant une barre de cassure des deux côtés et de couleur verte.
Ropinirole Viatris 2 mg: Comprimés pelliculés de forme biconvexe, oblongs, comportant une barre de cassure des deux côtés et de couleur rose pâle.

Le comprimé peut être divisé en demi-doses égales.

Ropinirole Viatris est disponible en récipient multidose en HDPE de 12 (0,25 mg seulement), 21, 28, 84 et 126 comprimés, muni d'une fermeture résistant aux enfants (PP).

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
Viatris GX
Terhulpsesteenweg 6A
B-1560 Hoeilaart

Fabricant
Mc Dermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlande
Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Hongrie
Viatris Germany GmbH, Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1, Bad Homburg v. d. Hoehe, Hessen, 61352 Allemagne

Numéros de l'autorisation de mise sur le marché
Ropinirole Viatris 0,25mg: BE315594
Ropinirole Viatris 0,5mg: BE315603
Ropinirole Viatris 1mg: BE315612
Ropinirole Viatris 2mg: BE315621

Mode de délivrance
Sur prescription médicale

Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:
BE 'Ropinirole Viatris 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimés pelliculés'
DK 'Ropinirol Viatris 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg'
FR 'Ropinirole Viatris 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimé pelliculé'
DE 'Ropinirol dura 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg Filmtabletten'
PT 'Ropinirol Mylan 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg'
SK 'Ropinirol Viatris 1 mg/ 2 mg'
NL 'Ropinirol Viatris 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg filmomhulde tabletten'
UK 'Ropinirole 0.25/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg film-coated tablets'

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 06/2026.

Date d'approbation d'AFMPS : 07/2026.