

BIJSLUITER

NOBILIS EDS

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland
vertegenwoordigd door
MSD Animal Health BVBA
Lynx Binnenhof 5
1200 Brussel

Verdeler: MSD Animal Health BVBA

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

NOBILIS EDS

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Per dosis:

Geïnactiveerd Egg Drop Syndrome '76 virus, stam BC14, hoeveelheid virus om $\geq 6,5 \log_2$ HI (haemagglutinatie inhibitie) eenheden op te wekken ad 0,5 ml pro dos. un.

4. INDICATIE(S)

Actieve immunisatie van toekomstige legkippen en moederdieren tegen Egg Drop Syndrome '76 virus.

Aanvang van bescherming: onbepaald.

Duur van bescherming: 1 legperiode.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Geen gekend.

6. BIJWERKINGEN

Bij vaccinatie van gezonde dieren worden geen klinische symptomen opgemerkt.

Tijdelijke zwelling kan soms voorkomen op de plaats van injectie.

7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Kip (toekomstige legkippen en moederdieren).

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Dosis: 0,5 ml per dier.

Toedieningswijze: s.c. of i.m. inspuiten.

Entschema:

Nobilis EDS wordt ingespoten op een leeftijd van 16 - 20 weken, minstens 4 weken vóór het begin van de leg.

9. AANWIJZING VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Om een goede immunrespons te verzekeren, dient gedurende 2 weken na de vaccinatie stress zoveel mogelijk vermeden te worden.

10. WACHTTIJD

Vlees: 0 dagen.

Eieren: 0 dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Donker bij 2 tot 8° C. Voorkom bevriezen.

Houdbaarheidstermijn

24 maand houdbaar. Een aangeprikte fles onmiddellijk opgebruiken.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Vaccineer enkel gezonde dieren. Gebruik enkel steriele naalden en spuitjes. Vóór gebruik het vaccin op kamertemperatuur laten komen (15 - 25° C).

Aan de gebruiker:

Dit product bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelfinjectie kan resulteren in erge pijn en zwelling, vooral wanneer geïnjecteerd werd in een gewricht of vinger, en zou in zeldzame gevallen kunnen resulteren in verlies van de vinger wanneer er geen onmiddellijke medische aandacht aan gegeven wordt. Wanneer U accidenteel geïnjecteerd bent met dit product, win dan onmiddellijk medisch advies in, zelfs wanneer een zeer klein volume geïnjecteerd werd, en neem de bijsluiter mee.

Wanneer pijn aanwezig blijft gedurende meer dan 12 uur na medisch onderzoek, win dan opnieuw medisch advies in.

Aan de geneesheer:

Dit product bevat minerale olie. Zelfs wanneer kleine hoeveelheden geïnjecteerd werden, kan accidentele injectie met dit product intense zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischaemische necrose en zelfs het verlies van een vinger. Gespecialiseerd, ONMIDDELIJK, medisch ingrijpen is noodzakelijk en kan vroege incisie en irrigatie van het geïnjecteerde gebied vereisen, vooral wanneer het een pees of zacht weefsel van de vinger betreft.

**13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu terecht zou komen.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

03/2013.

15. OVERIGE INFORMATIE

Op diergeneeskundig voorschrift.

BE-V197014 (Glas)

BE-V304692 (PET)