

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Furacine Soluble Dressing 2 mg/g pommade Furacine 2 mg/ml Solution pour application cutanée nitrofurural

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 à 7 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Furacine et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Furacine
3. Comment utiliser Furacine
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Furacine
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE FURACINE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

Furacine Solution pour application cutanée et Furacine Soluble Dressing (pommade hydrosoluble) sont des agents anti-infectieux cutanés à base de nitrofurural, à usage externe.

Furacine pommade et Furacine Solution pour application cutanée sont utilisées:

- pour traiter les infections bactériennes des plaies et des brûlures
- pour éviter les infections bactériennes des plaies et des brûlures
- en cas de transplantations cutanées

Furacine Solution pour application cutanée, diluée avec de l'eau stérile, est également utilisée en instillation vésicale.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 à 7 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER FURACINE

N'utilisez jamais Furacine

Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Furacine.

Autres médicaments et Furacine

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Pas d'interaction connue avec d'autres médicaments.

Furacine avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Furacine n'exerce aucun effet ou qu'un effet négligeable sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

3. COMMENT UTILISER FURACINE

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Usage externe.

Voie cutanée.

Plaies et brûlures

Le fait de choisir la pommade ou la solution ne change rien, les deux formes agissent de la même façon.

Comment les utiliser:

- Plaies infectées:
Après nettoyage de la plaie, appliquez *Furacine Soluble Dressing* directement sur la plaie. *Furacine Soluble Dressing* peut également être appliquée d'abord sur une compresse de gaze qui sera posée sur la plaie.

Pour appliquer *Furacine Solution pour application cutanée*, utilisez un morceau de gaze. Pour appliquer des compresses, versez d'abord dessus un peu de *Furacine Solution* pour application cutanée dans une petite coupelle propre; ne reversez jamais la solution restante dans le flacon. *Furacine Solution* pour application cutanée peut devenir trouble si elle est exposée à des températures basses. Dans ce cas, placez le flacon dans un bain-marie à environ 60°C jusqu'à ce que la solution redevienne limpide. Conservez ensuite le flacon dans un lieu moins froid.

- Brûlures:
Dans tous les cas, faites d'abord couler de l'eau froide pendant 15 minutes pour limiter la brûlure. Ensuite, appliquez *Furacine Soluble Dressing* ou *Furacine Solution* pour application cutanée de la même manière comme indiqué sur les plaies infectées. Les brûlures sévères doivent être traitées à l'hôpital.

Fréquence et durée:

- Pour les plaies infectées, on applique généralement *Furacine* deux fois par jour. Si aucune amélioration n'est apparue après 5 à 7 jours de traitement, consultez un médecin.
- Pour les brûlures, n'appliquez pas plus d'une fois par jour. Le médecin décidera à quelle fréquence le pansement doit être renouvelé.

Instillation vésicale

Utilisez uniquement Furacine Solution pour application cutanée diluée. Suivez scrupuleusement les instructions de votre médecin.

Si vous avez utilisé plus de Furacine que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop de Furacine Soluble Dressing ou Furacine Solution, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245). Furacine est à usage externe. L'ingestion de Furacine par la bouche peut entraîner des nausées, des vomissements et des maux de tête. Consultez immédiatement un médecin. Il/Elle envisagera éventuellement de faire vomir le patient ou d'effectuer un lavage d'estomac.

Si vous oubliez d'utiliser Furacine

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Furacine

Si vous souhaitez arrêter l'utilisation de Furacine, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Environ 1 personne sur 100 ne supporte pas bien Furacine. La peau de la zone où le produit a été appliqué rougit, picote et démange. Si vous constatez ces signes, arrêtez directement l'application de Furacine et prenez contact avec votre médecin.

L'utilisation de nitrofurantoin peut entraîner une prolifération bactérienne ou fongique, ce qui peut donner lieu à une infection secondaire.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

Belgique :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
Avenue Galilée 5/03 - 1210 BRUXELLES
Boîte Postale 97 - 1000 BRUXELLES Madou

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@afmps.be

Luxembourg :

Direction de la Santé
Division de la Pharmacie et des Médicaments
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
Tél.: (+352) 2478 5592
e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link pour le formulaire : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER FURACINE

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Furacine Soluble Dressing et Furacine Solution pour application cutanée : à conserver à température ambiante (15-25°C). Furacine Solution pour application cutanée exposée à une température trop faible peut devenir trouble. La solution redevient limpide après réchauffement de la bouteille au bain-marie à environ 60°C.

N'utilisez pas Furacine Soluble Dressing après la date de péremption indiquée sur l'emballage, l'étiquette et dans le pli du tube après les lettres EXP, n'utilisez pas Furacine Solution pour application cutanée après la date de péremption indiquée sur l'emballage et l'étiquette après les lettres EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Furacine

- La substance active est le nitrofurale 2 mg/g ou 2 mg/ml.
- Les autres composants sont
 - o Furacine Soluble Dressing : macrogol 300, 1000, 3000.
 - o Furacine Solution pour application cutanée: macrogol 300, 1500 et eau purifiée.

Aspect de Furacine et contenu de l'emballage extérieur

Furacine Soluble Dressing est une pommade jaune en tubes de 15 g, 28 g et 30 g ou en poches en aluminium de 375 g (emballage clinique).

Furacine Solution pour application cutanée est un liquide jaune transparent en flacons de verre brun de 200 ml, 250 ml et 500 ml (emballage clinique) ou deux flacons de 250 ml (emballage clinique).

Numéro d'Autorisation de mise sur le marché

Furacine Soluble Dressing - tube: BE089966

Furacine Soluble Dressing - poche: BE300876

Furacine Solution pour application cutanée: BE001547

Mode de délivrance : délivrance libre.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Limacom nv

Ginderoverstraat 32

3590 Diepenbeek

Fabricant

Sanico N.V./S.A.
IZ 4 – Veedijk 59
2300 Turnhout

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 09/2021.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 10/2021.