

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Furacine Soluble Dressing 2 mg/g Salbe Furacine 2 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut Nitrofurural

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen .

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 bis 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Furacine und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Furacine beachten?
3. Wie ist Furacine anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Furacine aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST FURACINE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut und Furacine Soluble Dressing (wasserlösliche Salbe) sind Mittel zur Bekämpfung von Infektionen der Haut auf der Basis von Nitrofurural, die für eine externe Anwendung bestimmt sind.

Furacine-Salbe und Furacine-Lösung werden angewandt:

- bei bakteriellen Infektionen von Verletzungen und Verbrennungen
- zur Vermeidung bakterieller Infektionen von Verletzungen und Verbrennungen
- bei Hauttransplantationen

Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut, verdünnt mit sterilem Wasser, wird ebenfalls als Blasenspülung angewandt.

Wenn Sie sich nach 5 bis 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON FURACINE BEACHTEN?

Furacine darf nicht angewendet werden,

Wenn Sie allergisch gegen Nitrofurural oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Furacine anwenden.

Anwendung von Furacine zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kurzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Anwendung von Furacine zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Furacine übt keinen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen, aus.

3. WIE IST FURACINE ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Äusserliche Anwendung
Anwendung auf der Haut.

Verletzungen und Verbrennungen

Sie können die Salbe oder die Lösung anwenden. Beide wirken gleich.

Anwendungsweise:

- Infizierte Wunden:

Nach dem Säubern der Wunde die *Furacine Soluble Dressing* direkt auf der Wunde anbringen. Furacine Soluble Dressing kann auch erst auf einem Verband, der auf die Wunde gelegt wird, angebracht werden.

Vor dem Auftragen der *Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut* erst ein Stück Verband benutzen. Bei der Benutzung von Druckverbänden müssen letztere in eine saubere Schale mit ein wenig Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut übergießen. Die übrig bleibende Lösung (den Überschuss) nicht wieder in die Flasche schütten.

Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut kann bei niedriger Temperatur trüb werden. Setzen Sie in solchem Fall die Flasche in ein Warmwasserbad von zirka 60°C, bis die Lösung wieder hell wird. Bewahren Sie die Flasche danach an einer kühleren Ort auf.

- Verbrennungen:

Der erste Schritt bei Verbrennungen: 15 Minuten lang mit kaltem Wasser spülen, um das Einbrennen einzuschränken. Dann Furacine Soluble Dressing oder Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut in der gleichen Weise wie für infizierte Wunden anwenden. Ernsthafte Verbrennungen müssen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Häufigkeit und Dauer der Behandlung:

- Auf infizierte Wunden wird meist zweimal täglich Furacine aufgetragen. Wenn nach 5 bis 7 Behandlungstagen noch keine eindeutige Besserung aufgetreten ist, müssen Sie sich an den Arzt wenden.
- Bei Verbrennungen nicht öfter als einmal täglich auftragen. Der Arzt entscheidet, wie häufig der Verband gewechselt werden muss.

Blasenspülung

Nur verdünnte Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut anwenden. Folgen Sie strikt den Anweisungen Ihres Arztes.

Wenn Sie eine größere Menge von Furacine angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Furacine Soluble Dressing oder Furacine Oplossing angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245). Furacine ist für externen Gebrauch bestimmt. Wurde Furacine oral eingenommen, können Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen die Folge sein. Sofort einen Arzt aufsuchen. Der Arzt kann den Patienten zum Erbrechen bringen oder eine Magenspülung vornehmen.

Wenn Sie die Anwendung von Furacine vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Furacine abbrechen

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie denken die Anwendung abzubrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Ungefähr 1 Person von 100 verträgt Furacine nicht gut. Die Haut wird dann rot, sticht und juckt an der Stelle, an der das Produkt angebracht wurde. In einem solchen Fall ist unverzüglich mit der Anwendung von Furacine aufzuhören und Verbindung zum Arzt aufzunehmen.

Das Gebrauch von Nitrofurantoin kann Überwucherung von Bakterien oder Pilzen verursachen, was zu einer sekundären Infektion führen kann.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über

Belgien:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz
Avenue Galilée - Galileelaan 5/03 - 1210 BRÜSSEL
Postfach 97 - 1000 BRÜSSEL Madou

Website: www.notifierunefetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg:

Direction de la Santé

Division de la Pharmacie et des Médicaments

20, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg-Hamm

Tél.: (+352) 2478 5592

e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link pour le formulaire : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST FURACINE AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Furacine Soluble Dressing und Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut: bei Zimmertemperatur (15-25°C) aufbewahren. Wird Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut zu kalt aufbewahrt, kann die Lösung trüb werden. In diesem Fall die Flasche in ein Warmwasserbad von ungefähr 60°C stellen, bis die Lösung wieder heller geworden ist.

Sie dürfen Furacine Soluble Dressing nach dem auf dem Umkarton, dem Etikett und im Falz der Tube nach EXP angegebenen Verfalldatum, und Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut nach der auf dem Umkarton und dem Etikett nach EXP angegebenen Verfalldatum, nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Furacine enthält

- Der Wirkstoff ist : Nitrofurural 2 mg/g oder 2 mg/ml.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - o Furacine Soluble Dressing: Macrogol 300, 1000, 3000.
 - o Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut: Macrogol 300, 1500 und gereinigtes Wasser.

Wie Furacine aussieht und Inhalt der Packung

Furacine Soluble Dressing ist eine gelbe Salbe in Tuben von 15 g, 28 g und 30 g oder aluminium Beuteln von 375 g (Krankenhaus).

Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut ist eine klare gelbe Flüssigkeit in braunen Glasflaschen von 200 ml, 250 ml und 500 ml (Krankenhaus) oder zwei Glasflaschen von 250 ml (Krankenhaus).

Zulassungsnummer:

Furacine Soluble Dressing - Tube: BE089966

Furacine Soluble Dressing - Beutel: BE300876

Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut: BE001547

Art der Abgabe: freie Abgabe.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Limacom nv
Ginderoverstraat 32
3590 Diepenbeek

Hersteller

Sanico N.V./S.A.
IZ 4- Veedijk 59
B-2300 Turnhout

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 09/2021.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 10/2021.