

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg Tabletten Bethanecholchlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg Tabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg Tabletten beachten?
3. Wie ist MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg Tabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg Tabletten und wofür wird es angewendet?

Arzneimittel auf Basis von Bethanechol zur Förderung der Blasenaktivität. Behandlungsanzeigen:

- Harnverhalt nach einem chirurgischen Eingriff.
- Muskelschwäche der Blase bei Erkrankungen des Nervensystems.
- Ergänzende Behandlung für eine Rehabilitation der Blase.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg Tabletten beachten?

MYOCHOLINE-GLENWOOD darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Bethanecholchlorid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie an einem Verschluss der Harnwege oder des Verdauungstrakts leiden.
- wenn Sie an Asthma bronchiale leiden oder wenn Sie zu Asthmaanfällen neigen.
- wenn die Nähte nach einer Operation noch nicht ausreichend verheilt sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie MYOCHOLINE-GLENWOOD einnehmen.

- Wenn Sie an Asthma bronchiale leiden oder wenn bei Ihnen in der Vergangenheit allergische Reaktionen mit Bronchospasmen aufgetreten sind.
- Wenn Sie an einem Magengeschwür leiden.
- Wenn Ihre Koronararterien beschädigt sind.
- Wenn Sie an einer Schilddrüsenüberfunktion leiden.
- Wenn Ihr Blutdruck erhöht ist.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, wenn einer dieser Warnhinweise auf Sie zutrifft oder in der Vergangenheit zugetroffen hat.

Einnahme von MYOCHOLINE-GLENWOOD zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

- Verstärkung der Wirkung durch Parasympathomimetika (Pilocarpin, Physostigmin, Neostigmin), Sympatholytika (Dibenamin) und Arzneimittel, die den Blutdruck senken.
- Aufhebung der Wirkung durch Parasympatholytika (Atropin, Antihistaminika, Antidepressiva) und Sympathomimetika.

Einnahme von MYOCHOLINE-GLENWOOD zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Zur Vorbeugung von Übelkeit und Erbrechen nehmen Sie MYOCHOLINE-GLENWOOD am besten außerhalb der Mahlzeiten ein.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

- MYOCHOLINE-GLENWOOD darf während der Schwangerschaft nicht eingenommen werden.
- Während der Stillzeit wird von der Einnahme von MYOCHOLINE-GLENWOOD abgeraten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

3. Wie ist MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg Tabletten einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

MYOCHOLINE-GLENWOOD ist zum Einnehmen und wird im Allgemeinen folgendermaßen verabreicht:

Anwendung bei Erwachsenen

- Zu Beginn und als Test beträgt die empfohlene Dosis 5 mg MYOCHOLINE- GLENWOOD (1/2 Tablette). Wiederholen Sie diese Einnahme 1 bis 2 Mal mit einer Pause von einer halben Stunde, bis die gewünschte Wirkung eintritt. Nehmen Sie die wirksame Dosis dann 3 oder 4 Mal täglich ein. Schlucken Sie die Tabletten mit ausreichend Flüssigkeit (zum Beispiel einem Glas Wasser).
- Unter ärztlicher Kontrolle kann diese Dosis auf 20, 30 und sogar 50 mg (2, 3 oder 5 Tabletten) 3 oder 4 Mal täglich erhöht werden.

- Die Höchstdosis beträgt 200 mg täglich.
- Zur Vorbeugung von Übelkeit oder Erbrechen nehmen Sie MYOCHOLINE-GLENWOOD am besten außerhalb der Mahlzeiten ein.

Anwendung bei Kindern

- Die empfohlene Dosis beträgt 0,3 bis 0,6 mg/kg Körpergewicht pro Tag, verteilt auf 3 oder 4 Einnahmen.

Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie lange Sie MYOCHOLINE-GLENWOOD einnehmen müssen. Brechen Sie Ihre Behandlung nicht frühzeitig ab, denn sonst wird die erwünschte Wirkung nicht erreicht.

Wenn Sie eine größere Menge von MYOCHOLINE-GLENWOOD eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel MYOCHOLINE-GLENWOOD eingenommen haben, nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Antigiftzentrum (070/245 245) auf.

Die Symptome sind:

- Übermäßiges Schwitzen, Sehstörungen, Bauchkrämpfe, Erregtheit, Panikanfälle, vermehrte Schleimabsonderung aus den Bronchien und Bronchialkrämpfe, Verzögerung des Herzrhythmus, Blutdruckabfall, Muskelkrämpfe und -zuckungen und eventuell Muskelschwäche oder -lähmung, Konvulsionen, Atemlähmung oder -stillstand, Lungenödem und Koma.

Behandlung:

- Atropinsulfat ist das Gegenmittel erster Wahl von MYOCHOLINE-GLENWOOD.
- Schwere Unverträglichkeit oder akute Vergiftung wird mit einer sofortigen Injektion (am besten in die Venen) von 0,5 mg bis 1 mg Atropinsulfat behandelt.

Wenn Sie die Einnahme von MYOCHOLINE-GLENWOOD vergessen haben

- Nehmen Sie die vergessenen Tabletten so schnell wie möglich ein, denken Sie dabei aber daran, wie viele Tabletten Sie pro Tag höchstens einnehmen dürfen.
- Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von MYOCHOLINE-GLENWOOD abbrechen

- Sie dürfen die Behandlung nicht in Eigeninitiative abbrechen: Wenden Sie sich stets an Ihren Arzt, wenn Sie die Behandlung abbrechen wollen.
- Die Blasenentleerung kann wieder gestört sein, wodurch ein Rest von Harn in der Blase verbleibt (= Harnverhalt).

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es sind Anzeichen einer cholinergen Reizung: Übelkeit, Erbrechen, Blutstauung im Gesicht, übermäßiges Schwitzen, übermäßiger Speichelfluss, Tränenfluss, Aufstoßen, Stuhl- oder Harninkontinenz, Bronchospasmen, Verzögerung des Herzrhythmus, Hypotonie.

Einteilung nach Häufigkeit und Schwere und nach Organsystemklasse:

- Erkrankungen des Nervensystems: die Symptome sind auf die eine cholinerge Reizung zurückzuführen.
- Augenerkrankungen: Tränenfluss.
- Herzerkrankungen: Verzögerung des Herzrhythmus (Bradykardie), niedriger Blutdruck (Hypotonie).
- Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums: Bronchospasmen.
- Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: übermäßiger Speichelfluss, Übelkeit, Erbrechen, Aufstoßen, Stuhlinkontinenz.
- Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Blutstauung im Gesicht, übermäßiges Schwitzen.
- Erkrankungen der Nieren und Harnwege: Harninkontinenz.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über

Belgien:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be

Abteilung Vigilanz

Website: www.notifierunefetindesirable.be

E-Mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg:

Centre Régional de pharmacovigilance de Nancy oder
Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la
pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in
Luxemburg

Website : www.guichet.lu/pharmakovigilanz

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg Tabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was MYOCHOLINE-GLENWOOD enthält

- Der Wirkstoff ist: Bethanecholchlorid, 10 mg.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Maisstärke, Talk und Calciumsulfat-Dihydrat.

Wie MYOCHOLINE-GLENWOOD aussieht und Inhalt der Packung

Weiße Tabletten mit einer Bruchkerbe und Prägung „MYO10“.

MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg Tabletten ist in Blisterpackungen mit 50 Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Glenwood GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse
Arabellastraße 17
81925 München
Deutschland

Zulassungsnummer:

BE: BE269997

LU: 2005080045

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 03/2025.