

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **CLARITHROMYCINE TEVA 250 mg FILMOMHULDE TABLETTE CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg FILMOMHULDE TABLETTE clarithromycine**

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Clarithromycine Teva en waarvoor wordt dit geneesmiddel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit geneesmiddel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Clarithromycine Teva en waarvoor wordt dit geneesmiddel ingenomen?**

Clarithromycine Teva behoort tot de groep geneesmiddelen die men macrolide antibiotica noemt. Het stopt de groei van bepaalde bacteriën.

Clarithromycine Teva wordt gebruikt om verscheidene infecties te behandelen zoals:

- infecties van de luchtwegen, bijv. bronchitis en longontsteking.
- infecties van de keel en de sinussen bijv. keelontsteking en sinusitis.
- infecties van de huid en weke delen.
- infectie met *Helicobacter pylori* geassocieerd met een darmzweer.

Clarithromycine Teva is geïndiceerd bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

#### **2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit geneesmiddel NIET gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel of voor andere macrolide antibiotica zoals erythromycine, azithromycine. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
  - astemizol of terfenadine of (voor hooikoorts of allergie), cisapride of domperidon (gebruikt voor maagproblemen), of pimozide (geneesmiddel gebruikt bij bepaalde psychische stoornissen), want inname van deze geneesmiddelen in combinatie met Clarithromycine Teva kan het hartritme ernstig verstoren. Raadpleeg uw arts voor advies over alternatieve geneesmiddelen.
  - andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat zij ernstige verstoringen van het hartritme kunnen veroorzaken.
  - lomitapide (gebruikt om het cholesterolgehalte te verlagen).
  - ticagrelor (een bloedverdunner).

- ranolazine (gebruikt voor de behandeling van angina pectoris).
- ergotalkaloïden, bijvoorbeeld ergotamine- of dihydroergotaminetabletten of als u ergotamine-inhalatoren gebruikt tegen migraine. Raadpleeg uw arts voor advies over alternatieve geneesmiddelen.
- simvastatine of lovastatine (gebruikt om verhoogde bloedvetten zoals cholesterol en triglyceriden te verlagen).
- colchicine (gebruikt voor de behandeling van jicht).
- orale midazolam (bij angst of om te helpen slapen).
- Als u of iemand in uw familie een geschiedenis van hartritmestoornissen heeft (ventriculaire hartritmestoornissen inclusief Torsade de Pointes) of van afwijkingen van het electrocardiogram (ECG, elektrische opname van het hart), ook genoemd het lang QT syndroom.
- U heeft een abnormaal laag kalium- of magnesiumgehalte in uw bloed (hypokaliëmie of hypomagnesiëmie).
- U hebt een ernstige aandoening van lever en/of nieren.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel?**

Neem contact met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt:

- als u allergisch bent aan de antibiotica lincomycine of clindamycine.
- als u leverproblemen hebt.
- als u nierproblemen hebt.
- als u bepaalde hartproblemen hebt (ziekte van de kransslagaders, ernstig hartfalen, abnormaal hartritme of een klinisch relevante trage hartslag).
- als u een schimmelinfectie hebt of als u er gevoelig voor bent (bijv. spruw).
- als u spierproblemen hebt, bekend als myasthenia gravis.
- als u geneesmiddelen inneemt die uw bloedsuikergehalte verlagen (orale antidiabetica), of insuline.
- als u intraveneus of oromucosaal (in de mond geabsorbeerd) midazolam moet krijgen.
- als u andere macrolide antibiotica gebruikt, evenals lincomycine en clindamycine.
- als u herhaaldelijk infecties met bacteriën of schimmels heeft. Raadpleeg uw arts voor advies.
- als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Als u symptomen van **leverfunctiestoornissen** krijgt, zoals **anorexia (verminderde eetlust), vergeling van de huid of het oogwit, donkere urine, jeuk of een gevoelige onderbuik, stop dan met het innemen van Clarithromycine Teva en waarschuw onmiddellijk uw arts.**

Als u tijdens of na de toediening van Clarithromycine Teva **ernstige of langdurige diarree** krijgt, **vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts**, omdat dit een symptoom kan zijn van ernstiger aandoeningen zoals pseudomembraneuze colitis of *Clostridioides difficile* associated diarrhoea.

Als u een allergische reactie vertoont (bv. **ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid, zwelling van het gezicht of de keel, huiduitslag, piepende of blaarvorming**), **stop dan met het innemen van Clarithromycine Teva en neem onmiddellijk contact op met een arts.**

Behandeling met claritromycine bij *Helicobacter pylori*-infecties kan leiden tot selectie van bacteriën waartegen claritromycine ondoeltreffend is.

Langdurig gebruik van antibiotica kan leiden tot hernieuwde infectie (superinfectie) met niet-gevoelige organismen. De symptomen van een mogelijke herinfectie zijn koorts en verslechtering van uw algemene toestand. Als een superinfectie optreedt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

## **Kinderen**

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar (met een gewicht van minder dan 30 kg). Andere farmaceutische vormen zijn meer geschikt voor deze patiënten.

## **Neemt u nog andere geneesmiddelen in?**

Gebruikt u naast Clarithromycine Teva nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

## **Neem geen Clarithromycine Teva als u de volgende geneesmiddelen inneemt**

- ergotamine of dihydroergotamine (geneesmiddelen tegen migraine).
- terfenadine of astemizol (gebruikt bij de behandeling van hooikoorts en andere allergieën).
- pimozide (gebruikt om mentale stoornissen te behandelen).
- cisapride of domperidon (gebruikt om maagproblemen te behandelen).
- simvastatine, lovastatine of lomitapide (gebruikt bij het verlagen van cholesterol).
- colchicine (gebruikt voor de behandeling van jicht).
- ticagrelor (een bloedverdunner).
- ranolazine (gebruikt voor de behandeling van angina pectoris).
- orale midazolam (geneesmiddel tegen angst of slaapstoornissen).

(zie ook hierboven "Wanneer mag u dit geneesmiddel NIET gebruiken?")

## **Vertel u arts als u één van de volgende inneemt**

- warfarine of een andere bloedverdunner zoals dabigatran, rivaroxaban, apixaban (gebruikt om het bloed te verdunnen).
- disopyramide of quinidine (om hartritmestoornissen te behandelen).
- digoxine (om hartfalen te behandelen).
- carbamazepine, valproaat, fenobarbital of fenytoïne (om epilepsie of bipolaire stoornis, een psychiatrische aandoening, te behandelen).
- theophylline, gebruikt om asthma te behandelen.
- benzodiazepines gebruikt als geneesmiddelen die u slaperig maken bijv. midazolam, triazolam of alprazolam.
- rifabutine, rifampicine, rifapentine of aminoglycosiden (bijv. gentamicine) (gebruikt om sommige infecties te behandelen).
- ciclosporine, tacrolimus of sirolimus (gebruikt na een orgaantransplantatie).
- atorvastatine of rosuvastatine (geneesmiddelen gebruikt om cholesterol te verlagen).
- efavirenz, nevirapine atazanavir, saquinavir, ritonavir zidovudine of etravirine (gebruikt om patiënten met hiv te behandelen).
- sint-janskruid (een kruidenproduct gebruikt om neerslachtigheid te behandelen).
- fluconazol, itraconazol of ketoconazol (gebruikt tegen schimmelinfecties).
- sildenafil, tadalafil of vardenafil (gebruikt om seksuele disfunctie bij mannen en hoge bloeddruk te behandelen).
- omeprazol (geneesmiddel tegen maagstoornissen).
- insuline, glibenglamide, repaglinide of nateglinide (gebruikt voor de behandeling van diabetes).
- cilostazol (een behandeling voor krampachtige pijn in de benen).
- eletriptan (geneesmiddel tegen migraine).
- aprepitant (om misselijkheid en braken tijdens chemotherapie te voorkomen).
- halofantrine (gebruikt voor de behandeling van malaria).
- quetiapine of ziprasidon (voor behandeling van psychiatrische aandoeningen).
- methylprednisolon (een corticosteroïde gebruikt voor de behandeling van een ontsteking).
- ibrutinib of vinblastine (behandeling van kanker).
- verapamil, amlodipine of diltiazem (gebruikt voor de behandeling van hartklachten).

- tolterodine (geneesmiddel tegen een overactieve blaas).

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Clarithromycine mag niet toegediend worden aan zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven, tenzij de voordelen voor de moeder opwegen tegen de risico's voor de baby. Kleine hoeveelheden clarithromycine kunnen uitgescheiden worden in de moedermelk.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Dit geneesmiddel kan u slaperig, duizelig of verward doen voelen. Rijd NIET of gebruik geen machines indien u dit voelt.

### **Clarithromycine Teva bevat tartrazine, Allurarood en natrium**

Tartrazine (E102) en Allurarood (E129) kunnen allergische reacties veroorzaken.

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per filmomhulde tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

## **3. Hoe neemt u dit geneesmiddel in?**

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De tabletten moeten bij voorkeur ingenomen worden met een glas water. U kunt Clarithromycine Teva met of zonder voedsel innemen, wat u verkiest.

Tenzij anders voorgeschreven door uw arts, is de geadviseerde dosering:

### **Volwassenen inclusief ouderen**

Voor infecties ter hoogte van de luchtwegen, de keel, de sinussen, de huid en de weke delen

De geadviseerde dosering is 250 mg clarithromycine 2 maal per dag. Uw arts kan deze dosis verhogen tot 500 mg clarithromycine 2 maal per dag bij ernstige infecties. De gebruikelijke duur van de behandeling is 6 tot 14 dagen. De behandeling moet minstens nog 2 dagen voortgezet worden nadat de symptomen verdwenen zijn.

### **Volwassenen**

Voor de behandeling van Helicobacter pylori-infecties geassocieerd met darmzweren

Clarithromycine moet genomen worden in een dosis van 500 mg 2 maal per dag, in combinatie met andere geneesmiddelen die *Helicobacter pylori* behandelen.

Uw arts beslist over de beste behandelingscombinatie voor u. Indien u niet zeker bent over welk geneesmiddel in te nemen en wanneer u het geneesmiddel moet nemen, praat dan met uw arts.

### **Patiënten met lever- of nierproblemen**

Indien u lijdt aan lever- of ernstige nierproblemen, kan uw arts de dosis verlagen. Clarithromycine Teva dient niet langer dan 14 dagen gebruikt te worden wanneer u deze problemen heeft.

### **Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar**

Clarithromycine Teva is niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar, maar er bestaan andere farmaceutische vormen, bijvoorbeeld orale suspensies, die uw arts zal voorschrijven voor kinderen jonger dan 12 jaar.

### **Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar ouder dan 12 jaar**

Voor infecties ter hoogte van de luchtwegen, de keel, de sinussen, de huid en de weke delen

De aanbevolen dosering is 250 mg clarithromycine 2 maal per dag. Uw arts kan deze dosis verhogen tot 500 mg clarithromycine 2 maal per dag bij ernstige infecties. De gebruikelijke duur van de behandeling is 6 tot 14 dagen. De behandeling moet minstens nog 2 dagen voortgezet worden nadat de symptomen verdwenen zijn.

### **Heeft u te veel van dit geneesmiddel ingenomen?**

Indien u (of iemand anders) een heleboel tabletten in één keer heeft ingenomen of indien u denkt dat een kind de tabletten heeft ingenomen, contacteer dan onmiddellijk de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Een overdosis kan braken of maagpijn veroorzaken.

Neem deze bijsluiter, eventueel overblijvende tabletten en de verpakking mee naar uw arts, apotheker of ziekenhuis zodat zij weten welk geneesmiddel werd ingenomen.

### **Bent u vergeten dit geneesmiddel in te nemen?**

Wanneer u bent vergeten een tablet in te nemen, neem dan de tablet zo snel mogelijk alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de resterende doses op het juiste tijdstip.

### **Als u stopt met het innemen van dit geneesmiddel**

Stop niet met uw geneesmiddel omdat u zich beter voelt. Het is belangrijk dat u de voorgeschreven doses beëindigt, anders kan de aandoening terugkomen en kan dit geneesmiddel minder effectief zijn de volgende keer dat u het moet gebruiken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

**Als u een van de volgende ernstige bijwerkingen bemerkt, stop dan onmiddellijk met het innemen van Clarithromycine Teva en neem contact op met een arts:**

**Soms** (kan tot 1 op de 100 personen treffen):

- huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, flauwvallen of zwelling van het gezicht en de keel.** Dit is een teken dat u mogelijk een allergische reactie heeft ontwikkeld. De frequentie van angio-oedeem (zwelling van gezicht en/of keel) en ernstige acute allergische reacties (anafylactische reacties) is niet bekend.

**Niet bekend** (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

- ernstige of langdurige diarree**, die bloed of slijm kan bevatten. Diarree kan langer dan twee maanden na de behandeling met claritromycine optreden; in dat geval moet u toch contact opnemen met uw arts.
- geel worden van de huid (geelzucht), huidirritatie, bleke ontlasting, donkere urine, gevoelige buik of gebrek aan eetlust**. Dit kunnen tekenen zijn dat uw lever niet goed werkt.
- hevige pijn in de buik en rug** veroorzaakt door een ontsteking van de alvleesklier.
- ernstige huidreacties zoals blaarvorming op de huid, mond, lippen, ogen en genitaliën** (symptomen van een zeldzame allergische reactie die Stevens-Johnson-syndroom/toxische epidermale necrolyse wordt genoemd).
- ernstige huidreactie zoals een rode, schilferige huiduitslag met bulten onder de huid en blaren** (exanthemateuze pustulose).
- ernstige huidreactie die ernstige ziekte veroorzaakt met huiduitslag, koorts en ontsteking van inwendige organen (DRESS)**.
- een levensbedreigende onregelmatige hartslag** (torsade de pointes).
- spierpijn of spierzwakte**, bekend als rhabdomyolysis (een aandoening die de afbraak van spierweefsel veroorzaakt, wat kan leiden tot nierschade).

### Andere bijwerkingen

#### Vaak: kan tot 1 op de 10 personen treffen

- slaapmoeilijkheden (insomnia).
- aantasting van het smaakvermogen.
- hoofdpijn.
- uitzetten van de bloedvaten (vasodilatatie).
- maagproblemen zoals misselijkheid, braken, maagpijn, gestoorde spijsvertering, diarree.
- gestoorde leverfunctie (te zien aan de bloeduitslagen).
- uitslag, meer zweten.

#### Soms: kan tot 1 op de 100 personen treffen

- Infecties zoals infecties van maag en darmen, ontsteking van de huid veroorzaakt door infecties, orale of vaginale "spruw" (een schimmelinfectie), vaginale bacteriële infectie.
- laag gehalte aan witte bloedcellen (neutropenie en leukopenie) en andere witte bloedcel-aandoeningen (eosinofilie).
- anorexie, verminderde eetlust.
- angst, zenuwachtigheid.
- bewustzijnsverlies, duizeligheid, slaperigheid, bevingen, onwillekeurige bewegingen van de tong, het gezicht, de lippen of de ledematen.
- draaierigheid (vertigo), oorsuizen (tinnitus), gehoorverlies.
- snel, bonkend hart (hartkloppingen), veranderingen in het hartritme of hartstilstand.
- ademhalingsproblemen (astma), neusbloeding.
- longembolie.
- maagklachten zoals een opgeblazen gevoel, constipatie, boeren (oprispingen), winderigheid (flatulentie), brandend maagzuur.
- ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis) of de slokdarm (de buis die je mond met je maag verbindt), pijn aan de aars of het rectum (proctalgie), ontsteking van de mond of de tong, droge mond.
- verhoging van leverenzymen, leverproblemen zoals hepatitis (leverontsteking) of verstoring van de galstroom (cholestase), die vergeling van de huid (geelzucht), bleke ontlasting of donkere urine kunnen veroorzaken.
- jeuk, netelroos.

- rode vlekken op de huid, bedekt met kleine samenvloeiende bultjes (maculopapuleuze huiduitslag).
- blaren op de huid die gevuld zijn met vloeistof (bulleuze dermatitis).
- stijfheid, spierpijn, spierkrampen, gewrichtspijn.
- nierproblemen zoals verhoogde niveaus van eiwitten die normaal door de nieren worden uitgescheiden of verhoogde niveaus van nierenzymen.
- koorts, rillingen, geen energie, vermoeidheid, pijn in de borstkas of gevoel van algemeen onwelzijn.
- abnormale bloedtestresultaten.

**Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald**

- bacteriële huidinfecties (erysipelas of erythrasma).
- ernstige daling van het aantal witte bloedcellen (agranulocytose); symptomen omvatten mogelijk hoge koorts, rillingen, keelpijn, slikproblemen en ontsteking van de mond, neus, keel en genitale of anale streek.
- vermindering van het aantal bloedplaatjes in het bloed (trombocytopenie); de symptomen kunnen een verhoogde bloedingsneiging en petechiën (puntbloedingen in de huid en de slijmvliezen) zijn.
- laag bloedsuikergehalte bij diabeten.
- psychotische stoornis, verwardheid, verandering in realiteitsgevoel, depressie, desoriëntatie, hallucinaties (dingen zien), abnormale dromen.
- zich opgewonden of overprikkeld voelen, wat ongewoon gedrag veroorzaakt (manie).
- convulsie (toevallen).
- verlies of verandering smaak en/of reukzin.
- paresthesieën (tintelend en branderig gevoel in de huid, gevoelloosheid, kriebels).
- doofheid.
- snellere hartslag, ventrikelfibrillatie (ongecoördineerde contractie van de hartspier).
- bloedingen.
- tong- of tandverkleuring.
- acne.
- spierzwakte (myopathie).
- ontsteking van de nier of een onvermogen van de nier om goed te functioneren (u kunt vermoeidheid, zwelling of gezwollenheid in het gezicht, de buik, de dijen of de enkels of problemen met plassen waarnemen), of nierfalen.
- abnormale urinekleur.
- verhoogde stollingstijd (stijging van de INR en verlenging van de protrombinetijd).

**Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie – Postbus 97- 1000 Brussel Madou - Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be) - e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

**5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?**

**Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.**

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?

- De werkzame stof in dit geneesmiddel is clarithromycine. Elke tablet bevat 250, resp. 500 mg clarithromycine.
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn: natriumzetmeelglycolaat, microkristallijne cellulose, povidon (PVP K-30), magnesiumhydroxide, croscarmelose natrium, watervrij colloïdaal silica, stearinezuur, magnesiumstearaat, hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400, tartrazine (E102), allurarood AC (E129), indigokarmijn (E132) en vanilline.

### Hoe ziet Clarithromycine Teva eruit en wat zit er in een verpakking?

- De 250 mg tablet is een gele, ovale filmomhulde tablet, gemerkt met "93" aan één zijde en "7157" aan de andere zijde.
- De 500 mg tablet is een lichtgele, ovale filmomhulde tablet, gemerkt met "93" aan één zijde en "7158" aan de andere zijde.
- 250 mg tabletten: verpakkingen van 7, 8, 10, 12, 14, 14 kalenderverpakking, 16, 20, 30, 100 en 120 tabletten.
- 500 mg tabletten: verpakkingen van 7, 8, 10, 14, 14 kalenderverpakking, 16, 20, 21, 30, 42 en 100 tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

#### Vergunninghouder

Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk

#### Fabrikant

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Nederland  
of Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi Street 13, Debrecen, H-4042, Hongarije  
of Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Duitsland

### Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen

Clarithromycine Teva 250 mg (PVC blisterverpakking): BE294917  
Clarithromycine Teva 250 mg (PVC/PVdC/aluminium blisterverpakking): BE294901  
Clarithromycine Teva 500 mg (PVC blisterverpakking): BE294935  
Clarithromycine Teva 500 mg (PVC/PVdC/aluminium blisterverpakking): BE294926

### Afleveringswijze

Geneesmiddel op medisch voorschrift.



**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 08/2022.**