Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Imonogas 240 mg Weichkapseln

Simeticon

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht
1. Was ist Imonogas und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Imonogas beachten?
3. Wie ist Imonogas anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Imonogas aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Imonogas und wofür wird es angewendet?

Gegen Blähungen (Flatulenzen).
Imonogas wirkt dadurch, dass es die aufgestauten Gasblasen ausscheidet, die das Völlegefühl verursachen. Imonogas ist ein Arzneimittel, das bei Erwachsenen und Jugendlichen über 15 Jahren zur symptomatischen Behandlung von Gasansammlungen (Winden) im Magen, welche die Ursache von aufgeblähtes gefühl (Blähungen) sind.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Imonogas beachten?

Imonogas darf nicht angewendet werden,
wenn Sie allergisch gegen Simeticon oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Imonogas anwenden.

Sie sollten Ihren Arzt aufsuchen, wenn
- Ihr aufgeblähtes Gefühl (Blähungen) sich nach 10-tägiger Behandlung nicht bessern;
- Sie an Verstopfung leiden, die sich nicht bessert.
- Ihre Symptome sich verschlimmern oder wenn neue Symptome auftreten.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Imonogas kann während der Schwangerschaft und der Stillzeit angewendet werden, da die systemische Exposition von Simeticon vernachlässigbar ist.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Imonogas hat keine bekannten Wirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit oder das Bedienen von Maschinen.

3. Wie ist Imonogas anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Wenn Sie 15 Jahre oder älter sind: Nehmen Sie eine Kapsel nach jeder Hauptmahlzeit. Schlucken Sie die Kapsel mit einem großen Glas Wasser. Nehmen Sie nicht mehr als 3 Weichkapseln pro Tag ein. Nehmen Sie die Kapseln nicht mehr als 10 Tage lang ein.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren
Imonogas nicht bei Kindern unter 15 Jahren anwenden.

Wenn Sie eine größere Menge von Imonogas angewendet haben, als Sie sollten
Wenn Sie eine größere Menge von Imonogas haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245 245).

Wenn Sie die Anwendung von Imonogas vergessen haben
Nehmen Sie eine Kapsel nach der nächsten Hauptmahlzeit ein. Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sie müssen die Einnahme von Imonogas abbrechen und sich sofort an Ihren Arzt wenden, wenn Sie Symptome eines Angioödems feststellen, wie eine Schwellung von Gesicht, Zunge oder Rachen, Schluckbeschwerden, Quaddeln und Atembeschwerden.

Folgende unerwünschte Ereignisse sind mit Häufigkeit „nicht bekannt“ berichtet worden, was bedeutet, dass die Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht geschätzt werden kann.

- Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Verstopfung;
- Allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz, Angioödem, Schwellung von Gesicht, Lippen, Rachen und Zunge oder Atembeschwerden.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:
Belgien:
Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
www.afmps.be
Abteilung Vigilanz:
Website: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg:
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg
Website : www.guichet.lu/pharmakovigilanz
Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Imonogas aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Blisterpackung und dem Umkarton nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Imonogas enthält
Der Wirkstoff ist Simeticon. Jede Kapsel enthält 240 mg Simeticon.
Die sonstigen Bestandteile sind Gelatine und Glycerol.

Wie Imonogas aussieht und Inhalt der Packung
Imonogas ist eine durchsichtige Weichgelatinekapsel. Jede Packung enthält 10, 20 oder 30 Kapseln.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer
Kenvue Belgium NV
Michel De Braeystraat 52
2000 Antwerpen

Hersteller
Catalent France Beinheim SA
74 rue Principale
67930 Beinheim, Frankreich
oder
Kenvue Belgium NV
Michel De Braeystraat 52
2000 Antwerpen, Belgien

Zulassungsnummer
BE: BE291383
LU: 2011101314

Verkaufsabgrenzung
Apothekenpflichtig.

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Dänemark: IMOGAS
Schweden: IMOGAZE 240 mg, mjuk kapsel
Norwegen: Imogas 240 mg kapsel, myk

Belgien: IMONOGAS
Luxemburg: IMONOGAS
Island: IMOGAZE 240 mg, mjúk hylki
Spanien: IMONGAS 240 mg, cápsulas blandas

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 07/2025.

Hinweis zur Gesundheitserziehung

Was sollten Sie tun, wenn Sie Verdauungsprobleme haben?

Schwierige Verdauung:
Diese Probleme treten oft auf, wenn Sie:
- zu große Mengen;
- zu reichhaltige Nahrungsmittel zu sich nehmen;
- zu schnell essen, ohne gut zu kauen;
- zu viel Alkohol beim Essen trinken.

Versuchen Sie, diese auslösenden Faktoren zu vermeiden.

Aufgeblasenes Gefühl - Blähungen (Winde):
Manche Nahrungsmittel neigen dazu, Blähungen zu verursachen:
- Nahrungsmittel, die selbst Luft enthalten (zum Beispiel kohlensäurehaltige Getränke, frisches Brot);
- Nahrungsmittel, die große Mengen an Kohlenhydraten enthalten, die nicht resorbiert werden können (zum Beispiel Trockengemüse, Kohl, Rohkost, Zwiebeln).

Versuchen Sie, diese Nahrungsmittel zu vermeiden.

Fragen Sie Ihren Apotheker oder Arzt, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

V9.0_b8.0