

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**Imonogas 240 mg, zachte capsules**
simeticon**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Imonogas en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Imonogas en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tegen opgeblazen gevoel (winderigheid).

Imonogas werkt door het afbreken van de ingesloten gassen die verantwoordelijk zijn voor het opgeblazen gevoel. Imonogas is een geneesmiddel geïndiceerd bij volwassenen en adolescenten ouder dan 15 jaar voor de symptomatische behandeling van abdominale distensie (winderigheid) in de maag verantwoordelijk voor het opgeblazen gevoel.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Raadpleeg uw arts wanneer:

- de abdominale distensie (winderigheid) na 10 dagen behandeling niet beter wordt;
- u aan constipatie lijdt die niet beter wordt.
- je symptomen erger worden, of als er nieuwe symptomen optreden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Omdat de systemische blootstelling aan simeticon verwaarloosbaar is, kan Imonogas worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Imonogas heeft geen bekende effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiters of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Als u 15 jaar of ouder bent: neemt u één capsule op het einde van elke hoofdmaaltijd. Neem de capsule in met een groot glas water. Neem niet meer dan 3 zachte capsules per dag. Neem de capsules niet langer dan 10 dagen in.

Gebruik bij kinderen en jongeren jonger dan 15 jaar

Geef Imonogas niet aan kinderen jonger dan 15 jaar.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van Imonogas heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem een capsule na de volgende hoofdmaaltijd in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U moet stoppen met het innemen van Imonogas en onmiddellijk uw arts raadplegen als u symptomen van angio-oedeem ondervindt, zoals een opgezwollen gezicht, tong of strottenhoofd, slikmoeilijkheden, netelroos en ademhalingsmoeilijkheden.

De volgende bijwerkingen werden gemeld met een frequentie “niet bekend”. Dat wil zeggen dat de frequentie niet kan worden bepaald met de beschikbare gegevens.

- buikpijn, misselijkheid, braken en constipatie;
- allergische reacties, zoals huiduitslag, jeuk, angio-oedeem, zwelling van het aangezicht, de lippen, de keel en de tong of ademhalingsmoeilijkheden.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de buitenverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is simeticon. Iedere capsule bevat 240 mg simeticon.
De andere stoffen in dit middel zijn gelatine en glycerol.

Hoe ziet Imonogas eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Imonogas is een transparante, zachte gelatinecapsule. Een verpakking bevat 10, 20 of 30 capsules.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Kenvue Belgium NV
Michel De Braeystraat 52
2000 Antwerpen

Fabrikant

Catalent France Beinheim SA
74 rue Principale
67930 Beinheim, Frankrijk
of
Kenvue Belgium NV
Michel De Braeystraat 52
2000 Antwerpen, België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE291383

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken: IMOGAS

Zweden: IMOGAZE 240 mg, mjuk kapsel

Noorwegen: Imogas 240 mg kapsel, myk

België: IMONOGAS

Luxemburg: IMONOGAS

IJsland: IMOGAZE 240 mg, mjúk hylki

Spanje: IMONOGAS 240 mg cápsulas blandas

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2025

Advies inzake gezondheidsopvoeding

Wat moet u doen bij maagdarmproblemen?

Moeilijke spijsvertering:

Deze problemen komen vaak voor als u:

- te veel eet;
- te rijk voedsel eet;
- te snel eet, zonder goed te kauwen;
- te veel alcohol drinkt bij de maaltijd.

Probeer deze uitlokkende factoren te vermijden.

Opgeblazen gevoel – Winderigheid:

Bepaalde voedingsmiddelen kunnen meer winderigheid veroorzaken dan andere, omdat:

- ze zelf veel lucht bevatten (bijvoorbeeld bruisdranken, vers brood);
- ze veel koolhydraten bevatten die niet geabsorbeerd kunnen worden (bijvoorbeeld gedroogde groenten, kool, rauwe groenten, uien).

Probeer deze voedingsmiddelen te vermijden.

Vraag uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie.

V9.0_b8.0