

## **ELUDRIL 0,1 %, Mundwasser und Gurgellösung** Chlorhexidindigluconat

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.** Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss ELUDRIL jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 3 bis 4 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist ELUDRIL 0,1 %, Mundwasser und Gurgellösung und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ELUDRIL 0,1 %, Mundwasser und Gurgellösung beachten?
3. Wie ist ELUDRIL 0,1 %, Mundwasser und Gurgellösung anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ELUDRIL 0,1 %, Mundwasser und Gurgellösung aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS IST ELUDRIL 0,1 %, Mundwasser und Gurgellösung UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

#### **Was ist Eludril?**

Eludril ist ein Arzneimittel zur Pflege von Mund und Rachen. Dieses Arzneimittel enthält ein Antiseptikum (Chlorhexidindigluconat), das wirkt, indem es im Mund vorhandene Mikroben bekämpft. Durch die Einschränkung der Ausbreitung der Mikroben werden ferner die Entzündung gelindert und das Infektionsrisiko gesenkt.

#### **Wofür wird es angewendet?**

Dieses Arzneimittel wird angewendet:

- Wenn Sie sich einer Operation im Mund unterziehen müssen. In diesem Fall wird dieses Arzneimittel vor und nach der Operation angewendet.
- Wenn Sie sich einem zahnärztlichen Eingriff unterziehen mussten.
- Wenn Sie eine Infektion haben:
  - am Zahnfleisch,
  - an der Mundschleimhaut.
  - an den Blutgefäßen um die Zähne,
  - im Inneren der Zähne (Zahnhöhlen).
- Wenn Sie Aphthen haben. In diesem Fall wird dieses Arzneimittel angewendet, um eine Superinfektion zu verhindern.

Dieses Arzneimittel darf nur von Erwachsenen und Kindern über 6 Jahre angewendet werden.

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ELUDRIL 0,1 %, Mundwasser und Gurgellösung BEACHTEN?**

#### **ELUDRIL darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff (Chlorhexidindigluconat) oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Kindern unter 6 Jahren.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von ELUDRIL ist erforderlich**

- Vermeiden Sie jeden Kontakt dieses Produkts mit Ihren Augen, Ohren oder mit Ihrer Hirnhaut.
- Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht schlucken.
- Wenn dieses Arzneimittel einem Kind über 6 Jahre verabreicht wird, müssen Sie dafür sorgen, dass das Kind das Arzneimittel nicht schluckt, da dieses Alkohol enthält.
- Ohne Beratung durch Ihren Arzt oder Zahnarzt sollten Sie dieses Arzneimittel nicht über längere Zeit anwenden.
- Dieses Arzneimittel enthält den Farbstoff E 124 (Cochenillerot) und kann allergische Reaktionen auslösen.

### **Bei Anwendung von ELUDRIL mit anderen Arzneimitteln**

Der Wirkstoff in diesem Arzneimittel (Chlorhexidin) ist inkompatibel mit anionischen Substanzen, die im Allgemeinen in den meisten handelsüblichen Zahnpasten enthalten sind. Daher müssen Sie sich die Zähne putzen, bevor Sie Eludril anwenden (spülen Sie sich dazwischen gründlich den Mund), oder das Arzneimittel zu einem anderen Zeitpunkt anwenden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von ELUDRIL**

Dieses Arzneimittel enthält Alkohol und den Farbstoff E 124, auch Cochenillerot genannt (siehe Abschnitt „Besondere Vorsicht bei der Anwendung von ELUDRIL ist erforderlich“).

## **3. WIE IST ELUDRIL 0,1 %, Mundwasser und Gurgellösung ANZUWENDEN?**

### **Dosierung**

- Wenden Sie ELUDRIL immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
- Die übliche Dosis ist 2 bis 3 Mal Gurgeln oder Spülen täglich.

### **Art und Weg der Anwendung**

Putzen Sie sich vor jeder Anwendung die Zähne und spülen Sie den Mund gründlich mit Wasser, bevor Sie Eludril anwenden.

Dieses Arzneimittel ist als Gurgellösung oder Mundspülung anzuwenden:

- Wenn Sie eine Glasflasche haben: Lösen Sie 2 bis 4 Kaffeelöffel Eludril-Lösung in einem halben Glas Wasser (am besten abgekocht) auf und verwenden Sie das als Gurgellösung oder Mundspülung.
- Wenn Sie eine PET-Flasche haben: Messen Sie 10, 15 oder 20 ml Lösung im Messbecher ab, füllen Sie den Becher dann mit lauwarmem Wasser bis zum höchsten Messstrich und verwenden Sie das als Gurgellösung oder Mundspülung.

Behalten Sie die Lösung 30 Sekunden lang im Mund, danach spucken Sie sie wieder aus.

Wiederholen Sie das Gurgeln oder Spülen, bis die gesamte verdünnte Lösung verbraucht ist.

### **Dauer der Behandlung**

- Wenn dieses Arzneimittel nach 3 bis 4 Tagen keine Besserung bringt, wenden Sie sich an einen Arzt.
- Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie lange Sie Eludril anwenden müssen.
- Brechen Sie Ihre Behandlung nicht frühzeitig ab.

### **Wenn Sie eine größere Menge von ELUDRIL angewendet haben, als Sie sollten**

- Wenn Sie dieses Arzneimittel normal als Mundspülung anwenden, gibt es keinen Grund, eine Überdosierung zu befürchten.
- Wenn Sie aber eine große Menge Eludril geschluckt haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt oder dem Giftnotruf (070/245.245) auf.

### **Wenn Sie die Anwendung von ELUDRIL vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann ELUDRIL Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

##### **Die folgenden Nebenwirkungen können auftreten:**

- Hautausschlag, Juckreiz, plötzliches Anschwellen von Gesicht oder Rachen, was Atembeschwerden verursachen kann. Dabei kann es sich um eine allergische Reaktion auf dieses Arzneimittel handeln. Wenn Sie eines dieser Anzeichen feststellen, müssen Sie die Behandlung sofort abbrechen und sich schnell an Ihren Arzt wenden.
- Eine veränderte Geschmacksempfindung.
- Eine braune Verfärbung der Zunge und der Zähne.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### **5. WIE IST ELUDRIL 0,1 %, Mundwasser und Gurgellösung AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25 °C und lichtgeschützt aufbewahren.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

#### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

##### **Was ELUDRIL enthält**

**Der Wirkstoff ist:** Chlorhexidindigluconat (0,1 g auf 100 ml).

**Die sonstigen Bestandteile sind:** Chlorobutanol-Hemihydrat, Ethanol 96 %, Glycerin, Natriumdocusat, etherisches Minzöl, Levomenthol, Cochenillerot (E 124), gereinigtes Wasser.

##### **Wie ELUDRIL aussieht und Inhalt der Packung**

Dieses Arzneimittel ist in Form von Mundspülung und Gurgellösung erhältlich. Jede Packung enthält:

- 1 Glasflasche von 90 ml oder 200 ml
- oder 1 PET-Flasche von 90 ml oder 200 ml mit einem Messbecher.

##### **Pharmazeutischer Unternehmer**

PIERRE FABRE MEDICAMENT  
Les Cauquillous  
81500 Lavar - Frankreich

##### **Hersteller**

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION  
Etablissement PROGIPHARM  
Rue du Lycée  
Zone Industrielle de Cuiry  
45500 GIEN - Frankreich

**Zulassungsnummern**

BE 177116 (Glasflasche)  
BE 262157 (PET-Flasche)

Verkaufsabgrenzung  
Nicht verschreibungspflichtig.

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 02/2022.**

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 01/2022.**

Die folgenden Informationen sind nur für Ärzte bzw. medizinisches Fachpersonal bestimmt: Bei Einnahme großer Mengen des Arzneimittels kann Aktivkohle verabreicht werden.