GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER
LORATADINE TEVA 10 mg TABLETTEN
Loratadin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

WAS IN DIESER PACKUNGSBEILAGE STEHT
1. Was ist Loratadine Teva und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Loratadine Teva beachten?
3. Wie ist Loratadine Teva einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Loratadine Teva aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Loratadine Teva und wofür wird es angewendet?

Der vollständige Name Ihres Arzneimittels ist Loratadine Teva, 10 mg Tabletten.

Was Loratadine Teva ist
Loratadine Teva enthält als Wirkstoff Loratadin, das zur Gruppe der „Antihistaminika“ genannten Arzneimittel gehört.

Wie Loratadine Teva wirkt
Loratadine Teva hilft, Ihre allergischen Symptome zu lindern, indem die Wirkung des Stoffes gehemmt wird, der „Histamin“ genannt wird und der in Ihrem Körper produziert wird, wenn Sie auf etwas allergisch reagieren.

Wann Loratadine Teva angewendet werden sollte
Loratadine Teva lindert die Symptome bei allergischer Rhinitis (z.B. Heuschnupfen) wie Niesen, laufende oder juckende Nase und brennende oder juckende Augen bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren mit einem Gewicht von mehr als 30 kg.

Loratadine Teva kann ebenfalls angewendet werden zur Linderung der Symptome bei Urtikaria (Nesselsucht) wie Juckreiz, Hautrötung sowie Anzahl und Größe der Quaddeln.

Die Wirkung von Loratadine Teva hält einen ganzen Tag an und sollte Ihnen helfen, Ihre normale tägliche Aktivität und Ihren Schlaf fortzusetzen.

Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Loratadine Teva beachten?

Loratadine Teva darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Loratadin oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Loratadine Teva einnehmen, wenn

- Sie an einer Leberfunktionsstörung leiden
- Sie planen, Hautallergietests durchführen zu lassen. Nehmen Sie Loratadine Teva mindestens 2 Tage vor einem dieser Tests nicht ein, da es die Testergebnisse beeinflussen könnte.

Falls einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft (oder Sie sich nicht sicher sind), sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Loratadine Teva einnehmen.

Kinder

Geben Sie Loratadine Teva keinen Kindern, die jünger als 6 Jahre sind oder die weniger als 30 kg wiegen. Andere Darreichungsformen sind für Kinder unter 6 Jahren oder mit einem Körpergewicht von 30 kg oder weniger besser geeignet.

Kinder unter 2 Jahren:
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Loratadine Teva sind nicht erwiesen. Daten sind nicht verfügbar.

Einnahme von Loratadine Teva zusammen mit anderen Arzneimitteln

Die Nebenwirkungen von Loratadine Teva können zunehmen, wenn es zusammen mit Arzneimitteln, die die Leistung von manchen Enzymen die der Arzneimittelstoffwechsel in der Leber regeln, verwendet wird. Jedoch, in klinischen Studien wurde keine Zunahme der Nebenwirkungen von Loratadin mit Produkten die die Leistung dieser Enzyme ändern, gesehen.
Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Einnahme von Loratadine Teva zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Die Wirkungen von alkoholischen Getränken wird durch die Einnahme von Loratadine Teva nicht verstärkt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Als Vorsichtsmaßnahme ist es vorzuziehen, die Verwendung von Loratadine Teva während der Schwangerschaft zu vermeiden. Nehmen Sie Loratadine Teva nicht ein, wenn Sie stillen. Loratadin geht in die Muttermilch über.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

In klinischen Studien, die die Fahrtüchtigkeit beurteilen, wurden keine Behinderungen bei Patienten die Loratadin nutzen, beobachtet. Bei Einnahme in der empfohlenen Dosierung ist nicht damit zu rechnen, dass Loratadine Teva zu Benommenheit führt oder die Aufmerksamkeit herabsetzt. Sehr selten entwickeln jedoch manche Personen Benommenheit, die zu einer Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit oder der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen führen kann.

Loratadine Teva enthält Laktose
Bitte nehmen Sie Loratadine Teva Tabletten erst nach Rucksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist Loratadine Teva einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der Tablette, wenn Sie Schwierigkeiten haben, diese im Ganzen zu schlucken.

Wie viel Sie einnehmen müssen:

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren und mit einem Körpergewicht über 30 kg:
Nehmen Sie einmal täglich 1 Tablette mit einem Glas Wasser, mit oder ohne Nahrung.

Bei einem Körpergewicht von 30 kg oder darunter:
Geben Sie hier kein Loratadine Teva. Andere Darreichungsformen sind für Kinder unter 6 Jahren oder mit einem Körpergewicht von 30 kg oder weniger besser geeignet.

Kinder unter 2 Jahren:
Loratadine Teva wird nicht für Kinder unter 2 Jahren empfohlen.

Erwachsene und Kinder mit schwerer Leberfunktionsstörung:
Erwachsene und Kinder die mehr als 30 kg wiegen:
Nehmen Sie jeden zweiten Tag einmal täglich eine Tablette mit einem Glas Wasser, mit oder ohne Nahrung, ein. Sie sollten jedoch Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal fragen, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Wenn Sie eine größere Menge von Loratadine Teva eingenommen haben, als Sie sollten
Wenn Sie eine größere Menge von Loratadine Teva eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).
Bei einer versehentlichen Überdosis ist mit keinen schweren Problemen zu rechnen, dennoch können Sie Kopfschmerzen, einen beschleunigten Herzschlag oder Schläfrigkeit empfinden.

Wenn Sie die Einnahme von Loratadine Teva vergessen haben
- Wenn Sie die Einnahme Ihrer Dosis vergessen haben, holen Sie diese nach, sobald Sie dies feststellen und kehren Sie dann zu Ihrem gewohnten Einnahmeschema zurück.
- Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nehmen Sie keine weiteren Tabletten ein und informieren Sie sofort Ihren Arzt wenn eine der folgenden Nebenwirkungen bei Ihnen auftritt:

- allergische Reaktionen: Schwellung von Gesicht, Lippen, Mund, Zunge und/oder Kehle, was möglicherweise zu Atembeschwerden führt; Schock und Bewusstlosigkeit; Hautausschlag, Juckreiz.
- beschleunigter oder unregelmäßiger Herzschlag
- Leberprobleme (nachweisbar in Bluttests)

Sonstige Nebenwirkungen:
Sehr häufig (können mehr als 1 von 10 Personen betreffen) bei Erwachsen und Kindern über 12 Jahre

- Schläfrigkeit
- Kopfschmerzen
- Appetitsteigerung
- Schlafschwierigkeiten.

Sehr häufig (können mehr als 1 von 10 Personen betreffen) bei Kindern von 2 bis 12 Jahren zählen:

- Kopfschmerzen
- Nervosität
- Müdigkeit.

Sehr selten (können bis zu 1 von 10.000 Personen betreffen)

- Schwindelgefühl
- Krämpfe
- Nausea (Übelkeit)
- Mundtrockenheit
- Magenverstimmung
- Haarausfall
- Ausschlag
- Müdigkeit.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

- Gewichtszunahme.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über die Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte – www.afmps.be - Abteilung Vigilanz - Webseite: www.notifieruneffetindesirable.be- E-Mail: adr@fagg-afmps.be anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Loratadine Teva aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Füllen Sie die Tabletten nicht in ein anderes Behältnis um.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Verpackung nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Sie dürfen Loratadine Teva nicht verwenden, wenn Sie eine Veränderung des Aussehens von Loratadine Teva Tabletten.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Loratadine Teva enthält

- Der Wirkstoff ist Loratadin 10 mg pro Tablette. Jede Tablette enthält 10 mg Loratadin.
- Die sonstigen Bestandteile sind Laktosemonohydrat, Maisstärke, prägelatinierte Stärke und Magnesiumstearat. Enthält Laktose (siehe Abschnitt 2 "Loratadin Teva enthält Laktose").

Wie Loratadine Teva aussieht und Inhalt der Packung

Weiße, ovale Tabletten mit einseitiger Bruchkerbe und den Prägungen „L” und „10” auf den beiden Seiten der Bruchkerbe. Die andere Seite der Tabletten ist glatt und ohne Prägung.
Die Tabletten sind in Blisterpackungen mit 5, 7, 10, 15, 20, 28, 30, 50, 100 Tabletten verpackt.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Teva Pharma Belgium AG, Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk

Hersteller

PHARMACHEMIE B.V., Swensweg 5 / P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem, NIEDERLANDE
ODER
TEVA Pharmaceutical Works Ltd., Pallagi Street 13, 4042 Debrecen, UNGARN

Zulassungsnummer

BE253434

Art der Abgabe

Apothekenpflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 11/2024.