

## **BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS**

### **Omacor 1000 mg zachte capsules**

Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

- 1. Wat is Omacor en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?**
- 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?**
- 3. Hoe gebruikt u dit middel ?**
- 4. Mogelijke bijwerkingen**
- 5. Hoe bewaart u dit middel ?**
- 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

#### **1. WAT IS OMACOR EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT ?**

Omacor bevat extra gezuiverde meervoudige onverzadigde vetzuren van de omega-3-reeks.

Omacor behoort tot een groep van zogenaamde cholesterol- en triglyceridenverlagende middelen.

Omacor wordt gebruikt :

- als behandeling voor sommige vormen van verhoogde waarden van triglyceriden (vetten) in het bloed, wanneer een aangepast dieet onvoldoende blijkt te zijn.

#### **2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN ?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Als een van de hierboven vermelde situaties op u van toepassing is, gebruik dit geneesmiddel dan niet en raadpleeg uw arts.

## **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt

- als u een operatie moet ondergaan of onlangs heeft ondergaan
- als u onlangs een verwonding heeft gehad
- als u nierproblemen heeft
- als u diabetes heeft die niet onder controle is
- als u leverproblemen heeft. Uw arts zal aan de hand van bloedtests de effecten van Omacor op uw lever controleren.
- als u een visallergie heeft.
- als u hartproblemen heeft of heeft gehad.
- als u een licht gevoel in het hoofd krijgt, erg moe bent en weinig energie (asthenie), hartkloppingen of kortademigheid heeft. Deze klachten kunnen namelijk het gevolg zijn van een snelle, niet regelmatige hartslag (boezemfibrilleren).

## **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?**

Als u een geneesmiddel gebruikt om de bloedstolling in uw slagaders te stoppen, zoals warfarine, kunnen extra bloedtests nodig zijn en is het mogelijk dat uw gebruikelijke dosis van uw bloedverdunnend geneesmiddel moet worden aangepast.

Gebruikt u naast Omacor nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan ? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

## **Waarop moet u letten met eten en drinken ?**

Neem de capsules bij de maaltijd in. Zo verkleint de kans op bijwerkingen in en rond de maag (de maagdarmsreek).

## **Ouderen**

Gebruik Omacor met voorzichtigheid als u ouder bent dan 70 jaar.

## **Kinderen**

Kinderen mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.

## **Zwangerschap en borstvoeding**

Neem dit geneesmiddel niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij uw arts dit absoluut noodzakelijk acht.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

## **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Het is weinig waarschijnlijk dat dit geneesmiddel een invloed heeft op uw rijvaardigheid of het gebruik van gereedschap of machines.

## **Omacor bevat sojaolie**

Omacor bevat sojaolie. Als u allergisch bent voor pinda of voor soja, gebruik dan dit geneesmiddel niet.

## **3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN ?**

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

- Slik de capsules in met een beetje water.
- U kunt de capsules innemen bij de maaltijd om zo de bijwerkingen op het maagdarmsstelsel te verminderen.
- Uw arts zal beslissen hoelang u dit geneesmiddel moet innemen.

### **Dosis om hoge triglyceridenspiegels in het bloed te behandelen (hoge vetspiegels in het bloed of hypertriglyceridemie)**

De gebruikelijke dagelijkse dosis bedraagt 2 capsules, aanbevolen door een arts. Als het geneesmiddel bij deze dosis onvoldoende werkt, kan uw arts de dosis verhogen tot 4 capsules per dag.

### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt ?**

Wanneer u per ongeluk meer van dit geneesmiddel heeft gebruikt dan u zou mogen, wees dan niet ongerust, daar het weinig waarschijnlijk is dat u hiervoor een speciale behandeling nodig heeft. Raadpleeg toch uw arts of apotheker voor verder advies. Wanneer u te veel van Omacor heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

### **Bent u vergeten dit middel in te nemen ?**

Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem deze dan in wanneer u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis, waarbij u deze volgende dosis dan op het gewone tijdstip inneemt. Neem geen dubbele dosis (tweemaal de dosis aanbevolen door uw arts) om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan Omacor bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen met dit geneesmiddel:

### **Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):**

- Snelle, niet regelmatige hartslag
- Maagproblemen, zoals opgezette buik, pijn, constipatie, diarree, spijsverteringsmoeilijkheden (dyspepsie), gas, boeren (oprisping), zuurreflex ziek gevoel (misselijkheid) en ziek zijn (braken)

### **Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):**

- hoge bloedsuikerspiegels
- jicht
- duizeligheid
- smaakstoornissen
- hoofdpijn
- lage bloeddruk
- bloedneus
- bloed in uw stoelgang

- uitslag

**Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen):**

- allergische reacties
- Huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten)
- leveraandoeningen, met mogelijke wijzigingen in de uitslagen van bepaalde bloedtests

Bij een klein aantal mensen zijn andere bijwerkingen opgetreden, maar hun exacte frequentie is niet bekend.

- jeuk

**Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/40

B – 1060 Brussel

Website : [www.fagg.be](http://www.fagg.be)

e-mail : [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

**5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL ?**

- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
- Omacor bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

**6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

**Welke stoffen zitten er in dit middel ?**

De werkzame stoffen in dit middel zijn ethylesters van Omega-3-vetzuren, 1000 mg ethylesters van Omega-3-vetzuren 90 omvattende 460 mg eicosapentaenzuur (EPA)- en 380 mg docosahexaeenzuur (DHA)-ethylesters (deze bestanddelen worden meervoudige onverzadigde vetzuren van de omega-3-reeks genoemd), met inbegrip van 4 mg d-alfa-tocoferol als antioxidans (gemengd met een plantaardige olie, bv. sojaolie).

Het omhulsel van de zachte capsule bestaat uit gelatine, glycerol, middellange triglyceriden, lecithine (soja) en gezuiverd water.

## **Hoe ziet Omacor eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?**

Omacor-capsules zijn doorschijnende, zachte gelatinecapsules die een lichtgele olie bevatten.

Omacor is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten:

- 1 x 20 capsules
- 1 x 28 capsules
- 1 x 30 capsules
- 1 x 60 capsules
- 1 x 100 capsules
- 10 x 28 capsules

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

## **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen is :

BASF AS  
PO Box 420  
NO - 1327 Lysaker  
Noorwegen

De fabrikant is :

BASF AS  
Framnesveien 41  
NO – 3222 Sandefjord  
Noorwegen

of

Pierre Fabre Médicament Production  
Le Payrat  
FR - 46000 Cahors  
Frankrijk

## **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

BE253066

## **Afleveringswijze**

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2024.**