

|   |  |
|---|--|
| Module 1.3.1.3 - DE                                 | GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER |
| MELISANA N.V.<br>Kareelovenlaan 1<br>B-1140 Brüssel | <b>Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat</b>  |
| Variation IB A.2.b. Umbrella branding               | Seite 1 von 4                                  |

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

### Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat Carbocistein

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat beachten?
3. Wie ist Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat und wofür wird es angewendet?**

Carbocistein wird wegen seiner schleimverdünnenden Wirkung bei Atemwegserkrankungen angewendet, die mit Husten einhergehen.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat beachten?**

##### **Siroxyl Carbocistein Granulat darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Carbocistein oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei einem aktiven Magengeschwür (gastroduodenales Ulkus).
- bei Phenylketonurie (erbliche und angeborene Stoffwechselerkrankung).
- Aufgrund der hohen Dosierung des Präparats ist Siroxyl Carbocistein Granulat nicht für Kinder (bis 15 Jahre) geeignet.

##### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Siroxyl Carbocistein Granulat anwenden.

Wenden Sie sich an einen Arzt um Rat, wenn die Einnahme von Siroxyl Carbocistein Granulat nicht zu einer Besserung führt.

Vorsicht ist geboten bei langfristiger Einnahme oder bei älteren Patienten, wenn Sie in der Vergangenheit Geschwüre im Magen-Darm-Trakt hatten oder wenn Sie gleichzeitig Arzneimittel einnehmen, die dafür bekannt sind, Blutungen im Magen-Darm-Trakt verursachen zu können. Brechen Sie die Einnahme dieses Arzneimittels ab, wenn solche Blutungen auftreten.

Wenn Sie Diabetiker sind, dürfen Sie nur die Form „Siroxyl Carbocistein zuckerfrei 250 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen“ verwenden.

#### **Anwendung von Siroxyl Carbocistein Granulat zusammen mit anderen Arzneimitteln**

|   |  |
|---|--|
| Module 1.3.1.3 - DE                                 | GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER |
| MELISANA N.V.<br>Kareelovenlaan 1<br>B-1140 Brüssel | <b>Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat</b>  |
| Variation IB A.2.b. Umbrella branding               | Seite 2 von 4                                  |

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Siroxyl Carbocistein Granulat darf mit einer Antibiotikabehandlung kombiniert werden.

### **Anwendung von Siroxyl Carbocistein Granulat zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

Gegenstandslos.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Von der Verabreichung von Siroxyl Carbocistein Granulat während der Schwangerschaft und der Stillzeit wird abgeraten.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Gegenstandslos.

### **Siroxyl Carbocistein Granulat enthält Saccharose**

Bitte nehmen Sie Siroxyl Carbocistein Granulat erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie an einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

## **3. Wie ist Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

- Die empfohlene Dosierung beträgt: 1 Beutel 2-mal täglich, also 3 g Carbocistein täglich.
- Nicht mehr als 2 Beutel täglich einnehmen.

Nur für Erwachsene (ab 15 Jahren) geeignet.

Die Behandlung muss durchschnittlich etwa zwei Wochen durchgeführt werden. Für bestimmte chronische Erkrankungen ist eine Behandlung über 3 bis 4 Wochen erforderlich.

### Art und Weg der Verabreichung

Zum Einnehmen.

Inhalt des Beutels in einer ausreichenden Menge Wasser auflösen. Rühren, um eine homogene Suspension zu erhalten.

Die Behandlung mit Siroxyl Carbocistein Granulat muss durch Ihren behandelnden Arzt überdacht werden, wenn nach einer Behandlung über 3 aufeinanderfolgende Tage keine Besserung eintritt.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Siroxyl Carbocistein Granulat eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie zu viel Siroxyl Carbocistein Granulat eingenommen haben, nehmen Sie sofort Kontakt auf mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Antgiftzentrum (**070/245.245**).

Die Anzeichen einer Überdosierung sind Magen- und Darmbeschwerden (Übelkeit, Erbrechen). Beim Vermuten einer Überdosierung muss erst ärztliche Hilfe hinzugezogen werden.

|   |  |
|---|--|
| Module 1.3.1.3 - DE                                 | GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER |
| MELISANA N.V.<br>Kareelovenlaan 1<br>B-1140 Brüssel | <b>Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat</b>  |
| Variation IB A.2.b. Umbrella branding               | Seite 3 von 4                                  |

Im Prinzip ist eine Aufnahme ins Krankenhaus nicht erforderlich.

**Wenn Sie die Einnahme von Siroxyl Carbocistein Granulat vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

**Wenn Sie die Anwendung von Siroxyl Carbocistein Granulat abbrechen**

Gegenstandslos.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Brechen Sie die Anwendung von Siroxyl Carbocistein Granulat ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder gehen Sie direkt in ein Krankenhaus, wenn Sie die folgenden Symptome haben (Häufigkeit nicht bekannt):**

- Sie haben eine allergische Reaktion. Folgende Anzeichen sind möglich: Hautausschlag (eventuell mit Blasenbildung), Schluck- oder Atembeschwerden, Schwellung von Lippen, Gesicht, Rachen oder Zunge.

**Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn bei Ihnen eine der folgenden Nebenwirkungen auftritt:**

- Häufig (kann bei bis zu 1 von 10 Patienten auftreten): Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Es wird empfohlen, die Dosierung zu senken. Diese Nebenwirkungen wurden in einer Häufigkeit von 1,13 % und von 4,26 % beim Einsatz von Placebo gemeldet.

- Selten (kann bei bis zu 1 von 1.000 Patienten auftreten): Kopfschmerzen; dann wird empfohlen, die Dosierung zu senken.

- Häufigkeit nicht bekannt (auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar): Blutungen im Magen-Darm-Trakt, Hautreaktionen, worunter rote Knötchen auf der Haut, deutlich abgegrenzte, erhabene Zone mit Rötung und gelegentlich Blasenbildung, jeweils an derselben Stelle. In diesen Fällen muss die Verabreichung sofort abgebrochen werden.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

**Belgien**

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Abteilung Vigilanz:

Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

**Luxemburg**

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg

Website : [www.guichet.lu/pharmakovigilanz](http://www.guichet.lu/pharmakovigilanz)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

|   |  |
|---|--|
| Module 1.3.1.3 - DE                                 | GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER |
| MELISANA N.V.<br>Kareelovenlaan 1<br>B-1140 Brüssel | <b>Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat</b>  |
| Variation IB A.2.b. Umbrella branding               | Seite 4 von 4                                  |

## 5. Wie ist Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.  
Bei Raumtemperatur (15 °C - 25 °C) lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Dort sind ein Monat und ein Jahr angegeben. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden.  
Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### Was Siroxyl Carbocistein Granulat enthält

Der Wirkstoff ist: Carbocistein.

Die sonstigen Bestandteile sind: Polyvidon – kolloidales wasserfreies Silicium – Natriumcarmellose – wasserfreie Citronensäure – synthetisches Orangenaroma (Derog. 42/1003) – Saccharose.

Siehe auch Abschnitt 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat beachten? „Siroxyl Carbocistein Granulat enthält ...“.

### Wie Siroxyl Carbocistein Granulat aussieht und Inhalt der Packung

Siroxyl Carbocistein Granulat ist im Handel in folgender Verpackung erhältlich: Schachteln mit 14 und 30 Beuteln mit 4 g Granulat.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

#### Pharmazeutischer Unternehmer

Wenden Sie sich für sämtliche Informationen in Bezug auf dieses Arzneimittel an den pharmazeutischen Unternehmer.

MELISANA N.V.  
Kareelovenlaan 1  
B-1140 Brüssel

#### Hersteller Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat

Nattermann & Cie GmbH  
Nattermannallee 1  
D-50829 Köln  
Deutschland

### Zulassungsnummer

*Siroxyl Carbocistein 1.500 mg Granulat:*

BE: BE134346

LU: 2011030990

### Verkaufsabgrenzung

Apothekenpflichtig.

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 11/2024.**