

**PACKUNGSBEILAGE**

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR PATIENTEN

### CASODEX 50, 50 mg Filmtabletten CASODEX 150, 150 mg Filmtabletten

Bicalutamid

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist CASODEX und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von CASODEX beachten?
3. Wie ist CASODEX einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist CASODEX aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. WAS IST CASODEX UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

CASODEX ist ein Mittel, das die Wirkung von Testosteron (Antiandrogen) beeinflusst. Dieses Arzneimittel ist zur Behandlung von Prostatakrebs indiziert.

CASODEX ist nach ärztlichen Verschreibung einzunehmen.

#### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON CASODEX BEACHTEN?

##### CASODEX darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Bicalutamid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- CASODEX darf Kindern nicht verabreicht werden.
- CASODEX darf Frauen nicht verabreicht werden.

##### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie CASODEX einnehmen.

- Falls Sie an irgendeiner Form einer eingeschränkten Leberfunktion oder an Leberkrankheiten leiden, müssen Sie dies Ihrem Arzt mitteilen.
- Falls Sie andere Arzneimittel einnehmen, insbesondere Blutverdünner oder Arzneimittel zur Prävention von Blutgerinnseln, müssen Sie Ihren Arzt darüber in Kenntnis setzen.
- Bei einer Einweisung ins Krankenhaus müssen Sie angeben, dass Sie mit CASODEX behandelt werden.
- Falls Sie an Diabetes (Zuckerkrankheit) leiden, informieren Sie bitte Ihren Arzt.
- Wenn Sie CASODEX einnehmen, sollten Sie und/oder Ihr Partner während der Behandlung mit CASODEX und 130 Tage nach Beendigung der Behandlung eine angemessene Empfängnisverhütung anwenden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt wenn Sie Fragen zur Schwangerschaftsverhütung haben.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn eine der folgenden Erkrankungen bei Ihnen vorliegt: Herz- oder Blutgefäßerkrankungen jeder Art, einschließlich Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien), oder wenn Sie wegen dieser Erkrankungen medikamentös behandelt werden. Bei Anwendung von CASODEX kann das Risiko für Herzrhythmusstörungen erhöht sein.

Wenn Sie noch andere Arzneimittel einnehmen, lesen Sie bitte ebenfalls den Abschnitt „Einnahme von CASODEX zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

Konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, wenn einer der oben angeführten Warnhinweise auf Sie zutrifft oder in der Vergangenheit auf Sie zugefallen hat.

### **Einnahme von CASODEX zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen. Dies gilt auch für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.

CASODEX kann die Wirkung einiger anderer Arzneimittel, die zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen angewendet werden (wie z. B. Chinidin, Procainamid, Amiodaron und Sotalol), beeinträchtigen oder das Risiko für Herzrhythmusstörungen erhöhen, wenn es zusammen mit einigen anderen Arzneimitteln angewendet wird (z. B. Methadon (zur Schmerzlinderung und zur Entgiftung bei Drogenabhängigkeit), Moxifloxacin (Antibiotikum), Antipsychotika zur Behandlung von schweren psychischen Störungen).

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel einnehmen:

- Cimetidin, zur Behandlung von Magenbrennen oder Magengeschwüren
- Ketoconazol, zur Behandlung von Pilzkrankungen der Nägel oder der Haut
- Kalziumantagonisten, zur Behandlung von Bluthochdruck oder bestimmten Herzerkrankungen
- Ciclosporin, zur Immunsuppression
- Blutverdünner wie Warfarin, Acenocoumarol, Fluindion und Fenprocoumon
- Amiodaron, zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen
- Carbamazepin, zur Behandlung von Epilepsie

### **Einnahme von CASODEX zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Nicht zutreffend

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

CASODEX ist kontraindiziert bei Frauen.

CASODEX darf nicht bei schwangeren Frauen eingesetzt werden.

CASODEX ist in der Stillzeit kontraindiziert.

CASODEX kann einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit bei Männern haben, der reversibel sein kann.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es ist unwahrscheinlich, dass CASODEX die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen, beeinträchtigt. Jedoch können häufig Schwindel und Müdigkeit auftreten. Patienten, die darunter leiden, müssen äußerst vorsichtig sein.

### **CASODEX enthält Laktose**

Laktose ist eine bestimmte Zuckerart. Bitte nehmen Sie CASODEX erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

**CASODEX enthält Titandioxid**, das bei einer begrenzten Anzahl an Patienten eine allergische Reaktion verursachen kann.

#### **CASODEX enthält Natrium**

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, d. h. es ist nahezu „natriumfrei“.

### **3. WIE IST CASODEX EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis ist eine Tablette CASODEX einmal pro Tag. Versuchen Sie, Ihre Tablette jeden Tag zur gleichen Zeit einzunehmen.

Nehmen Sie die Tablette unzerteilt und unzerkaut mit einem Glas Wasser ein.

Die Behandlung mit CASODEX ist eine Langzeitbehandlung, die fortgesetzt werden muss, solange Ihr Arzt dies für notwendig erachtet. Selbst dann, wenn Sie sich besser fühlen, dürfen Sie die Einnahme niemals auf eigene Initiative unterbrechen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von CASODEX eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie eine größere Menge von CASODEX eingenommen haben, als Sie sollten, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das **Antigiftzentrum (070/245 245)**.

Bei der Einnahme einer zu großen Menge muss die Behandlung im Krankenhaus erfolgen.

#### **Wenn Sie die Einnahme von CASODEX vergessen haben**

Falls Sie versehentlich vergessen haben, eine Tablette einzunehmen, setzen Sie die empfohlene Einnahme von 1 Tablette pro Tag fort.

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### **Wenn Sie die Einnahme von CASODEX abbrechen**

Sie dürfen die Behandlung nie auf eigene Initiative abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die Häufigkeit der Nebenwirkungen wird wie folgt eingeteilt:

Sehr häufig (*bei mehr als 1 von 10 Patienten*)

Häufig (*bei mehr als 1 von 100 Patienten, aber bei weniger als 1 von 10 Patienten*)

Gelegentlich (*bei mehr als 1 von 1000 Patienten, aber bei weniger als 1 von 100 Patienten*)

Selten (*bei mehr als 1 von 10.000 Patienten, aber bei weniger als 1 von 1000 Patienten*)

Sehr selten (*bei weniger als 1 von 10.000 Patienten*)

#### **Casodex 150: Bicalutamid 150 mg (Monotherapie)**

##### **Sehr häufig:**

- Hautausschlag
- Anschwellen der Brüste und Empfindlichkeit der Brustwarzen
- Schwächegefühl

**Häufig:**

- Reduzierte Anzahl roter Blutkörperchen (Anämie)
- Appetitlosigkeit
- Verminderte Libido, Depression
- Schwindel, Schläfrigkeit
- Hitzewallungen
- Bauchschmerzen, Verstopfung, Verdauungsstörungen, Blähungen (Flatulenz), Übelkeit
- Blutuntersuchungen, die Veränderungen in der Leberfunktion zeigen, Gelbfärbung von Haut und Augen (Gelbsucht)<sup>a</sup>
- Haarausfall, übermäßiger Haarwuchs bzw. übermäßiges Nachwachsen der Haare, trockene Haut, Juckreiz
- Bluthaltiger Urin
- Impotenz
- Schmerzen im Brustkorb, Ödem
- Gewichtszunahme

**Gelegentlich:**

- Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Urtikaria (Nesselsucht) und lokales Anschwellen von Hals, Haut, Gelenken)
- Entzündung der Lunge (auch als „interstitielle Lungenerkrankung“ bezeichnet). Tödliche Verläufe wurden berichtet.

**Selten:**

- Leberversagen. Tödliche Verläufe wurden berichtet.
- Gesteigerte Empfindlichkeit der Haut gegenüber Sonnenlicht

**Nicht bekannt:**

- EKG-Veränderungen (Verlängerung des QT-Intervalls)

**Casodex 50: Bicalutamid 50 mg (+LHRH-Analogon)****Sehr häufig:**

- Reduzierte Anzahl roter Blutkörperchen (Anämie)
- Schwindel
- Hitzewallungen
- Bauchschmerzen, Verstopfung, Übelkeit
- Anschwellen der Brüste und Empfindlichkeit der Brustwarzen
- Schwächegefühl, Ödem
- Bluthaltiger Urin

**Häufig:**

- Herzinfarkt. Tödliche Verläufe wurden berichtet.
- Reduzierung der Herzfunktion
- Appetitlosigkeit
- Verminderte Libido, Depression
- Schläfrigkeit
- Verdauungsstörungen, Blähungen (Flatulenz)
- Blutuntersuchungen, die Veränderungen in der Leberfunktion zeigen
- Gelbfärbung von Haut und Augen (Gelbsucht)<sup>a</sup>
- Haarausfall, übermäßiger Haarwuchs bzw. übermäßiges Nachwachsen der Haare, Hautausschlag, trockene Haut, Juckreiz
- Impotenz
- Schmerzen im Brustkorb
- Gewichtszunahme

**Gelegentlich:**

- Entzündung der Lunge (auch als „interstitielle Lungenerkrankung“ bezeichnet). Tödliche Verläufe wurden berichtet.
- Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Urtikaria und lokales Anschwellen von Hals, Haut, Gelenken)

**Selten:**

- Lebersversagen. Tödliche Verläufe wurden berichtet.
- Gesteigerte Empfindlichkeit der Haut gegenüber Sonnenlicht

**Nicht bekannt:**

- EKG-Veränderungen (Verlängerung des QT-Intervalls)

- a Die Leberveränderungen sind selten schwerwiegend und häufig vorübergehender Art. Sie legen oder bessern sich bei fortlaufender Behandlung oder nach dem Absetzen der Therapie.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem melden (Details siehe unten). Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Belgien**

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

Postfach 97

B-1000 Brussel

Madou

Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

E-Mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

**Luxemburg**

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet : [www.guichet.lu/pharmacovigilance](http://www.guichet.lu/pharmacovigilance)

**5. WIE IST CASODEX AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Verpackung nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

**6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN****Was CASODEX enthält**

- Der Wirkstoff ist Bicalutamid.

- Die sonstigen Bestandteile sind: Laktose, Natriumcarboxymethylstärke, Povidon und Magnesiumstearat - Umhüllung: Hypromellose, Macrogol 300 und Titandioxid (E171).

**Wie CASODEX aussieht und Inhalt der Packung**

CASODEX 50

Filmtabletten zur oralen Einnahme à 50 mg Bicalutamid.

CASODEX 150

Filmtabletten zur oralen Einnahme à 150 mg Bicalutamid.

Blisterverpackung mit 28 oder 84 Tabletten (Kalender-Pack); Klinikverpackung (U. D.) mit 28 oder 84 Tabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller****Pharmazeutischer Unternehmer**

Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals

149 boulevard Bataille de Stalingrad

69100 Villeurbanne

France

**Hersteller**

Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse, 68723, Plankstadt, Deutschland

AstraZeneca AB, Global External Sourcing (GES), Astraallén, Gärtunaporten (B 674:5), SE-151 85 Södertälje, Schweden

**Zulassungsnummern**

BE: CASODEX 50 BE179033

CASODEX 150 BE233143

LU: CASODEX 50 2008019643

CASODEX 150 2008019644

**Verkaufsabgrenzung**

Verschreibungspflichtig.

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt am 09/2023.**