

Notice: information de l'utilisateur

Bithiol Qualiphar 10% pommade
Bithiol Qualiphar 20% pommade
Ichtammol

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.



- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 semaines.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que Bithiol Qualiphar et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Bithiol Qualiphar?
3. Comment utiliser Bithiol Qualiphar?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Bithiol Qualiphar?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Bithiol Qualiphar et dans quel cas est-il utilisé?

Bithiol Qualiphar est une pommade pour le traitement des affections cutanées.

Indiqué:

- Dans le traitement complémentaire d'affections cutanées récurrentes avec pellicules sèches et squameuses (psoriasis), eczéma chronique et inflammations cutanées liées à une production de sébum trop importante.
- Pour faire mûrir les clous (furoncles) et les boutons (pustules).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 semaines.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Bithiol Qualiphar?

N'utilisez jamais Bithiol Qualiphar Si vous êtes allergique à ichtammol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

- En cas de lésions cutanées allergiques.
- Pour des blessures cutanées importantes, comme de grandes plaies ouvertes ou brûlures.
- Chez les nouveau-nés et prématurés.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Bithiol Qualiphar.

- Ce médicament ne peut pas être utilisé de façon prolongée ou répétée.
- Il faut éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les plaies ouvertes.
Si vous utilisez d'autres médicaments, veuillez également lire la rubrique «Autres médicaments et Bithiol Qualiphar».
- Bithiol Qualiphar comporte, comme composant actif, l'ichtammol, une substance incompatible avec l'iode, les sels de fer et de plomb, ainsi qu'avec les liaisons basiques. Evitez donc tout contact avec ces substances lors de votre traitement avec du Bithiol Qualiphar.

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Enfants

N'utilisez jamais Bithiol Qualiphar chez les nouveau-nés et prématurés.

Autres médicaments et Bithiol Qualiphar

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance. Ne pas utiliser en même temps que des désinfectants.

Bithiol Qualiphar avec des aliments et boissons

Aucune interaction connue.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

En cas d'usage correct et de respect de la quantité indiquée, ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Il est cependant conseillé d'informer le médecin de l'utilisation de ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

Bithiol Qualiphar contient de la graisse de laine (lanoline) (E913)

Ce médicament contient de la graisse de laine (lanoline). Ce peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

3. Comment utiliser Bithiol Qualiphar?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de:

Etendre la pommade deux à trois fois par jour en couche fine aux endroits à traiter, et protéger ensuite à l'aide d'une gaze stérile.

Les éventuelles taches sur les vêtements peuvent être éliminées avec de l'eau et du savon.

Vous ne devez pas utiliser Bithiol Qualiphar plus de 3 semaines consécutifs sans avis médical.

Utilisation chez les enfants

N'utilisez jamais Bithiol Qualiphar chez les nouveau-nés et prématurés.

Si vous avez utilisé plus de Bithiol Qualiphar que vous n'auriez dû

En cas d'usage correct, externe, l'utilisation d'une trop grande quantité est pratiquement impossible. Si vous avez utilisé ou pris trop de Bithiol Qualiphar, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Bithiol Qualiphar

Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

Si vous arrêtez d'utiliser Bithiol Qualiphar

Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Normalement, Bithiol Qualiphar est bien supporté.

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Réaction allergique à l'un des composants.
- Légère irritation au niveau de la zone traitée, éruption cutanée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:

Belgique:

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - www.afmmps.be - Division Vigilance : Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@fagg-afmmps.be.

Luxembourg:

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé - Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Bithiol Qualiphar?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le tubel' emballage après "EXP". La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu d l' emballage et autres informations.

Ce que contient Bithiol Qualiphar

- La substance active est: ichtammol 10 g/100 g (Bithiol Qualiphar 10%) et ichtammol 20 g/100 g (Bithiol Qualiphar 20%).
- Les autres composants sont: vaseline et graisse de laine (lanoline) (E913). Voir rubrique 2, « Bithiol Qualiphar contient de la graisse de laine (lanoline) (E913) ».

Aspect de Bithiol Qualiphar et contenu de l' emballage extérieur

Tube de 22 g de pommade.

Titulaire de l' Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 – 2880 Bornem - Belgique

Numéros d' Autorisation de mise sur le marché:

BE230063 (Bithiol Qualiphar 10%)

BE230072 (Bithiol Qualiphar 20%)

LU : 2009060013 (Bithiol Qualiphar 10%)

LU : 2009060014 (Bithiol Qualiphar 20%)

Mode de délivrance : Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 04/2024.