

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Tiberal 500 mg filmomhulde tabletten

Tiberal 1 g/6 ml concentraat voor oplossing voor infusie

Ornidazol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige .
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Tiberal en waarvoor wordt dit middel gebruikt
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS TIBERAL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT

Tiberal 500 mg filmomhulde tabletten is beschikbaar in individuele verpakkingen van 3 en 10 tabletten.

Tiberal 1 g/6 ml concentraat voor oplossing voor infusie is beschikbaar in kliniekverpakkingen met 1 ampul.

Tiberal behoort tot een groep stoffen (scheikundige benaming: nitroimidazolen) bestemd voor de bestrijding van infecties veroorzaakt door bepaalde vaginale en intestinale parasieten evenals door bepaalde microben.

Tabletten

- Ontstekingen van de vagina veroorzaakt door een bepaalde parasiet (Trichomonas). De aanwezigheid van deze parasiet dient te worden opgespoord door speciale onderzoeken die door de behandelende arts worden uitgevoerd.

Het is belangrijk te weten dat de seksuele mannelijke partner ook kan besmet zijn, door dezelfde parasiet, en een infectie van de urethra (klein kanaaltje waardoor de urine van de blaas naar buiten loopt) kan vertonen. Deze infectie van de mannelijke urethra gaat dikwijls onopgemerkt voorbij, want zij is niet pijnlijk en is niet vergezeld van uitwendige symptomen (ontsteking of andere). Gelijktijdige behandeling van de partner is dan ook noodzakelijk teneinde re-infectie van de vrouw te vermijden, zelfs indien de partner geen enkel symptoom vertoont. Eén enkele inname van 3 tabletten zorgt in dat geval voor een gemakkelijk aanvaardbare behandeling.

- Infecties van het darmstelsel door bepaalde parasieten (amoeben, Giardia).

- Voortzetting van een behandeling met het concentraat voor oplossing voor infusie van Tiberal (zie verder).

Concentraat voor oplossing voor infusie

Het concentraat voor oplossing voor infusie wordt in het ziekenhuis gebruikt in de volgende situaties :

- Infecties door bepaalde microben die "anaëroben" worden genoemd, en die door speciale laboratoriumonderzoeken worden opgezocht.
- Preventie van infecties door kiemen die als complicatie van bepaalde heelkundige ingrepen kunnen optreden (dikke darm, baarmoeder, ...).
- Ernstige gevallen van infecties door amoeben, b.v. amoebenabces van de lever, en amoebendysenterie.

Het concentraat voor oplossing voor infusie van Tiberall is niet geschikt voor de behandeling van infecties van de vagina of van de urethra.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN ?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Indien u een aandoening vertoont van het centraal zenuwstelsel zoals bijvoorbeeld epilepsie, perifere neuropathie (prikkelingen in de extremiteiten) of multipale sclerose.
- Indien u aan een leverziekte lijdt; bij ernstige insufficiëntie zal het doseringsschema worden aangepast.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen" te lezen.

Neem contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Nota voor het verplegend personeel:

Het concentraat voor oplossing voor infusie moet juist voor de toediening worden verdund (zie rubriek "Hoe gebruikt u dit middel").

Bij hemodialysepatiënten dient de dosering te worden aangepast.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tiberall nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw arts of apotheker

De behandelende arts moet worden verwittigd wanneer Tiberall samen met bepaalde anticoagulerende medicatie (d.w.z.. een medicatie die het bloed minder "stolbaar" maakt) of met geneesmiddelen tegen epilepsie wordt gebruikt. In dergelijke gevallen is inderdaad een strengere medische controle aangeraden.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol

Tekens van intolerantie zoals diverse vormen van malaise werden soms waargenomen bij gelijktijdig gebruik van alcohol en geneesmiddelen die tot dezelfde groep als Tiberall behoren. Hoewel bij gelijktijdige toediening van Tiberall en alcohol geen tekens van intolerantie werden vastgesteld, kunnen ze toch niet met zekerheid worden uitgesloten.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.>

Dierstudies vertoonden geen enkel teken van enige teratogene (die misvormingen van de foetus veroorzaakt) of foetotoxische (giftig voor de foetus) werking van het geneesmiddel. Er werd evenwel

geen enkele gecontroleerde studie uitgevoerd bij zwangere vrouwen. Uit principe zal Tiberol niet worden voorgeschreven bij het begin van de zwangerschap, behalve in geval van absolute noodzaak. Uit principe zal Tiberol niet worden voorgeschreven bij de vrouw die borstvoeding geeft, behalve in geval van absolute noodzaak.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan bepaalde bijwerkingen hebben (zoals draaierigheid, sufheid en slaperigheid) die de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen bij bepaalde patiënten kunnen beïnvloeden. Bestuur geen voertuigen en bedien geen machines als deze bijwerkingen bij u optreden.

Tiberol 1 g/6 ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat alcohol.

Eén ampul Tiberol bevat een hoeveelheid alcohol die overeenkomt met 44,4 ml bier of 18 ml wijn per dosis. Dit kan gevaarlijk zijn voor personen met alcoholisme. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, kinderen en hoogrisicogroepen, zoals patiënten met leverfalen of epilepsie, dienen hiermee rekening te houden.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL ?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker..

De dosering hangt af van het soort infectie en is eveneens verschillend indien u een ernstige leverinsufficiëntie vertoont of indien u een hemodialysepatiënt bent.

Tabletten (via de mond in te nemen)

- Ontstekingen van de vagina of van de urethra : één dosis van 3 tabletten zowel bij vrouwen als bij mannen, bij voorkeur innemen tijdens of na de maaltijd (b.v. het avondmaal). In geval van vaginitis dient aan het nut van de behandeling van de mannelijke partner te worden herinnerd.

- Parasitaire darminfecties : bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar gedurende 5 tot 10 dagen één tablet 's morgens en 's avonds tijdens of na de maaltijd.

In ernstige gevallen wordt aanbevolen de behandeling te beginnen met het concentraat voor oplossing voor infusie van Tiberol.

Concentraat voor oplossing voor infusie

Nota voor het medisch personeel:

Het concentraat voor oplossing voor infusie wordt in het ziekenhuis gebruikt: 1 ampul moet juist voor het inspuiten worden verdund met ten minste 200 ml van één van de volgende oplossingen:

Glucose 5 %

Glucose 10 %

Levulose 5 %

Oplossing van Hartmann

Oplossing van Ringer

Natriumchloride 0,9 %

Natriumchloride 0,45 % + glucose 2,5 %

Dextran 70 6 % + glucose 5 %

De verdunde oplossing dient in een kortdurend intraveneus infuus te worden toegediend (15 tot 30 minuten).

- Behandeling van infecties door "anaërobe" kiemen : 1 ampul om de 24 uur gedurende 5 tot 10 dagen. Zodra de toestand van de patiënt het toelaat, wordt de behandeling voortgezet met tabletten in een dosis van 1 tablet om de 12 uur.

- Preventie van infecties door "anaërobe" ziektekiemen : Een intraveneuze infusie van 1 g tijdens de anesthesie die, indien nodig, na 24 uur herhaald kan worden.

- Amoebenabces van de lever - amoebendysenterie : 1 ampul om de 24 uur gedurende gemiddeld 3 tot 6 dagen.

Gebruik bij kinderen

De posologie bij kinderen bedraagt 20 tot 30 mg per kg lichaamsgewicht per dag, te verdelen in twee doses per dag.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van Tiberol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

De symptomen die hieronder, in de rubriek "Mogelijke bijwerkingen", worden vermeld, zijn in geval van overdosering (d.w.z. aanzienlijk hoger dan de aanbevolen doses) meer uitgesproken.

Een specifiek antidotum van Tiberol is niet beschikbaar.

De patiënt doen braken (dit mag slechts indien de patiënt goed wakker is) of een maagspoeling uitvoeren, zijn de eerste maatregelen die in geval van overdreven inname van tabletten kunnen worden getroffen. Indien stuip trekkingen optreden, wat een teken van ernstige intoxicatie is, dient diazepam bij voorkeur intraveneus te worden geïnjecteerd.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Geen gegevens beschikbaar.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zelden ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$)

Zenuwstelselaandoeningen: abnormale gewaarwordingen in de handen en voeten.

Zeer zelden ($< 1/10.000$)

Bloed- en lymfestelselaandoeningen: tijdelijke veranderingen in de bloedcellen, maar het is niet zeker dat deze aan Tiberol te wijten zijn.

Immuunsysteemaandoeningen: zwelling van het gezicht, de tong of de keel, die tot shock kan leiden en spoedbehandeling kan vereisen

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: samentrekking van de bronchiën

Huid- en onderhuidaandoeningen: angioneurotisch oedeem

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: pijn in de gewrichten

Onbekende frequentie (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Infecties en parasitaire aandoeningen: infecties van de vagina die door een microscopische schimmel worden veroorzaakt

Zenuwstelselaandoeningen: draaierigheid, duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn, vermoeidheid, stoornissen van het centraal zenuwstelsel zoals beven, stijfheid, coördinatiestoornissen, bewustzijnsverlies, stuipen, verwardheid en stemmingsstoornissen

Maagdarmsstelselaandoeningen: misselijkheid, braken en smaakstoornissen.

Lever- en galaandoeningen: ontsteking van de lever (hepatitis), afwijkende resultaten op leverfunctietesten

Huid- en onderhuidaandoeningen: allergische reacties (huiduitslag, netelroos), huidafwijking die ontstaat door overgevoeligheid voor een gebruikt medicijn (erythema fixatum)

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: lokale pijn als gevolg van de intraveneuze infusie van Tiberol.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem.

BELGIË

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/ 40

B-1060 Brussel

Website: www.fagg.be

E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

LUXEMBURG

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments

Villa Louvigny – Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

Site internet: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C en ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Tiberol 500 mg filmomhulde tabletten

- De werkzame stof in dit middel is ornidazol.

- De andere stoffen in dit middel zijn:

kern van de tablet: maïszetmeel, microkristallijne cellulose, hypromellose 60SH, magnesiumstearaat.

- omhulsel van de tablet: hypromellose 6 CP, talk, titaandioxide (E 171).

Tiberal 1 g/6 ml concentraat voor oplossing voor infusie

- De werkzame stof in dit middel is ornidazol.
- De andere stoffen in dit middel zijn absolute alcohol en propyleenglycol.(zie rubriek 2 :” *Tiberal 1 g/6 ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat alcohol*”)

Hoe ziet Tiberal er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tiberal 500 mg filmomhulde tabletten

Eén tablet bevat 500 mg ornidazol.

Individuele verpakkingen van 3 en 10 tabletten.

Tiberal 1 g/6 ml concentraat voor oplossing voor infusie

Eén ampul van 6 ml bevat 1 g ornidazol.

Kliniekverpakkingen met 1 ampul.

Afleveringswijze

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Laboratoires SERB

40, Avenue George V,

75008 Paris

Frankrijk

Fabrikant

Laboratoires SERB

40, Avenue George V,

75008 Paris

Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Tiberal 500 mg filmomhulde tabletten: BE124792

Tiberal 1 g/6 ml concentraat voor oplossing voor infusie: BE141285

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2017

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 03/2017