VASOCEDINE NAPHAZOLINE 0,1%, Nasenspray, Lösung
VASOCEDINE NAPHAZOLINE 0,1%, Nasentropfen, Lösung

Naphazolinnitrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 4 bis 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Vasocedine naphazoline und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Vasocedine naphazoline beachten?
3. Wie ist Vasocedine naphazoline anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Vasocedine naphazoline aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. WAS IST VASOCEDINE NAPHAZOLINE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Vasocedine naphazoline ist ein Arzneimittel zum Abschwellen der Nasenschleimhaut.
Vasocedine naphazoline ist indiziert zur lokalen Behandlung von Symptomen einer verstopften Nase bei Entzündung der Nasenschleimhaut oder der Sinushöhlen, Heuschnupfen.
Als Erstbehandlung wird empfohlen, die Nase mit Kochsalzlösung zu spülen. Dieses Medikament kann als Zweitbehandlung verwendet werden.
Wenn Sie sich nach 4 bis 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON VASOCEDINE NAPHAZOLINE BEACHTEN?

Vasocedine naphazoline darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Naphazolinnitrat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Bei Kindern unter 7 Jahren.
- Bei Personen mit grüner Star (Engwinkelglaukom) oder Personen, bei denen das Risiko dieser Erkrankung besteht.
- Bei Personen mit einer gutartigen Geschwulst der Prostata (Prostatadenom).
- Bei Gebrauch von Medikamenten gegen Depression (MAO-Hemmern).
- Bei Nasenentzündung mit Schrumpfung der Nasenschleimhaut (atrophische Rhinitis).

- Im Falle von chronischen Entzündungen der Nasenschleimhaut.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Vasocedine naphazoline anwenden.

- Falls Sie bejahrt oder Zuckerkrank sind.
- Bei Schilddrüsenüberfunktion oder Herz- und Gefäßkrankheiten wie z.B. Rhythmus Störungen, erhöhter Herzschlag oder Bluthochdruck.
- Bei langfristigem Gebrauch besteht sogar die Möglichkeit von Nasenentzündungen, die durch das Medikament selbst verursacht werden.
- Bitte halten Sie sich an die Dosiervorschriften, besonders bei Kleinkindern.
- Dieses Arzneimittel ist für die Anwendung in der Nase vorgesehen und darf nicht über einen anderen Weg verabreicht werden.
- Wenn Sie noch andere Arzneimittel anwenden. Bitte lesen Sie auch die Rubrik: „Bei Anwendung von Vasocedine naphazoline mit anderen Arzneimitteln“.

Kinder

Vasocedine naphazoline darf nicht angewendet werden bei Kindern unter 7 Jahren.

Anwendung von Vasocedine naphazoline zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden., auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Vasocedine naphazoline nicht zusammen mit Medikamenten gegen Depression (MAO-Hemmern) benutzen, da die Gefahr des Bluthochdrucks besteht. Dieses Risiko bleibt bis 14 Tage nach Absetzen von MAO-Hemmern bestehen.

Anwendung von Vasocedine naphazoline zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Es wird abgeraten Vasocedine naphazoline während der Schwangerschaft zu benutzen.

Stillzeit

Es wird abgeraten Vasocedine naphazoline während der Stillzeit zu benutzen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Vasocedine naphazoline enthält Methylparahydroxybenzoat (E218)

Dieser Stoff kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

3. WIE IST VASOCEDINE NAPHAZOLINE ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Vasocedine naphazoline ist für die Anwendung in der Nase vorgesehen und darf nicht über einen anderen Weg verabreicht werden.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene:

Nasentropfen: 3 bis 4 Tropfen in jedes Nasenloch, 3 mal pro Tag.

Nasenspray: 1 bis 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch, 3 mal pro Tag.

Anwendung bei Kindern

Kinder von 10 bis 15 Jahren:

Nasentropfen: 2 Tropfen in jedes Nasenloch, 3 mal pro Tag.

Nasenspray: 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch, 3 mal pro Tag.

Kinder von 7 bis 10 Jahren:

Nasentropfen: 1 Tropfen in jedes Nasenloch, 3 mal pro Tag.

Nasenspray: 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch, 2 mal pro Tag.

Bitte halten Sie sich an die Dosiervorschriften, besonders bei Kleinkindern.

Maximum 5 Anwendungen pro 24 Stunden. Es wird empfohlen, mindestens 3 Stunden zwischen 2 Anwendungen zu warten. Ohne ärztlichen Rat darf Vasocedine naphazoline nicht länger als 5 Tage angewendet werden.

Als Erstbehandlung wird empfohlen, die Nase mit Kochsalzlösung zu spülen. Dieses Medikament kann als Zweitbehandlung verwendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Vasocedine naphazoline angewendet haben, als Sie sollten

Bei richtiger Anwendung über einen kurzen Zeitraum ist die Gefahr einer Überdosierung sehr gering. Wenn Sie eine größere Menge von Vasocedine naphazoline haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von Vasocedine naphazoline vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge ein an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Vasocedine naphazoline abbrechen

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Gefühl von Trockenheit im Nasenbereich.
- Längere oder zu häufige Verabreichung oder die Benutzung von zu hohen Dosierungen, kann vor allem bei Kleinkindern oder älteren Personen zu folgenden Symptomen führen: Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Herzklopfen und Übelkeit.
- Bei langfristigem Gebrauch besteht sogar die Möglichkeit von Entzündungen der Nasenschleimhaut, die durch das Medikament selbst verursacht werden.
- Allergische Reaktionen sind möglich.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage
angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen. Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte - Abteilung Vigilanz – Website: www.fagg-afmp.be – E-Mail: patientinfo@fagg-afmp.be. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie

dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST VASOCEDINE NAPHAZOLINE AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.. Nicht über 25ºC lagern. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton/dem Etikett nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten beiden Ziffern geben den Monat, die folgenden zwei oder vier Ziffern das Jahr an. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des aangegebenen Monats.
Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN.

Was Vasocedine naphazoline enthält

- Der Wirkstoff ist Naphazolinnitrat 0,1%.
- Die sonstigen Bestandteile sind Borsäure - Glycerol - Methylparahydroxybenzoat (E218) - Borax - Phenyläthanol - gereinigtes Wasser.

Wie Vasocedine naphazoline aussieht und Inhalt der Packung

Flakon mit 15 ml Lösung (Nasentropfen, Nasenspray in Glas oder Nasenspray in Plastik).
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - B-2880 Bornem

Zulassungsnummer:

BE226572 (Nasenspray, Lösung (Glas))
BE226563 (Nasentropfen, Lösung)
BE060435 (Nasenspray, Lösung (PE))

Art der Abgabe

Freie Abgabe.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 01/2018.