

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Fluvoxamine EG 100 mg comprimés pelliculés

maléate de fluvoxamine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Fluvoxamine EG et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Fluvoxamine EG ?
3. Comment prendre Fluvoxamine EG ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Fluvoxamine EG ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Fluvoxamine EG et dans quel cas est-il utilisé ?

La fluvoxamine appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Fluvoxamine EG contient une substance appelée « fluvoxamine ». Il s'agit d'un antidépresseur.

Fluvoxamine EG est utilisé pour traiter

- la dépression (épisode de dépression majeure)
- le trouble obsessionnel compulsif (pensées répétitives et obsédantes accompagnées de comportements non maîtrisables; TOC). Le TOC est un trouble anxieux

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Fluvoxamine EG ?

Ne prenez jamais Fluvoxamine EG et parlez-en à votre médecin si

- vous êtes allergique à la fluvoxamine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- vous prenez des médicaments appelés inhibiteurs des monoamine oxydases (IMAO), qui sont parfois prescrits pour traiter la dépression ou l'anxiété, y compris le linézolide (un antibiotique qui est également un IMAO).

Vous devez attendre au moins 2 semaines après l'arrêt du traitement par un IMAO irréversible avant de débiter le traitement par fluvoxamine. Néanmoins, après l'arrêt du traitement par certains IMAO réversibles, le traitement par fluvoxamine peut débiter le lendemain. Dans des situations exceptionnelles, le linézolide (un antibiotique qui est aussi un IMAO) peut être utilisé avec la fluvoxamine, à condition que le médecin vous surveille étroitement. Votre médecin vous dira comment prendre Fluvoxamine EG une fois que vous aurez arrêté l'IMAO.

- Si vous prenez de la tizanidine, un médicament souvent utilisé comme relaxant musculaire.

- Si vous prenez du pimozide, un neuroleptique utilisé pour le traitement de la schizophrénie et d'autres maladies psychiatriques.
- Si vous allaitez.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Fluvoxamine EG:

- si vous avez récemment eu une crise cardiaque
- si vous êtes enceinte ou si vous pourriez l'être
- si vous avez une épilepsie
- si vous avez des antécédents de problèmes hémorragiques, ou si vous utilisez régulièrement des médicaments qui augmentent le risque de saignements, tels que des antidouleurs courants, ou si vous êtes enceinte (voir « Grossesse »)
- si vous avez un diabète
- si vous recevez une thérapie par électrochocs
- si vous avez déjà eu une manie (sensation d'allégresse ou de surexcitation)
- si vous avez des problèmes au niveau du foie ou des reins
- si vous avez une pression élevée dans les yeux (glaucome)
- si vous avez moins de 18 ans (voir également rubrique 3 « Comment prendre Fluvoxamine EG »)
- si vous prenez des médicaments contenant buprénorphine ou buprénorphine/naloxone, car ces produits pris en association avec Fluvoxamine EG peuvent induire un syndrome sérotoninergique, une affection pouvant menacer le pronostic vital (pour les symptômes, voir la rubrique 4, « Quels sont les effets indésirables éventuels ? », voir également « Autres médicaments et Fluvoxamine EG »).

Si l'une des remarques mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, votre médecin vous dira si vous pouvez débuter la prise de Fluvoxamine EG en toute sécurité.

Occasionnellement, une **sensation d'agitation** se manifestant par exemple par une incapacité à rester assis ou debout sans bouger (acathisie) peut survenir ou augmenter pendant les premières semaines du traitement par Fluvoxamine EG, avant l'apparition de l'effet antidépresseur.

Consultez immédiatement votre médecin si vous présentez ces symptômes. Dans ce cas, une adaptation de la dose pourrait s'avérer utile.

Des réactions cutanées sévères ont été rapportées lors de l'utilisation de Fluvoxamine EG. Arrêtez de prendre Fluvoxamine EG et contactez immédiatement un médecin si une éruption cutanée ou des lésions des muqueuses apparaissent. Une éruption cutanée sévère peut être une éruption qui débute aux extrémités, généralement des deux côtés du corps, et s'étend en cercles concentriques ressemblant à des cibles (érythème polymorphe), une éruption étendue associant cloques et décollement cutané, en particulier autour de la bouche, du nez et des parties génitales (syndrome de Stevens-Johnson), un décollement cutané de grandes surfaces de peau (plus de 30 % de la surface du corps – nécrolyse épidermique toxique).

Les médicaments comme Fluvoxamine EG (appelés ISRS) peuvent causer des symptômes de dysfonction sexuelle (voir rubrique 4). Dans certains cas, ces symptômes se sont prolongés après l'arrêt du traitement.

Pensées suicidaires et aggravation de votre dépression ou trouble anxieux:

Si vous êtes déprimé(e) et/ou souffrez d'anxiété, vous pouvez parfois présenter des envies de vous blesser ou de vous tuer. Il se peut que ce phénomène s'accroisse au début de la première prise d'antidépresseurs, car tous ces médicaments mettent du temps pour agir, habituellement deux semaines environ mais parfois plus longtemps.

Vous avez plus de chances que cela vous arrive

- si vous avez déjà eu des envies de vous blesser ou de vous tuer
- si vous êtes un jeune adulte. Les informations tirées des essais cliniques ont démontré une

élévation du risque de comportement suicidaire chez les adultes âgés de moins de 25 ans et traités par un antidépresseur pour une affection psychiatrique.

Si des envies de vous blesser ou de vous tuer vous prennent un moment ou l'autre, **joignez votre médecin ou rendez-vous immédiatement dans un hôpital.**

Il est possible que cela vous soulage de prévenir un parent ou un ami proche de votre dépression ou de votre anxiété et de leur demander de lire cette notice. Vous pourriez les prier de vous dire s'ils pensent que votre dépression ou votre anxiété empire ou s'ils s'inquiètent de certaines modifications de votre comportement.

Consultez immédiatement votre médecin si vous avez toute pensée ou sensation désagréable.

Enfants et adolescents de moins de 18 ans

Les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne doivent pas prendre ce médicament, sauf s'ils sont traités pour un trouble obsessionnel compulsif (TOC).

En effet, Fluvoxamine EG n'est pas utilisé pour traiter la dépression chez les personnes de moins de 18 ans. Lorsqu'elles prennent ce type de médicament, les personnes de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables tels qu'une tentative de suicide, des pensées suicidaires et un comportement hostile (agressivité, comportement d'opposition et colère).

Si votre médecin a prescrit Fluvoxamine EG à une personne de moins de 18 ans et que vous souhaitez en discuter, veuillez le consulter. Vous devez avertir votre médecin si l'un des symptômes mentionnés ci-dessus apparaît ou s'aggrave chez des patients de moins de 18 ans prenant Fluvoxamine EG.

De plus, on ignore si la prise de Fluvoxamine EG chez les patients de moins de 18 ans peut affecter à long terme la croissance, la maturation ou le développement intellectuel et comportemental.

Autres médicaments et Fluvoxamine EG

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris les médicaments obtenus sans ordonnance. Cela inclut les remèdes à base de plantes.

- Vous ne devez pas débiter la prise d'un médicament à base de millepertuis (médicament à base de plantes) pendant que vous êtes traité(e) par Fluvoxamine EG, car cela pourrait augmenter les effets indésirables. Si vous prenez déjà du millepertuis lorsque vous commencez le traitement par Fluvoxamine EG, arrêtez la prise du millepertuis et parlez-en à votre médecin lors de votre prochaine visite.
- Si vous avez pris un médicament pour traiter une dépression ou une anxiété au cours des deux dernières semaines, ou si vous souffrez de schizophrénie, demandez conseil à votre médecin ou à un pharmacien.

Votre médecin ou votre pharmacien vérifiera si vous prenez d'autres médicaments pour traiter votre dépression ou d'autres troubles psychotiques apparentés s médicaments peuvent inclure:

- benzodiazépines
- antidépresseurs tricycliques
- neuroleptiques ou antipsychotiques
- lithium
- tryptophane
- inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO) tel que le moclobémide.
- pimozide
- inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) tel que le citalopram

Votre médecin vous dira si vous pouvez débiter la prise de Fluvoxamine EG en toute sécurité.

Vous devez également avertir votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez **l'un des médicaments énumérés ci-dessous**:

- aspirine (acide acétylsalicylique) ou médicaments de type aspirine, utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (arthrite)
- ciclosporine, utilisée pour réduire l'activité du système immunitaire
- méthadone, utilisée pour traiter la douleur et les symptômes de sevrage
- mexilétine, utilisée pour traiter les anomalies du rythme cardiaque
- phénytoïne ou carbamazépine, utilisées pour traiter l'épilepsie
- propranolol, utilisé pour traiter l'hypertension et les troubles cardiaques
- ropinirole, utilisé pour traiter la maladie de Parkinson
- un « tryptan », utilisé pour traiter les migraines, tel que le sumatriptan
- terfénadine, utilisée pour traiter les allergies. Fluvoxamine EG ne doit pas se prendre en même temps que la terfénadine.
- sildénafil, utilisé pour traiter une mauvaise fonction érectile
- théophylline, utilisée pour traiter l'asthme et la bronchite
- tramadol, un antidouleur
- buprénorphine ou buprénorphine/naloxone
- clopidogrel, warfarine, nicoumalone ou tout autre médicament utilisé pour empêcher la formation de caillots sanguins

Si vous prenez ou avez pris récemment l'un des médicaments mentionnés dans la liste ci-dessus, et que vous n'en avez pas encore parlé à votre médecin, retournez le voir et demandez-lui ce que vous devez faire. Il sera peut-être nécessaire de modifier votre dose ou de vous administrer un autre médicament.

Fluvoxamine EG avec des aliments et boissons

- Ne buvez pas d'alcool si vous prenez ce médicament car l'alcool renforce l'action de Fluvoxamine EG et vous rendra somnolent(e) et instable.
- Si vous buvez normalement beaucoup de thé, de café ou de boissons non alcoolisées contenant de la caféine, vous pouvez développer des symptômes tels que des tremblements des mains, des nausées, un rythme cardiaque rapide (palpitations), une agitation et des difficultés à dormir (insomnie). Si vous réduisez votre consommation de caféine, ces symptômes devraient disparaître.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

On ne dispose que d'une expérience limitée concernant l'utilisation de fluvoxamine pendant la grossesse. **Ne prenez pas la fluvoxamine si vous êtes enceinte sauf si votre médecin l'estime absolument nécessaire. Si vous prenez actuellement de la fluvoxamine et que vous planifiez une grossesse (femme) ou la conception d'un enfant (homme), veuillez consulter votre médecin afin de décider s'il est nécessaire ou adéquat de vous administrer une autre médication.**

Si vous prenez Fluvoxamine EG en fin de grossesse, il peut y avoir un risque accru de saignement vaginal abondant peu après la naissance, en particulier si vous avez un antécédent de troubles hémorragiques. Votre médecin ou votre sage-femme doit être informé(e) que vous prenez Fluvoxamine EG pour qu'il/elle puisse vous conseiller.

Veillez vous assurer que votre sage-femme et/ou votre médecin sache que vous êtes traitée par Fluvoxamine EG. Lorsqu'ils sont pris pendant la grossesse, en particulier durant les 3 derniers mois de la grossesse, les médicaments tels que la fluvoxamine peuvent augmenter le risque d'une affection sévère survenant chez les bébés, appelée « hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né (HPPN) », où le bébé respire plus vite et apparaît bleuâtre. Ces symptômes débutent généralement au cours des 24 premières heures suivant la naissance. Si c'est le cas pour votre bébé, vous devez contacter immédiatement votre sage-femme et/ou votre médecin.

Vous ne devez pas arrêter brutalement le traitement par fluvoxamine. Si vous prenez de la fluvoxamine durant les 3 derniers mois de la grossesse, votre bébé pourrait présenter certains autres symptômes à la naissance, en plus des troubles respiratoires ou de la peau bleuâtre: incapacité à dormir ou à se nourrir correctement, froideur ou chaleur excessive, vomissements, pleurs fréquents, muscles raides ou lâches (mous), léthargie, somnolence, tremblements, agitation ou convulsions. Si votre bébé présente l'un de ces symptômes à la naissance, contactez immédiatement votre médecin.

Allaitement

La fluvoxamine s'élimine dans le lait maternel. Il existe un risque d'effet sur le bébé. Vous devez donc discuter avec votre médecin, qui décidera si vous devez arrêter l'allaitement ou arrêter la thérapie par fluvoxamine.

Fertilité

Les études animales ont démontré que la fluvoxamine réduit la qualité du sperme. En théorie, cela pourrait affecter la fertilité, mais jusqu'à présent, aucun impact sur la fertilité humaine n'a été observé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez conduire des véhicules et utiliser des machines pendant que vous prenez ce traitement, aussi longtemps que ce médicament ne vous rend pas somnolent(e).

Fluvoxamine EG contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Fluvoxamine EG ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Dose initiale habituelle pour l'adulte (18 ans et plus):

Traitement de la dépression:

- Commencer avec 50 ou 100 mg par jour, à prendre le soir.

Traitement du trouble obsessionnel compulsif:

- Commencer avec 50 mg par jour, de préférence le soir.

Si vous ne commencez pas à vous sentir mieux après quelques semaines, parlez-en à votre médecin qui vous conseillera. Il/elle peut décider d'augmenter progressivement la dose.

La dose quotidienne maximale recommandée est de 300 mg.

Si votre médecin vous conseille de prendre plus de 150 mg par jour, **ne prenez pas** cette dose en une fois; demandez à votre médecin quand vous devez prendre cette dose.

Dose habituelle pour l'enfant et l'adolescent atteint de trouble obsessionnel compulsif - TOC (8 ans et plus)

Commencer avec 25 mg par jour, de préférence à l'heure du coucher. Tous les 4 à 7 jours et selon la tolérance, votre médecin peut augmenter la dose par paliers de 25 mg, jusqu'à l'obtention d'une dose efficace.

La dose quotidienne maximale est de 200 mg.

Si votre médecin vous conseille de prendre plus de 50 mg par jour, **ne prenez pas** cette dose en une fois; demandez à votre médecin quand vous devez prendre cette dose. Si la dose n'est pas répartie en prises égales, la dose la plus élevée doit se prendre le soir.

Les enfants et les adolescents de moins de 18 ans **ne doivent pas prendre** ce médicament pour traiter la dépression. Ce médicament ne doit être prescrit aux enfants et aux adolescents que pour traiter le trouble obsessionnel compulsif (TOC).

Comment prendre Fluvoxamine EG

Avalez les comprimés de Fluvoxamine EG avec un peu d'eau, **sans** les mâcher.

Les comprimés peuvent être divisés en doses égales.

Quel est le délai d'action?

Fluvoxamine EG peut mettre un certain temps avant d'agir. Certains patients ne ressentent aucune amélioration pendant les 2 ou 3 premières semaines du traitement.

Continuez à prendre vos comprimés jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter de le faire. Même si vous commencez à vous sentir mieux, votre médecin peut souhaiter que vous poursuiviez la prise des comprimés pendant un certain temps, pendant au moins six mois afin de s'assurer que le médicament a agi complètement.

N'arrêtez pas trop rapidement la prise de Fluvoxamine EG.

Vous pouvez souffrir de **symptômes de sevrage** tels que:

- agitation et anxiété
- confusion
- diarrhée
- difficultés à dormir/rêves intenses
- étourdissements
- instabilité émotionnelle
- maux de tête
- irritabilité
- nausées et/ou vomissements
- palpitations (accélération des battements cardiaques)
- troubles sensoriels (tels que des sensations de choc électrique ou des troubles visuels)
- sueurs
- tremblements

Lorsque vous arrêtez la prise de Fluvoxamine EG, votre médecin vous aidera à réduire progressivement votre dose sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, afin de réduire le risque de symptômes de sevrage. Chez la plupart des patients, les symptômes ressentis à l'arrêt du traitement par Fluvoxamine EG sont légers et disparaissent spontanément dans les deux semaines. Chez certaines personnes, ces symptômes peuvent s'avérer plus sévères ou persister pendant plus longtemps.

Si vous développez des symptômes de sevrage lorsque vous arrêtez la prise de vos comprimés, votre médecin peut décider d'arrêter le traitement d'une manière plus lente. Si vous développez des symptômes de sevrage sévères à l'arrêt du traitement par Fluvoxamine EG, veuillez consulter votre

médecin. Il/elle peut vous demander de reprendre vos comprimés et d'arrêter le traitement plus lentement (voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

Si vous développez un symptôme quelconque à l'arrêt du traitement, **contactez** votre médecin.

Si vous avez pris plus de Fluvoxamine EG que vous n'auriez dû

Si vous ou quelqu'un d'autre avez pris trop de Fluvoxamine EG (un surdosage), prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245) ou rendez-vous à l'hôpital immédiatement. Emportez l'emballage du médicament avec vous.

Les symptômes d'un surdosage incluent les symptômes suivants mais ne se limitent pas à cette liste: nausées, vomissements, diarrhée et sensation de somnolence ou d'étourdissement. On a également rapporté des incidents cardiaques (rythme cardiaque lent ou rapide, tension artérielle faible), des problèmes au niveau du foie, des convulsions (crises) et un coma.

Si vous oubliez de prendre Fluvoxamine EG

Si vous oubliez un comprimé, attendez le moment de la dose suivante. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets secondaires suivants ont été signalés:

Effets indésirables associés à ce type de médicament

Occasionnellement, des **pensées suicidaires ou des pensées d'automutilation** peuvent survenir ou augmenter pendant les premières semaines du traitement par Fluvoxamine EG, avant l'apparition de l'effet antidépresseur.

Consultez immédiatement votre médecin si vous avez toute pensée ou sensation désagréable.

Si vous présentez **plusieurs symptômes en même temps**, vous pourriez avoir l'une des affections rares suivantes:

- syndrome sérotoninergique: si vous avez des sueurs, une raideur ou des spasmes musculaires, une instabilité, une confusion, une irritabilité ou une agitation extrême
- syndrome malin des neuroleptiques: si vous avez une raideur musculaire, une température élevée, une confusion et d'autres symptômes apparentés.
- SIADH (syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique): si vous vous sentez fatigué(e), faible ou confus(e) et si vous avez une douleur ou une raideur musculaire ou des mouvements musculaires incontrôlables.
- réactions cutanées sévères, telles que des éruptions ou des rougeurs sévères, notamment une éruption débutant généralement des deux côtés du corps, et s'étendant en cercles concentriques qui ressemblent à des cibles (érythème polymorphe), une éruption étendue associant cloques et décollement cutané, en particulier autour de la bouche, du nez et des parties génitales (syndrome de Stevens-Johnson), un décollement cutané de grandes surfaces de peau (plus de 30 % de la surface du corps – nécrolyse épidermique toxique).

La fréquence de ces effets indésirables est inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Arrêtez la prise de Fluvoxamine EG et **contactez immédiatement votre médecin**.

Si des hématomes (bleus) inhabituels ou des taches violettes apparaissent sur votre peau, si vous vomissez du sang ou si vous avez du sang dans vos selles, consultez votre médecin.

L'arrêt du traitement par fluvoxamine (particulièrement en cas d'arrêt brutal) induit fréquemment l'apparition de symptômes de sevrage (voir rubrique 3 « Symptômes de sevrage »).

Certains patients **ressentent de légères nausées** lorsque Fluvoxamine EG commence à agir. Même si la sensation de nausées est désagréable, elle disparaîtra rapidement si vous continuez à prendre vos comprimés de la manière prescrite. Cela peut prendre plusieurs semaines.

Effets indésirables spécifiquement associés à Fluvoxamine EG

Fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

- agitation
- anxiété
- constipation
- diarrhée
- difficultés à dormir
- étourdissements
- bouche sèche
- rythme cardiaque plus rapide
- sensation de somnolence (léthargie)
- sensation de malaise
- maux de tête
- indigestion
- perte d'appétit
- nervosité
- douleurs à l'estomac
- sueurs
- tremblements
- faiblesse musculaire (asthénie)
- vomissements

Peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

- réactions allergiques cutanées (incluant un gonflement du visage, des lèvres ou de la langue, une éruption cutanée ou des démangeaisons)
- confusion
- retard de l'éjaculation
- étourdissements lors du passage trop rapide à la position debout
- hallucinations
- manque de coordination
- douleurs musculaires ou articulaires
- agression

Rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- convulsions
- plaintes au niveau du foie
- manie (sensation d'allégresse ou de surexcitation)

- sensibilité au soleil
- sécrétion imprévue de lait

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- acathisie (agitation)
- anomalies du goût
- anorgasmie (incapacité à atteindre un orgasme)
- chez les femmes: troubles menstruels (problèmes au niveau des règles ou saignements mensuels)
- saignements vaginaux abondants peu après la naissance (hémorragie du post-partum), voir « Grossesse » dans la rubrique 2 pour plus d'informations
- troubles de la miction (tels que le besoin d'uriner souvent pendant la journée et/ou la nuit, la perte brutale de contrôle de l'émission d'urine pendant le jour et/ou la nuit, ou l'incapacité à uriner)
- paresthésies (picotements ou engourdissement)
- glaucome (augmentation de la pression dans l'oeil)
- dilatation des pupilles
- augmentation des taux de l'hormone prolactine (une hormone qui aide à la production de lait chez une mère qui allaite)
- modifications du poids

On a observé un risque accru de fractures osseuses chez les patients prenant ce type de médicaments.

Effets indésirables liés au traitement d'un TOC chez les enfants et les adolescents, fréquence indéterminée:

- Hypomanie (sensation d'allégresse ou de surexcitation)
- Agitation
- Convulsions
- Difficultés à dormir (insomnie)
- Manque d'énergie (asthénie)
- Hyperactivité (hyperkinésie)
- Somnolence
- Indigestion

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via: **Belgique:** Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) – Division Vigilance – Boîte Postale 97 – B-1000 Bruxelles Madou – site internet: www.notifieruneffetindesirable.be.

Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy – E-mail: crpv@chru-nancy.fr – Tél.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 ou Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé à Luxembourg – E-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu – Tél.: (+352) 247-85592. Lien pour le formulaire: <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Fluvoxamine EG ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
À conserver dans l'emballage extérieur d'origine.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Fluvoxamine EG ?

La substance active est le maléate de fluvoxamine.

Chaque comprimé à 100 mg de Fluvoxamine EG contient 100 mg de maléate de fluvoxamine.

Les autres composants sont:

- amidon de maïs
- silice colloïdale anhydre
- amidon prégélatinisé
- fumarate de stéaryle sodique
- mannitol
- macrogol 6000
- talc
- dioxyde de titane (E 171)
- hypromellose

Aspect de Fluvoxamine EG et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés à 100 mg de Fluvoxamine EG sont blancs à blanc cassé, ronds, biconvexes et pelliculés; ils présentent une barre de cassure des deux côtés et portent l'inscription « FLM 100 ». Les comprimés peuvent être divisés en doses égales.

Les comprimés sont fournis sous plaquettes faites de plastique et d'aluminium. Présentations de 10, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 250, 1000 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

EG (Eurogenerics) SA – Esplanade Heysel b22 – 1020 Bruxelles

Fabricants

Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout

STADA Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Allemagne

Synthon BV - Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen - Pays-Bas

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:

BE: Fluvoxamine EG 100 mg comprimés pelliculés

LU: Fluvoxamine EG 100 mg comprimés pelliculés

FI: Fluvosol 50 mg/100 mg tabletti kalvopäällysteinen
IT: Fluvoxamina EG 50 mg/100 mg

Numéro d'autorisation de mise sur le marché: BE221164

Mode de délivrance: sur prescription médicale

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée/révisée est 10/2022 / 07/2022.