

B. NOTICE

NOTICE**1. Nom du médicament vétérinaire**

POVIDERM SOL, 30 mg/g, Solution pour application cutanée pour chien et lapin

2. Composition**Substance active :**

Par gramme :

Povidone iodée 30 mg/g (eq. 3 mg iode)

3. Espèces cibles

Chien, lapin.

4. Indications d'utilisation

Traitement d'appoint préventif des infections cutanées et des plaies.

5. Contre-indications

Ne pas appliquer de manière prolongée ou répétée sur des tissus fortement différenciés comme les muscles, les tendons, les nerfs et le cartilage.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active iode ou à un des excipients.

6. Mises en garde particulièresPrécautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles :

Éviter le contact avec les yeux.

En cas de traitement de surfaces importantes ou d'utilisation prolongée, on tiendra compte de la possibilité de résorption de l'iode à travers la peau.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la povidone iodée, à la povidone et /ou à l'iode doivent éviter contact avec le médicament vétérinaire. Elles doivent porter des gants appropriés et des vêtements protecteurs lors de l'utilisation du produit.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement la zone exposée avec de l'eau.

Consultez un médecin en cas de réactions allergiques cutanées apparaissant après exposition à ce produit. Un gonflement de la face, des lèvres ou des yeux, sont des signes plus graves d'une allergie et justifient une assistance médicale urgente.

Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion accidentelle en lui montrant l'étiquette ou la notice.

Gestation et lactation :

L'utilisation de la povidone iodée n'est pas contre-indiquée pendant la gestation et la lactation.

Surdosage :

Vu la toxicité relativement faible de cet antiseptique, le risque d'effets toxiques en cas d'utilisation excessive est limité.

Incompatibilités majeures:

Ne pas associer à d'autres antiseptiques ou d'autres médicaments topiques. Ne pas utiliser en même temps que de l'eau oxygénée, des dérivés mercuriels et du thiosulfate sodique.

7. Effets indésirables

Chien, lapin :

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée à partir des données disponibles) :	Ralentissement de la cicatrisation ¹ . Irritation sur la site d'application ² . Acidose ^{3,4} . Hypernatrémie ⁴ . Troubles de la fonction rénale ⁴ . Dysfonctionnement thyroïdien (p.ex. hyperthyroïdie) ⁴ .
--	---

¹ Après traitement prolongé, il peut y avoir ralentissement ou même arrêt de l'épithélialisation ainsi qu'un ralentissement de la cicatrisation.

² Surtout en cas d'applications fréquentes.

³ Acidose métabolique.

⁴ En cas d'application prolongée sur de grandes surfaces cutanées.

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament. Si vous constatez des effets indésirables, même ceux ne figurant pas sur cette notice, ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez contacter en premier lieu votre vétérinaire. Vous pouvez également notifier tout effet indésirable au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché en utilisant les coordonnées figurant à la fin de cette notice, ou par l'intermédiaire de votre système national de notification: www.notifieruneffetindesirable-animaux.be/ ou mail: adversedrugreactions_vet@fagg.afmps.be.

8. Posologie pour chaque espèce, voies et mode d'administration

Utilisation cutanée.

Appliquer la solution non diluée de manière régulière sur les surfaces et les plaies à traiter, jusqu'à ce qu'elles soient couvertes d'un mince film homogène.

Le traitement sera éventuellement répété plusieurs fois par jour, jusqu'à l'obtention d'une amélioration visible au niveau des zones à traiter.

9. Indications nécessaires à une administration correcte

Aucun.

10. Temps d'attente

Non applicable.

11. Précautions particulières de conservation

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver en dessous de 25 °C. Protéger des rayons directs du soleil.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur le flacon après Exp. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours.

12. Précautions particulières d'élimination

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Le médicament vétérinaire ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car l'iode pourrait mettre les poissons et autres organismes aquatiques en danger.

Utiliser des dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable. Ces mesures devraient contribuer à protéger l'environnement.

Demandez à votre vétérinaire ou à votre pharmacien comment éliminer les médicaments dont vous n'avez plus besoin.>

13. Classification des médicaments vétérinaires

Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance.

14. Numéros d'autorisation de mise sur le marché et présentations

BE-V196971

Flacons en polyéthylène contenant respectivement 230 g, 460 g, 920 g, 1840 g, 2300 g ou 4600 g de solution antiseptique.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

15. Date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois

Octobre 2026

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données de l'Union sur les médicaments (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Coordonnées

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et coordonnées pour notifier les effets indésirables présumés :

Emdoka bv

John Lijzenstraat 16

2321 Hoogstraten

Tél. : +32 (0)3 315 04 26 – mail@emdoka.be

Fabricant responsable de la libération des lots :

Feramed BV, Veenweg 1, 3771 MT Barneveld, Pays-Bas