

NOTICE

Caniquantel Plus
50,0 mg + 500,0 mg
Comprimés pour chiens et chats

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

LOXAVET Pharma GmbH
Max-Planck-Str. 11
D-85716 Unterschleißheim
Allemagne

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Caniquantel Plus 50,0 mg + 500,0 mg comprimés pour chiens et chats
Praziquantel - Fenbendazole

3. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS

Substances actives :

Chaque comprimé contient 50,0 mg de Praziquantel et 500,0 mg de Fenbendazole.

Liste des excipients :

Laurylsulfate de sodium, Povidone, Stéarate de magnésium, dry meat aroma, croscarmellose sodique

4. INDICATIONS

Traitement des infestations mixtes par les vers ronds adultes et les vers plats adultes suivants :

CHEZ LE CHIEN :

Ascaris:	Toxocara canis Toxascaris leonina
Ancylostomes:	Uncinaria stenocephala Ancylostoma caninum
Trichuris:	Trichuris vulpis
Cestodes:	Echinococcus granulosus Echinococcus multilocularis Taenia spp. Mesocestoides spp.

Chiots : Parce que la plus précoce possibilité pour un chiot de contracter une infestation par des cestodes n'existe qu'après la troisième semaine de vie, le traitement avec les comprimés de Caniquantel Plus suite à un diagnostic d'infestation combinée, n'est indiqué qu'après la troisième semaine de vie.

CHEZ LE CHAT :

Ascaris:	Toxocara canis Toxascaris leonina
Ancylostomes:	Ancylostoma tubaeforme
Cestodes:	Taenia taeniaeformis Echinococcus multilocularis, Mesocestoides spp.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser sur des femelles gestantes.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Aux doses recommandées, aucun effet indésirable n'a été observé.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCES CIBLES

Chiens et chats.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION**Posologie :**

La dose recommandée est de 5 mg de praziquantel et de 50 mg de fenbendazole par kilo de poids vif. Ce qui correspond à un comprimé par 10 kg de poids vif avec la posologie suivante :

- 1 comprimé jusqu'à 10 kg de poids vif,
- 2 comprimés de 10 à 20 kg de poids vif,
- 3 comprimés de 20 à 30 kg de poids vif ...

Chats : En général, chez les chats, en fonction de leur poids corporel, on administre un 1/2 comprimé.

Lors d'infestations par des ancylostomes ou des trichures, le traitement unique est également insuffisant. Il faut dans ces cas donner un comprimé par 10 kg de poids vif pendant 3 jours consécutifs.

Mode et voie d'administration :

Les comprimés doivent être administrés oralement directement ou mélangés avec un peu de viande ou écrasés en petits morceaux et mélangés à de la nourriture.

Des mesures diététiques telles que délai d'attente avant de ré-administrer de la nourriture ne sont pas nécessaires.

En cas d'une infestation à ascaris chez des jeunes animaux, une suppression complète des vers ne peut être atteinte. Par conséquence, les personnes en contact avec ces jeunes animaux présentent un risque d'infestation.

Les jeunes animaux devront donc être retraités à intervalles de 14 jours jusqu'à 2-3 semaines après le sevrage avec un médicament approprié contre les nématodes.

Il n'y a pas d'interactions médicamenteuses et autres connues.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Sans objet.

10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte et le blister après « Exp ». La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12. MISE EN GARDE PARTICULIÈRE

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Se laver les mains après usage.

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

Juillet 2024

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Sur prescription vétérinaire.

Conditionnements :

Boîte de 2 comprimés sous blister

Boîte de 4 comprimés sous blister

Boîte de 6 comprimés sous blister

Boîte de 8 comprimés sous blister

Boîte de 12 comprimés sous blister

Boîte de 20 comprimés sous blister

Boîte de 50 comprimés sous blister

Boîte de 100 comprimés sous blister

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

BE-V216395