Notice : information de l'utilisateur

EpiPen Junior 150 microgrammes solution injectable en stylo prérempli adrénaline

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice?

- 1. Qu'est-ce que EpiPen Junior et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser EpiPen Junior ?
- 3. Comment utiliser EpiPen Junior?
- 4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
- 5. Comment conserver EpiPen Junior?
- 6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que EpiPen Junior et dans quel cas est-il utilisé ?

EpiPen Junior est une solution stérile en stylo prérempli pour une administration d'urgence dans le muscle (intramusculaire).

L'EpiPen Junior (adrénaline) auto-injecteur est indiqué dans le traitement d'urgence des réactions allergiques sévères (choc anaphylactique) provoquées par des allergènes comme les aliments, les médicaments, les piqûres ou morsures d'insecte, ou d'autres allergènes, ainsi que dans le traitement des réactions sévères provoquées par l'exercice physique ou de cause inconnue.

Les auto-injecteurs EpiPen Junior sont destinés à une administration immédiate chez les patients qui ont un risque élevé de réaction allergique sévère, y compris ceux présentant des antécédents de réactions anaphylactiques.

Les symptômes indiquant le déclenchement d'une réaction anaphylactique peuvent être les suivants: démangeaisons cutanées, éruption (comme de l'urticaire) ; bouffées de chaleur ; gonflement des lèvres, de la gorge, de la langue, des mains et des pieds ; respiration sifflante ; enrouement ; nausée ; vomissements ; crampes abdominales et parfois une perte de conscience.

Le médicament contenu dans l'auto-injecteur (le stylo) est de l'adrénaline, un médicament adrénergique.

Il agit directement sur le système cardiovasculaire (cœur et circulation sanguine) et le système respiratoire (poumons). Il pare les effets potentiellement fatals d'une anaphylaxie en contractant rapidement les vaisseaux sanguins, en relaxant les muscles pulmonaires afin d'améliorer la respiration, réduisant les enflures et stimulant le rythme cardiaque.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser EpiPen Junior ?

N'utilisez jamais EpiPen Junior

Il n'y a aucune raison connue pour ne pas administrer EpiPen Junior lors d'une situation allergique critique.

Avertissements et précautions

Si vous souffrez d'asthme vous pouvez avoir un risque plus élevé d'une réaction allergique (anaphylactique) sévère.

Toute personne qui a eu un épisode d'anaphylaxie devrait consulter son médecin afin de tester les substances auxquelles elle peut être allergique, et ceci afin de les éviter rigoureusement dans le futur. Il est important d'être conscient qu'une allergie vis-à-vis d'une substance peut mener à des allergies vis-à-vis d'un certain nombre d'autres substances apparentées.

Si vous souffrez d'allergies alimentaires, il est important de vérifier la composition de tout ce que vous avalez (y compris les médicaments) car même de petites quantités peuvent provoquer des réactions sévères.

Informez votre médecin si vous avez

- une maladie cardiaque ;
- une thyroïde hyperactive ;
- une pression artérielle élevée ;
- du diabète ;
- une pression augmentée dans votre œil (glaucome);
- de sérieux problèmes aux reins ;
- une tumeur au niveau de votre prostate ;
- un taux sanguin élevé en calcium ou bas en sodium ;
- une maladie de Parkinson.

Malgré ces cas, l'adrénaline reste essentielle lors du traitement d'une anaphylaxie. Les patients concernés, ou toute autre personne devant administrer EpiPen Junior à un patient faisant une réaction allergique, doivent connaître les conditions dans lesquelles EpiPen Junior doit être administré.

Le mode d'emploi doit minutieusement être suivi afin d'éviter une injection accidentelle.

EpiPen Junior doit uniquement être injecté dans la face extérieure de la cuisse. Il ne peut être injecté dans la fesse, vous risquez d'atteindre accidentellement un vaisseau sanguin.

Attention : L'injection accidentelle dans une main ou un doigt peut entraîner une moins bonne circulation sanguine dans la zone concernée. Si une injection accidentelle se produit dans cette zone, vous devez vous rendre au service des urgences de l'hôpital le plus proche pour vous faire soigner.

Si votre couche de graisse sous-cutanée est épaisse, une dose unique d'EpiPen pourrait ne pas être suffisante. Une deuxième injection peut être nécessaire. Respectez scrupuleusement les instructions d'utilisation données à la rubrique 3.

Enfants et adolescents Enfants pesant moins de 15 kg : La pertinence de l'EpiPen Junior (150 microgrammes) doit être jugée individuellement par le médecin.

L'usage chez les enfants pesant moins de 7,5 kg n'est pas recommandé à moins d'être dans une situation où la vie de l'enfant est menacée et sur avis médical.

Enfants et adolescents pesant plus de 30 kg :

Pour ces patients, l'EpiPen 300 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli contenant 300 mg d'adrénaline par dose est disponible.

Autres médicaments et EpiPen Junior

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Cela est très important si vous prenez un des médicaments suivants :

- antidépresseurs tricycliques ou inhibiteurs de la monoamine-oxydase (inhibiteurs MAO) parce que l'effet de l'adrénaline peut être accentué;
- médicaments pour le traitement de la maladie de Parkinson tels que les inhibiteurs de la catéchol-O-méthyl transférase (inhibiteurs de la COMT) et la lévodopa parce que l'effet de l'adrénaline peut être accentué;
- médicaments susceptibles de provoquer des troubles du rythme cardiaque (arythmies) comme la digitaline ou la quinidine;
- les médicaments bêtabloquants pour les maladies du cœur ou les médicaments pour traiter les troubles du système nerveux car ils peuvent réduire l'effet de l'adrénaline ;
- les médicaments pour les maladies de la glande thyroïde ;
- les médicaments qui vous aident à respirer plus facilement, utilisés pour l'asthme (théophylline);
- les médicaments utilisés pour le travail lors de l'accouchement (ocytocine) ;
- les médicaments utilisés afin de traiter les allergies telles que la diphénhydramine ou la chlorphéniramine (antihistaminiques);
- les médicaments qui agissent sur le système nerveux (parasympatholytiques).

Chez les diabétiques sous traitement d'EpiPen Junior, les taux de glucose doivent être minutieusement suivis car l'adrénaline inhibe la sécrétion d'insuline et augmente donc la concentration de glucose dans le sang.

EpiPen Junior avec des aliments, boissons et de l'alcool

Les aliments et les boissons n'ont pas d'influence sur l'utilisation d'EpiPen Junior. Prévenez votre médecin si vous prenez de l'alcool, car l'effet de l'adrénaline peut être augmenté.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Dans une situation de menace pour votre vie, n'hésitez pas à utiliser EpiPen Junior, car votre vie et celle de votre enfant peuvent être en danger. L'expérience concernant l'utilisation d'adrénaline pendant la grossesse est limitée.

Allaitement

EpiPen Junior ne devrait avoir aucun effet sur le nourrisson.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Pas applicable.

EpiPen Junior contient du métabisulfite de sodium (E223) et du chlorure de sodium. Le métabisulfite de sodium peut provoquer, dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité sévères (allergie) ou des difficultés à respirer (spasmes bronchiques).

EpiPen Junior contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose, ce qui signifie qu'il peut être considéré «sans sodium».

3. Comment utiliser EpiPen Junior?

Quand votre médecin prescrit EpiPen Junior, vous devez vous assurer que vous comprenez la raison pour laquelle il vous le prescrit. Vous devez être sûr que vous savez exactement comment utiliser l'auto-injecteur. Utilisez toujours EpiPen Junior exactement comme votre médecin vous l'a enseigné. En cas de doute, demandez à votre médecin, infirmier ou pharmacien de répéter les instructions d'utilisation.

Il est recommandé que les membres de votre famille, le personnel soignant, les enseignants soient également formés à l'utilisation correcte d'EpiPen Junior.

En cas d'injection effectuée par un soignant, l'immobilisation de la jambe du patient doit être assurée pendant l'injection afin de minimiser le risque de lacération, d'aiguille courbée ou d'autres blessures.

Ne replacez en aucun cas l'aiguille usagée.

Pour des fins de formation et de démonstration, un EpiPen Junior dispositif de formation (sans médicament, sans aiguille) est disponible. Le dispositif de formation et l'auto-injecteur EpiPen Junior actif ne devraient pas être portés ensemble pour éviter la confusion dans une situation d'urgence.

EpiPen Junior est destiné aux enfants ayant un poids corporel entre 15 et 30 kg. Pour des adultes, des adolescents et des enfants avec un poids corporel de plus que 30 kg, il existe un auto-injecteur EpiPen qui contient 300 microgrammes d'adrénaline par dose.

Pour des enfants en dessous de 15 kg, voir la section « Enfants et adolescents » ci-dessus.

Dosage

La dose sera fixée par votre médecin qui l'ajustera à votre cas particulier. La dose habituelle lors du traitement d'urgence d'une réaction allergique chez l'enfant (15 à 30 kg) est de 150 microgrammes d'adrénaline par voie intramusculaire.

Si vous constatez des signes d'une réaction allergique aiguë, utilisez EpiPen Junior immédiatement.

Chaque auto-injecteur EpiPen Junior contient une dose unique de 0,3 ml de liquide ce qui correspond à 150 microgrammes d'adrénaline. Après l'injection, un petit volume restera dans l'auto-injecteur mais il ne pourra être réutilisé.

Parfois, une seule dose d'adrénaline ne suffit pas à inverser complètement les effets d'une réaction allergique sévère. Pour cette raison, votre médecin peut vous prescrire plus d'un EpiPen Junior. Si vos symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent dans les 5 à 15 minutes qui suivent la première injection vous, ou la personne vous accompagnant, devez

procéder à une seconde injection. C'est pourquoi vous devez avoir en permanence plus d'un EpiPen Junior sur vous.

Comment EpiPen Junior est donné?

EpiPen Junior est destiné à être utilisé facilement par des personnes n'ayant aucune formation médicale. EpiPen Junior doit simplement être fermement pressé contre la face extérieure de la cuisse à partir d'une distance d'environ 10 cm. Il n'est pas nécessaire de choisir un endroit bien précis **sur la face extérieure de la cuisse**. Lorsque vous pressez fermement EpiPen Junior contre la cuisse, un piston à ressort sera libéré. Celui-ci pousse une aiguille cachée dans le muscle de la cuisse et administre une dose d'adrénaline. Si vous êtes habillé, EpiPen Junior peut être administré à travers les vêtements.

Le mode d'emploi d'EpiPen Junior doit être scrupuleusement suivi.

EpiPen Junior doit UNIQUEMENT être injecté dans la face extérieure de la cuisse. Il ne peut pas être injecté dans la fesse.

Mode d'emploi

Familiarisez-vous entièrement avec EpiPen Junior, sachez comment et quand l'utiliser.



Suivez ces directives uniquement quand vous êtes prêt à l'utiliser.

Tenez l'auto-injecteur par le centre, jamais aux extrémités. Pour une administration adéquate, suivez les différentes étapes du schéma :

- Ne posez jamais votre pouce, les doigts ou la main sur la pointe orange. Ne pressez ou ne poussez jamais la pointe orange avec le pouce, les doigts ou la main ;
- L'aiguille sort de la pointe orange ;
- NE RETIREZ PAS l'opercule de sécurité bleu avant d'être prêt à l'usage.









- 1. Prenez EpiPen Junior dans votre main dominante (la main utilisée pour écrire), avec votre pouce près de l'opercule bleu et fermez le poing autour de l'instrument (la pointe orange vers le bas).
- 2. Retirez l'opercule de sécurité bleu en le tirant verticalement vers le haut avec l'autre main.
- 3. Tenez EpiPen Junior à une distance d'environ 10 cm de la face extérieure de la cuisse. La pointe orange est dirigée vers la face extérieure de la cuisse.
- 4. Pressez **fermement** EpiPen Junior contre la face extérieure de la cuisse sous un angle droit (90 degrés) (vous devez entendre un déclic).
- 5. Maintenez EpiPen Junior contre la cuisse pendant 3 secondes. L'injection est maintenant terminée et la fenêtre de contrôle de l'auto-injecteur est masquée.
- 6. EpiPen Junior doit être retiré (la pointe orange va alors automatiquement s'allonger pour venir couvrir l'aiguille) et jeté en toute sécurité.

Massez **légèrement** le site d'injection pendant 10 secondes. Composez le 112, demandez une ambulance et déclarez un état d'anaphylaxie.

Une petite bulle peut être présente dans l'auto-injecteur EpiPen Junior, elle n'influence pas l'efficacité du produit.

Même si la majorité du liquide (environ 90%) reste dans l'EpiPen Junior après son utilisation, il ne peut pas être réutilisé. Cependant, vous avez reçu la dose correcte de médicament si la pointe orange s'est allongée pour venir couvrir l'aiguille et si la fenêtre de contrôle est masquée. Après son utilisation, jetez EpiPen Junior en toute sécurité dans le tube fourni et emmenez-le avec vous lors d'une visite chez votre médecin, à votre pharmacie ou à l'hôpital.

EpiPen Junior est un traitement d'urgence. Vous devez toujours chercher immédiatement une aide médicale après l'usage d'EpiPen Junior. Composez le 112, demandez une ambulance et déclarez un état d'anaphylaxie, **même si les symptômes semblent s'améliorer.**

Vous devez aller à l'hôpital pour observation et traitement supplémentaire si nécessaire, parce que cette réaction peut réapparaître plus tard.

Pendant que vous attendez l'ambulance vous devez vous coucher avec vos pieds en position surélevée sauf si cela gêne votre respiration. Dans ce cas vous pouvez vous mettre sur une chaise. Demandez à quelqu'un de rester près de vous jusqu'au moment de l'arrivée de l'ambulance si vous ne vous sentez de nouveau pas bien.

Des patients inconscients doivent être placés dans la position latérale de sécurité.

Si vous avez utilisé plus d'EpiPen Junior que vous n'auriez dû Si vous avez utilisé trop d'EpiPen Junior, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).

En cas de surdosage ou d'injection accidentelle d'adrénaline, vous devez toujours rechercher immédiatement une aide médicale.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

De rares cas d'infection sévère de la peau et des tissus mous (infection au site d'injection) ont été déclarés. En présence de signes d'infection au site d'injection, tels que gonflement, rougeur, chaleur ou douleur, demandez toujours une assistance médicale d'urgence.

L'injection accidentelle de stylos dans une main ou un pied a été signalée et peut entraîner une perte d'irrigation sanguine dans la zone touchée. En cas d'injection accidentelle, demandez toujours une assistance médicale d'urgence.

Des réactions allergiques peuvent se manifester chez les patients allergiques au métabisulfite de sodium. Dans de rares cas (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1000), des patients traités par de l'adrénaline ont développé des stress-cardiomyopathies.

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) : rythme cardiaque rapide ou irrégulier (parfois sévère), douleur intense dans la poitrine, hypertension, difficultés à respirer, pâleur, sueurs, nausées, vomissements, maux de tête, étourdissements, faiblesse, tremblements et nervosité ou anxiété, lésion au site d'injection telle qu'ecchymose, saignement, rougeur.

Déclaration des effets secondaires

Madou

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles

Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver EpiPen Junior?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et l'étiquette après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas mettre au réfrigérateur ni congeler.

Conserver l'auto-injecteur dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière. Lorsque l'adrénaline est exposée à l'air ou la lumière, elle se détériore rapidement et devient rose ou brune. Vérifiez de temps à autre le contenu de la cartouche en verre de l'auto-injecteur EpiPen Junior afin de vous assurer que le liquide est encore limpide et incolore. Remplacez l'auto-injecteur à la date de péremption ou avant celle-ci si la solution est colorée ou contient des précipitations (matière solide).

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient EpiPen Junior

- La substance active est l'adrénaline. Chaque dose contient 150 microgrammes d'adrénaline :
- Les autres composants sont chlorure de sodium, métabisulfite de sodium (E223), acide chlorhydrique, eau pour injection.

Aspect d'EpiPen Junior et contenu de l'emballage extérieur

Solution limpide et incolore dans un stylo prérempli (auto-injecteur).

L'auto-injecteur contient 2 ml de solution injectable. Chaque auto-injecteur délivre une dose unique (0,3 ml) de 0,15 mg d'adrénaline.

La longueur de l'aiguille exposée et cachée est d'environ 13 mm.

Emballages:

1 auto-injecteur.

2 x 1 auto-injecteur.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché: Mylan EPD bvba/sprl Terhulpsesteenweg, 6A B-1560 Hoeilaart

Fabricant:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstraße 1, D-61352 Bad Homburg, Allemagne

Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché

EpiPen Junior 150 microgrammes solution injectable en stylo prérempli : BE193907

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :

Nom de l'état membre	Nom du médicament
Islande, Norvège, Finlande, Suède,	EpiPen Jr.
Danemark, République de Slovaquie,	
République Tchèque, Hongrie et Pologne	
Pays-Bas, Belgique, Autriche	EpiPen Junior
Espagne	ALTELLUS 0,15 niňos

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 11/2021. La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2021.