

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

ASEPTIDERM 0,5% Imprägnierter Verband Lösung zur Anwendung auf der Haut

Cetrimid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Aseptiderm jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Aseptiderm und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aseptiderm beachten?
3. Wie ist Aseptiderm anzuwenden ?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aseptiderm aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ASEPTIDERM UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Aseptiderm ist ein Desinfektionsmittel aus der Gruppe der quaternären Ammoniumsorten.

Aseptiderm ist indiziert für:

- die Reinigung und die Desinfektion der Haut im Falle von kleinen Verletzungen.
- die Reinigung und die Desinfektion von kleinen Instrumenten.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ASEPTIDERM BEACHTEN ?

ASEPTIDERM darf nicht angewendet werden,

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Cetrimid oder andere Derivate von quaternärem Ammonium oder gegen eine der anderen, in Aseptiderm enthaltenen Komponenten sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Aseptiderm ist erforderlich,

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Augen.

Vermeiden Sie den Einsatz auf großen Hautflächen.

Aseptiderm darf nicht für das Spülen von weichen Kontaktlinsen verwendet werden.

Beipackzettel

Mit bestimmten Bestandteilen gibt es Unverträglichkeiten: Cetrimid kann durch Seife, anionische Tenside und saure Farbstoffe inaktiviert werden. Auch Eiter und Blut können den Wirkstoff inaktivieren.

Wenn Sie bereits andere Medikamente einnehmen, lesen Sie bitte auch den Abschnitt „Bei Anwendung von Aseptiderm mit anderen Arzneimitteln“.

Bei Anwendung von Aseptiderm mit anderen Arzneimitteln

Nicht gelieferte Daten.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

3. WIE IST ASEPTIDERM ANZUWENDEN

Wenden Sie Aseptiderm immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die imprägnierten Verbänden und die Lösung zur Anwendung auf der Haut sind für den externen Gebrauch bestimmt.

imprägnierte Verbänden :

Den Beutel durch Aufreißen der Rillen nach öffnen.

Den gewünschten Bereich mit der imprägnierten Verband reinigen, diese dabei gefaltet oder als Tampon verwenden.

In der Breite in regelmäßige Bänder gerissene Kompressen können als kleine Verbände genutzt werden, die mit einem Stück Klebeband befestigt werden.

Ein- oder zweimal pro Tag auf die Wunde anwenden.

Lösung zur Anwendung auf der Haut :

Die Lösung unverdünnt anwenden.

Wenn Sie eine größere Menge von Aseptiderm angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie sich zu viel Aseptiderm verabreicht haben, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder die Giftzentrale (Giftnotruf: 070/245.245).

Das Risiko einer Verwendung von zu hohen Dosen ist unwahrscheinlich.

Eine versehentliche Aufnahme von Cetrimid über den Mund kann zu einer Reizung der gastrointestinalen Schleimhäute und zu Erbrechen führen.

Bei einer versehentlichen Aufnahme der Lösung kann eine Magenspülung notwendig sein.

Wenn Sie die Anwendung von Aseptiderm abbrechen

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Beipackzettel

Wie alle Arzneimittel kann Aseptiderm Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Zu erwarten stehen die folgenden unerwünschten Nebenwirkungen:

- Lokale Reizungen und Sensibilisierung auf die Bestandteile des Präparats, insbesondere nach einer Anwendung von längerer Dauer.
- **Korneagiftigkeit**
- Vorhandensein von Methämoglobin im Blut, wenn große Hautflächen von dem Produkt abgedeckt wurden (z. B. der gesamte Thorax).

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST ASEPTIDERM AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren,
Bei Raumtemperatur lagern.

Sie dürfen Aseptiderm nach dem auf der Packung nach EX" angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Bezüglich jeglicher Informationen über dieses Medikament nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt oder Apotheker auf.

Was Aseptiderm enthält

Der Wirkstoff ist Cetrimid.

Die Verbänden sind mit 3,5 ml Lösung imprägniert, die 17,5 mg Cetrimid enthält, d. h. 5 mg/ml.

Die Lösung zur Anwendung auf der Haut enthält 500 mg Cetrimid auf 100 ml, d. h. 5 mg/ml.

Die sonstigen Bestandteile sind aromatische Pinienessenz, Ethylenoxidkondensat auf Rizinusöl, Chinolingelb (E104), gereinigtes Wasser.

Imprägnierte Verbänden: Die Lösung wird auf Verbänden aus hydrophiler Viskosewatte imprägniert.

Wie Aseptiderm aussieht und Inhalt der Packung

Aseptiderm 0,5% imprägnierte Verbänden :

Durch den Wirkstoff imprägnierte Verbänden, die einzeln in einem hermetisch versiegelten Beutel verpackt sind.

Schachtel mit 7 einzelnen Beuteln. Schachtel mit 1000 Beuteln (klinische Verpackung).

Aseptiderm 0,5% Lösung zur Anwendung auf der Haut :

Lösung zur Anwendung auf der Haut

Plastikflakon mit 125 ml Flüssigkeit.

Beipackzettel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

LABORATOIRES BELGES PHARMACOBEL SA, avenue de Scheut 46-50, 1070 Brüssel, Belgien.

Hersteller:

Laboratoria Smeets - Fotografielaan 42 - B-2610 Wilrijk

Klockner Pentapack - Klocknerstraat 1 - B-3930 Hamont Achel

Registrierungsnummers :

Aseptiderm 0,5% imprägnierte Verbänden : BE213464

Aseptiderm 0,5% Lösung zur Anwendung auf der Haut : BE213473

Abgabe : Apothekenpflichtig

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 06/2010