
GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**ZINXYDerm 10% Salbe****Zinkoxid****Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss ZINXYDerm 10% jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet

1. Was ist ZINXYDerm 10% und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ZINXYDerm 10% beachten?
3. Wie ist ZINXYDerm 10% anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ZINXYDerm 10% aufzubewahren?
6. Weitere Informationen.

1. WAS IST ZINXYDERM 10% UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Salbe zur symptomatischen Behandlung nicht akuter feuchter Ekzeme.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ZINXYDERM 10% BEACHTEN?**ZINXYDERM 10% darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Zinkoxid, Lanolin oder Vaseline sind;
- wenn Sie an feuchten Ekzemen in sehr akuten Phasen leiden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von ZINXYDERM 10% ist erforderlich,

- Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten. Nach der Anwendung sind Reste sorgfältig von den Händen zu entfernen, um jeden unbeabsichtigten Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten zu vermeiden.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Erkrankung nicht abheilt oder schlimmer wird (Rötung, Schmerzen).

Wenn Sie bereits andere Medikamente einnehmen, lesen Sie bitte auch den Abschnitt „Bei Anwendung von ZINXYDERM 10% mit anderen Arzneimitteln“.

Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn eine der oben angeführten Vorsichtssituationen auf Sie zutrifft oder dies in der Vergangenheit der Fall war.

Bei Anwendung von ZINXYDERM 10% mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bezüglich der Anwendung von ZINXYDERM 10% während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde bisher über schädliche Wirkungen nicht berichtet.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von ZINXYDERM 10%

Bei Verletzungen oder offenen Wunden besteht das Risiko einer Lanolinallergie.

3. WIE IST ZINXYDERM 10% ANZUWENDEN?

Wenden Sie ZINXYDERM 10% immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Ein- bis zweimal täglich auftragen.

Haut mit warmem Wasser waschen und mit einem Tuch oder Wattepad sanft trocken tupfen, danach Salbe auftragen. Die Haut kann eventuell mit einem leichten Verband bedeckt werden.

Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, wie lange Sie ZINXYDERM 10% anwenden müssen. Brechen Sie Ihre Behandlung nicht frühzeitig ab.

Wenn Sie eine größere Menge von ZINXYDERM 10% angewendet haben, als Sie sollten

Sollten Sie eine zu hohe Dosis ZINXYDERM 10% angewendet haben, nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder zur Giftnotrufzentrale auf (Tel: 070 / 245 245).

Es gibt keine Berichte über Überdosierungen.

Wenn Sie die Anwendung von ZINXYDERM 10% abbrechen

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann ZINXYDERM 10% Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Allergische Kontaktreaktionen können auftreten.

Diese Nebenwirkungen verschwinden, wenn die Behandlung unterbrochen wird.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST 10% ZINKOXIDSALBE AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25°C (bzw. 30°C) lagern.

Verfalldatum: Sie dürfen ZINXYDERM 10% nach dem auf dem Umkarton nach dem Vermerk „EX“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Sie dürfen ZINXYDERM 10% nicht verwenden, wenn Sie ein anormales Aussehen der Salbe bemerken.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was ZINXYDERM 10% enthält

- Der Wirkstoff ist Zinkoxid.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Vaseline - Lanolin

Wie ZINXYDERM 10% aussieht und Inhalt der Packung

Salbe im Tube zu 20 g

Freie Abgabe

Zulassungsnummer: BE213561

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Laboratoires STEROP - 46-50 Avenue de Scheut -B-1070 Brussels -Belgien

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 06/2011