
NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**ZINXYDerm 10% Pommade****Oxyde de zinc**

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours utiliser ZINXYDERM 10% avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après quelques jours, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que ZINXYDERM 10% et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ZINXYDERM 10%?
3. Comment utiliser ZINXYDERM 10%?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver ZINXYDERM 10%
6. Informations Supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZINXYDERM 10% ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Pommade à utiliser pour le traitement symptomatique des affections eczémateuses suintantes non aigües.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ZINXYDERM 10%**N'utilisez jamais ZINXYDERM 10%**

- Si vous êtes hypersensible à l'oxyde de zinc, à la lanoline ou à la vaseline.
- Si vous présentez des affections suintantes et eczémateuses en périodes très aigües.

Faites attention avec ZINXYDERM 10%

- Evitez le contact avec les yeux et les muqueuses. Après usage, ôtez soigneusement le surplus des mains afin d'éviter tout contact involontaire avec les yeux ou les muqueuses.
- Consultez votre médecin si l'affection ne guérit pas ou s'aggrave (rougeur, douleur).

Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Utilisation d'autres médicaments ».

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessous est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Durant la grossesse et l'allaitement, aucun effet nuisible n'a été rapporté jusqu'à présent.

Informations importantes concernant certains composants de ZINXYDERM 10%

En cas de lésions ou de plaies ouvertes, il existe un risque d'allergie à la lanoline.

3. COMMENT UTILISER ZINXYDERM 10%

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Réaliser 1 à 2 applications par jour.

Appliquer après avoir réalisé un lavage de la peau à l'eau tiède suivi d'un tamponnage léger avec un linge ou un tampon de coton. Recouvrir ou non d'un pansement léger.

Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser ZINXYDERM 10%. N'arrêtez pas prématurément votre traitement.

Si vous avez utilisé plus de ZINXYDERM 10% que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop de ZINXYDERM 10%, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).

Aucun cas de surdosage n'a été signalé.

Si vous arrêtez d'utiliser ZINXYDERM 10%

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, ZINXYDERM 10% peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Des réactions allergiques de contact peuvent se produire.

Ces effets indésirables disparaissent lorsque le traitement est interrompu.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ZINXYDERM 10%

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C (respectivement 30°C).

Date de péremption: Ne pas utiliser ZINXYDERM 10% après la date de péremption mentionnée sur l'emballage après la mention «EX». La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Ne pas utiliser ZINXYDERM 10% si vous constatez un aspect anormal de la pommade.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient ZINXYDERM 10%

- La substance active est l'oxyde de zinc.
- Les autres composants sont la vaseline et la lanoline.

Qu'est-ce que ZINXYDERM 10% et contenu de l'emballage extérieur

Pommade en tube de 20 g.

Délivrance libre

Numéro de l'autorisation sur le marché : BE213561

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Laboratoires STEROP - 46-50 Avenue de Scheut -B-1070 Bruxelles -Belgique

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le