

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

**Glycerine suppo's Kela** volwassenen 2,4 g zetpillen

**Glycerine suppo's Kela** baby's en kinderen 1,3 g zetpillen

*Glycerine*

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- 

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Glycerine suppo's Kela en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u 'dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u 'dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u 'dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. Wat is Glycerine suppo's Kela en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?** Glycerine suppo's Kela zijn zetpillen voor rectaal gebruik (toediening via de anus) die de stoelgang bevorderen.

Ze kunnen gebruikt worden om een voorbijgaande verstopping van de darm tijdelijk te verlichten.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

#### **Wanneer mag u 'dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Als u een belemmering van de darmdoorgang heeft en buikpijn waarvan de oorzaak niet gekend is.
- Bij plotse opstoten van aambeien, anale kloven, bloederige ontsteking van de endeldarm (rectum).

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met 'dit medicijn?**

- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.
- Gebruik Glycerine suppo's Kela uitsluitend rectaal.
- Raadpleeg uw arts wanneer u buikpijn of abnormale effecten waarneemt.
- Gebruik middelen die de stoelgang bevorderen niet langer dan één week zonder advies van de arts.
- Vermijd herhaaldelijk of langdurig gebruik van Glycerine suppo's Kela. Indien u langdurig last heeft, pas dan eventueel uw eetgewoonten en levensgewoonten aan.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

De opname van andere geneesmiddelen kan verminderen als ze gelijktijdig met Glycerine suppo's Kela worden toegediend.

Gebruikt u naast Glycerine suppo's Kela nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

#### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Niet van toepassing.

#### **Zwangerschap en borstvoeding**

Glycerine suppo's Kela mogen gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Glycerine suppo's Kela hebben geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen..

### **3. 'Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik 'dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

*Volwassenen:* per dag 1 tot 2 *suppo's voor volwassenen* diep in de anus inbrengen. Na 5 tot 30 minuten zal de stoelgang op gang komen.

#### **Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar**

*Baby's en kinderen:* per dag 1 tot 2 *suppo's voor baby's en kinderen* diep in de anus inbrengen. Na 5 tot 30 minuten zal de stoelgang op gang komen.

Vermijd herhaaldelijk of langdurig gebruik van Glycerine suppo's Kela. Indien u langdurig last heeft van verstopping van de darm, pas dan eventueel uw eet- gewoonten en levensgewoonten aan.

#### **Heeft u te veel van 'dit medicijn gebruikt?**

Indien plots een zware diarree zou optreden, moet het zout-water-evenwicht hersteld worden.

Als u grote hoeveelheden Glycerine suppo's Kela langs de mond heeft ingenomen, kan dit giftig zijn. Hoofdpijn, misselijkheid, dorst, bloed-en nierproblemen kunnen optreden. In het geval dat uitdroging optreedt, moet het zout-water-evenwicht hersteld worden.

Wanneer u te veel van Glycerine suppo's Kela heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).

**Bent u vergeten Glycerine suppo's Kela te gebruiken?**

Niet van toepassing.

**Als u stopt met het gebruik van Glycerine suppo's Kela**

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt volgens afnemende ernst: zeer vaak ( $\geq 1/10$ ); vaak ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ); soms ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ); zelden ( $\geq 1/10000$ ,  $< 1/1000$ ); zeer zelden ( $< 1/10000$ ), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Soms: een branderig gevoel rondom de anus.

Raadpleeg uw arts bij buikpijn.

**Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie, Galileelaan 5/03, 1210 Brussel, website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be), e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

**5. 'Hoe bewaart u Glycerine Suppo's Kela?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Gebruik 'dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik 'dit medicijn niet als u merkt dat de zetpillen zijn verkleurd.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

**6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

**Welke stoffen zitten er in 'in dit medicijn?**

De werkzame stof in Glycerine suppo's Kela volwassenen is 2,4 g glycerine.

De werkzame stof in Glycerine suppo's Kela baby's en kinderen is 1,3 g glycerine.

- De andere stoffen in Glycerine suppo's Kela zijn gelatine en gezuiverd water.

**Hoe ziet Glycerine suppo's Kela eruit en wat zit er in een verpakking?**

Doos met 10 of 100 zetpillen voor volwassenen of doos met 10 of 100 zetpillen voor baby's en kinderen.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

*Vergunninghouder*

KELA Pharma nv  
Sint Lenaartseweg 48  
B-2320 Hoogstraten

*Fabrikant*

Laboratoria Lambo  
Simon De Heuvellaan 4  
B-2110 Wijnegem

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

Glycerine suppo's Kela Baby's en kinderen 2,4 g zetpillen: BE212992.

Glycerine suppo's Kela Volwassenen 1,3 g zetpillen: BE213001.

**Afleveringswijze**

Vrije aflevering

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2021.**

**Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in MM/JJJJ.**