

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

CYNAROL überzogene Tabletten CYNAROL Lösung zum Einnehmen

Gesäuberter und gereinigter Extrakt von *Cynara scolymus L* Blättern

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich nach einige Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Cynarol und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Cynarol beachten?
3. Wie ist Cynarol einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cynarol aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST CYNAROL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Cynarol ist ein Medikament auf pflanzlicher Basis, das die Gallenentleerung zum Darm erleichtert (cholagogisch) und die Gallensekretion (choloretisch) sowie die Wasserelimination durch die Nieren fördert.

Er ist bei der symptomatischen Behandlung von Verdauungsstörungen angezeigt, wie z. B. Dyspepsie, Völlegefühl, Blähungen und Flatulenz.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON CYNAROL BEACHTEN?

Cynarol darf nicht eingenommen werden,

- Wenn Sie allergisch gegen Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Bei schweren Erkrankungen der Leber und der Gallenblase (Gallensteine, Leberinsuffizienz). Bei Obstruktionen der Lebergänge nicht verwenden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Cynarol anwenden.

Vorsicht das Arzneimittel bei der Anwendung bei Leberverletzungen oder schwerem Leberleiden ist geboten. In diesen Fällen, den Arzt konsultieren.

Nicht über einen längeren Zeitraum anwenden, ohne den Arzt um Rat zu fragen.

Wenn Sie bereits andere Medikamente einnehmen, lesen Sie bitte auch den Abschnitt „Einnahme von Cynarol zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn eine der oben angeführten Vorsichtssituationen auf Sie zutrifft oder dies in der Vergangenheit der Fall war.

Kinder

Den Kindern unter 12 Jahren alt nicht verabreichen.

Einnahme von Cynarol zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Einnahme von Cynarol zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da unzureichende Informationen über die Anwendung des Medikaments während Schwangerschaft und Stillzeit vorhanden sind, ist sie Cynarol in das Periode zu vermeiden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Keine Daten vorhanden. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass die Verabreichung von Cynarol die Fahrtüchtigkeit oder die Fähigkeit zur Bedienung einer Maschine beeinflusst.

Cynarol Lösung zum Einnehmen enthält:

- „Parahydroxybenzoaten“ Konservative und kann allergische Reaktionen (eventuell aufgehoben) verursachen.
- Sorbitol. Bitte nehmen das Mittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden

Cynarol überzogene Tabletten enthält :

- Sacchrose. Bitte nehmen das Mittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden
- Rizinusöl und kann zu Magenstörungen und Durchfall führen.

3. WIE IST CYNAROL EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Arzneimittel zum Einnehmen.

Erwachsene und Kinder über 12 Jahre alt :

Packungsbeilage

Cynarol überzogene Tabletten :

1 à 2 Tabletten, drei Mal pro Tag zu den Mahlzeiten einnehmen. Bis zu 12 Tabletten pro Tag können, in drei Einnahmen aufgeteilt, genommen werden. Die Tabletten müssen mit reichlich Wasser eingenommen werden.

Cynarol Lösung zum Einnehmen :

Ein 2,5ml-graduierter Maßlöffel, 2 Mal pro Tag zu den Mahlzeiten einnehmen. Ein 2,5ml-graduierter Maßlöffel bis zu 4 Mal pro Tag kann eingenommen werden. Diese Menge ist nicht zu überschreiten. Das Medikament in einem Glas Wasser verdünnen.

Anwendung bei Kindern

Den Kindern unter 12 Jahren alt nicht verabreichen.

Bei anhaltenden Symptomen, ihren Arzt nochmals konsultieren.

Wenn Sie eine größere Menge von Cynarol eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie sich zu viel Cynarol verabreicht haben, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder die Giftzentrale (Giftnotruf: 070/245.245).

Symptomen:

Eine Überdosis kann Krämpfe und Diarrhöe hervorrufen. Eine chronische Überdosierung kann dieselben Symptome wie eine akute Überdosierung hervorrufen, jedoch in geringerem Ausmaß.

Behandlung:

Die Verabreichung des Medikaments wird unterbrochen. Eine symptomatische Behandlung erfolgt durch Einnahme von Antispasmodika und Antidiarrhoika.

Wenn Sie die Einnahme von Cynarol vergessen haben, so stellt das kein Risiko für Ihre Gesundheit dar. Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Cynarol abbrechen

Das Medikament ist nur zum Gebrauch bei Aufnahme- und Ausscheidungsstörungen von Fetten und Alkohol.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die Sekretion großer Mengen an Gallensäure kann zu einem Überschuss an Gallensekreten in der Gallenblase führen. Eine übermäßige Abgabe von Gallensekreten in den Darm kann Diarrhöe hervorrufen und bei Darmverschluss (Ileus) schädliche Folgen auslösen.

Die Erhöhung der Gallenproduktion durch die Leber kann eine existierende Leberinsuffizienz verschlechtern.

Das Medikament wirkt selten laxativ.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

5. WIE IST CYNAROL AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Dem Behältnis in der Originalverpackung aufbewahren auf Temperatur nicht über 25°C.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Cynarol enthält

Der Wirkstoff ist der gesäuberte und gereinigte Extrakt von *Cynara scolymus L.* Blättern (*Cynarae scolymus L. fol. succ. extract epurat. siccum*), Lösungsmittlextraktion (Wasser) (DER 3-6:1).

Jede Tablette enthält 200 mg gesäubertes und gereinigtes Extrakt von *Cynara scolymus L.* Blättern, entsprechend 3,75 mg Chlorogensäure.

Der Lösung zum Einnehmen enthält 240mg gesäubertes und gereinigtes Extrakt von *Cynara scolymus L.* Blättern in der 1ml Lösung entsprechend 4,50 mg Chlorogensäure.

Die sonstigen Bestandteile sind :

Cynarol überzogene Tabletten :

Kern : Rizinusöl - Gereinigte Diamoteenerde - Kartoffelstärke - Talkum - Dimeticon 20 - Calcium hydrogenphosphat - Kolloidales Siliziumdioxid - Magnesiumstearat.

Umhüllen : Cellacefat - Diethylphtalat - Gelatine - Gummiarabikum - Talkum - Saccharose - Titandioxid (E 171) - Chlorophyll - Carnaubawachs - Weißes Bienenwachs.

Cynarol Lösung zum Einnehmen :

Glycerol - Sorbitol - Methylparahydroxybenzoat - Propylparahydroxybenzoat - künstliches Orangenaroma (42/412) - Wasser.

Wie Cynarol aussieht und Inhalt der Packung

Cynarol überzogene Tabletten : zum Einnehmen. Blisterpackung Alu/PVC mit 10 überzogene Tabletten. Schachtel mit 20 und 50 überzogene Tabletten.

Cynarol Lösung zum Einnehmen : zum Einnehmen. Glasfläschchen mit 90 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller :

LABORATOIRES BELGES PHARMACOBEL s.a., Avenue de Scheut 46-50, 1070 Brussel, Belgien

Hersteller

LABORATOIRES STEROP s.a., Avenue de Scheut 46-50, 1070 Brüssel, Belgien

Registrierungsnummers :

Packungsbeilage

Cynarol überzogene Tabletten : BE211732
Cynarol Lösung zum Einnehmen: BE211741

Abgabe :
Apothekenpflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im
04/2013