

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

ECHINACIN LIQUIDUM, Lösung zum Einnehmen *Echinacea purpurea* (L) Moench

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Echinacin Liquidum und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Echinacin Liquidum beachten?
3. Wie ist Echinacin Liquidum einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Echinacin Liquidum aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST ECHINACIN LIQUIDUM UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Echinacin Liquidum wird zur symptomatischen Behandlung von Infektionen der oberen Atemwege eingesetzt, nachdem eine schwere Erkrankung ausgeschlossen wurde.

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON ECHINACIN LIQUIDUM BEACHTEN?

Echinacin Liquidum darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen *Echinacea purpurea* oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie gegen andere Pflanzen aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae oder Compositae) allergisch sind.
- wenn Sie eine fortschreitende Krankheit haben, z. B. Tuberkulose, anomale Erhöhung der Anzahl weißer Blutkörperchen, Gewebskrankheiten, multiple Sklerose, Aids und den damit einhergehenden Infektionen sowie Autoimmunerkrankungen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Echinacin Liquidum einnehmen.

In den folgenden Fällen müssen Sie Ihren Arzt oder Apotheker informieren:

- Wenn Sie an einer Krankheit im Zusammenhang mit immunologischen Schäden oder an einer Autoimmunerkrankung leiden.

Wenn Sie bereits andere Arzneimittel anwenden, lesen Sie auch den Abschnitt „Einnahme von Echinacin Liquidum zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

Keine längere Anwendung ohne ärztlichen Rat.

Kinder und Jugendliche:

Die Anwendung des Arzneimittels bei Kindern unter 2 Jahren wird nicht empfohlen.

Einnahme von Echinacin Liquidum zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Angesichts fehlender Informationen über eine mögliche Wechselwirkung mit einer allergischen Desensibilisierungsbehandlung wird empfohlen, Echinacin Liquidum während einer solchen Behandlung nicht zu verwenden.

Da Echinacin Liquidum Alkohol enthält, kann bei gleichzeitiger Einnahme bestimmter Arzneimittel eine DISULFIRAM-Wirkung auftreten (unangenehme Reaktion nach Alkoholkonsum, die sich in Hitzewallungen, Erbrechen und manchmal einem niedrigen Blutdruck äußert).

Einnahme von Echinacin Liquidum zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol
Alkoholismus ist eine relative Kontraindikation.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Aufgrund der nur begrenzten Verfügbarkeit von Daten ist es empfehlenswert, das Arzneimittel nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit einzunehmen, es sei denn, Ihr Arzt empfiehlt es Ihnen.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

In den verschriebenen Dosen beeinflusst die Menge Alkohol, die resorbiert wird, normalerweise nicht die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Flasche eine Menge an Alkohol enthält, die sich beim Bedienen von Maschinen und Fahrzeugen negativ auswirken kann, wenn der gesamte Inhalt der Flasche auf einmal getrunken wird.

Echinacin Liquidum enthält ca. 22 Vol.-% Alkohol (Ethanol),

d. h. 550 mg Ethanol pro Dosis von jeweils 2,5 ml bei Erwachsenen entspricht 12 ml Bier oder 4,6 ml Wein; 275 mg Ethanol pro Dosis von jeweils 1,25 ml bei Kindern entspricht 6 ml Bier oder 2,3 ml Wein.

Schädlich für diejenigen, die unter Alkoholismus leiden.

Bei schwangeren oder stillenden Frauen, Kindern und Hochrisikogruppen wie Patienten mit Lebererkrankungen oder Epilepsie muss der Alkoholgehalt ebenfalls beachtet werden.

3. WIE IST ECHINACIN LIQUIDUM EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn keine Besserung eintritt, fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene

- Am ersten Tag: Die Anfangsdosis beträgt 2,5 ml. Danach und für den Rest des Tages: alle 2 Stunden jeweils 1,25 ml.
- Ab dem zweiten Tag 3-mal täglich jeweils 2,5 ml.

Die Höchstdosis beträgt 15 ml pro Tag.

Anwendung bei Kindern

Kinder von 2 bis 12 Jahren:

1 Tropfen pro kg Körpergewicht täglich verteilt auf 3 Tagesgaben.

Kinder unter 2 Jahren:

Die Verwendung bei Kindern unter 2 Jahren wird nicht empfohlen (siehe Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“).

Echinacin Liquidum sollte mit etwas Flüssigkeit verdünnt eingenommen werden.

Eine Langzeitbehandlung bringt keinen zusätzlichen Behandlungserfolg. Die max. ununterbrochene Behandlungszeit liegt bei 2 Wochen.

Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, wie lange Sie Echinacin Liquidum einnehmen müssen. Brechen Sie die Behandlung nicht vorzeitig ab.

Wenn Sie eine größere Menge von Echinacin Liquidum eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Echinacin Liquidum eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Bisher wurde kein Fall einer Vergiftung bei Überdosierung gemeldet.

Bei Überdosierung ist die Einnahme des Arzneimittels einzustellen.

Wenn Sie die Einnahme von Echinacin Liquidum vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Echinacin Liquidum abbrechen

Entfällt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die folgenden Nebenwirkungen wurden gemeldet:

Es wurden Fälle von schwerer Überempfindlichkeit gemeldet, z. B.: Blasen an Haut und Schleimhäuten (Stevens-Johnson-Syndrom), Schwellungen der Haut aufgrund einer

Flüssigkeitsansammlung (Quincke-Ödem), Schwellungen der Haut (Angioödem), anaphylaktischer Schock und Atembeschwerden (Bronchospasmus mit Obstruktion), niedriger Blutdruck (Hypotonie). Wenn die genannten Symptome bei Ihnen auftreten, stoppen Sie die Einnahme von Echinacea und ziehen Sie sofort einen Arzt hinzu.

Echinacea kann bei Patienten mit einer Neigung zu Allergien allergische Reaktionen auslösen. Folgende Nebenwirkungen mit unbekannter Häufigkeit wurden beobachtet: Asthma, Schwellungen der Haut (Angioödem), Hautausschlag, Juckreiz, Nesselfieber, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen.

Erkrankungen des Immunsystems können nicht ausgeschlossen werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

Postfach 97

1000 Brüssel

Madou

Website: www.notifierunefetindesirable.be

E-Mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST ECHINACIN LIQUIDUM AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Im geschlossenen Fläschchen bei Zimmertemperatur zwischen +15°C und +20°C und vor Licht geschützt aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett, dem Umkarton, dem Behältnis nach „EXP.“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Echinacin Liquidum enthält

- Der Wirkstoff ist eine Lösung aus dem Saft der Pflanze *Echinacea purpurea* (L) Moench
- Der sonstige Bestandteil (Hilfsstoff) ist: Alkohol 96 Vol.-%

Wie Echinacin Liquidum aussieht und Inhalt der Packung

Packungsbeilage

Glasfläschchen mit 50 ml und 100 ml Lösung zum Einnehmen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

Viartis Healthcare

Terhulpesteenweg 6A

B-1560 Hoeilaart

Hersteller:

Madaus GmbH – D-51101 Köln – Deutschland

Zulassungsnummer

BE211233

Art der Abgabe

Freie Abgabe

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 03/2023

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 04/2023.