

Notice pour les réceptants

(flacons ou bidons sans emballage extérieur, fûts ou réceptants)

Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement et respecter ces instructions.

Sterillium

Solution pour application cutanée

Substances actives: **Isopropylique, Propanol, Éthylsulfate de mécétronium** Solution désinfectante par friction des mains et de la peau

Indications thérapeutiques

Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.

Désinfection cutanée avant injections et ponctions.

Contre-indications

Sterillium ne doit pas être utilisé pour la désinfection de muqueuses et ni à proximité des yeux ou de plaies ouvertes.

Hypersensibilité (allergie) aux substances actives ou à l'un des excipients. Ce médicament contient des fragrances avec alcool benzylique, citral, citronellol, coumarine, eugénol, farnésol, géraniol, hydroxycitronellal, limonène et linalol, qui peuvent provoquer des réactions allergiques.

Fertilité, grossesse et allaitement

Sterillium peut être utilisé durant la grossesse et l'allaitement.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Ne pas utiliser Sterillium chez le nouveau-né et l'enfant prématuré.

Éviter tout contact avec les yeux.

Si la solution entre en contact avec les yeux, les rincer avec la fente palpébrale béante à l'eau courante pendant plusieurs minutes.

Afin de prévenir tout risque de contamination, éviter de transvaser Sterillium d'un récipient à un autre. Si le transvasement est inévitable, il doit être effectué dans des conditions aseptiques rigoureuses (par exemple avec utilisation de récipients stériles sous flux laminaire).

Ne pas utiliser de matériel électrique jusqu'à l'évaporation de la solution.

Ne pas mettre en contact avec une flamme nue.

Ne pas utiliser près d'une source inflammable. Point éclair : 23 °C. Inflammable.

Le risque d'incendie et d'explosion est minime lorsque le produit est utilisé correctement.

En cas de déversement accidentel, prendre les mesures suivantes :

essuyer le liquide renversé, diluer abondamment avec de l'eau, aérer la pièce et enlever les sources inflammables. Ne pas fumer.

En cas d'incendie, éteindre le feu avec de l'eau, de la poudre, de la neige ou du CO₂.

Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Aucune étude d'interaction n'a été réalisée.

Posologie et mode d'administration

Sterillium est utilisé non-dilué.

Pour la désinfection hygiénique des mains : Frictionner les mains sèches avec 3 ml de Sterillium (minimum) pendant 30 secondes sans rincer.

Pour la désinfection chirurgicale des mains : frictionner les mains sèches et les avant-bras avec Sterillium de manière à les recouvrir entièrement de produit. Procéder à autant d'applications que nécessaire (sans rincer) afin que mains et avant-bras soient humidifiés pendant au moins 1,5 minutes.

Désinfection cutanée : frictionner Sterillium sur la zone cutanée sèche pendant 15 secondes avant toute injection ou ponction. Avant toute ponction au niveau des articulations, cavités du corps et organes creux, et avant toute intervention chirurgicale, humidifier pendant 1 minute. Les peaux contenant de nombreuses glandes sébacées doivent être humidifiées pendant 10 minutes.

Mécanisme d'action

Sterillium modifie la perméabilité de la membrane cytoplasmique dans les microorganismes, agit par une coagulation protéinique et inactive les enzymes.

Efficacité microbiologique

Des études *in vitro* et *in vivo* ont démontré que Sterillium agit contre de nombreux agents pathogènes bactériens et fongiques courants. La solution a également montré une activité virucide à spectre limité contre les virus enveloppés (VIH, VHB, VHC) et non enveloppés (adénovirus, norovirus, rotavirus). Sterillium réduit la flore cutanée transitoire de plus de 99,99 % en l'espace de 30 secondes pour la désinfection à visée hygiénique et agit également contre la flore cutanée résidente en l'espace de 1,5 minutes pour la désinfection chirurgicale.

Usage non conforme et surdosage

En cas d'ingestion accidentelle, les principaux symptômes d'intoxication sont similaires à ceux d'une intoxication à l'éthanol. Possibilité de paralysie respiratoire. Prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

À partir de 3 à 4 ‰ et au-delà : l'élimination secondaire du poison se fait par hémodialyse.

Effets indésirables

Une légère sécheresse ou une irritation de la peau sont peu fréquentes. Dans de tels cas, il est recommandé d'intensifier les soins généraux de la peau. L'incidence de réactions allergiques est rare.

Ce médicament contient les fragrances suivantes : alcool benzylique, citral, citronellol, coumarine, eugénol, farnésol, géraniol, hydroxycitronellal, limonène et linalol.

L'alcool benzylique, le citral, le citronellol, la coumarine, l'eugénol, le farnésol, le géraniol, l'hydroxycitronellal, le limonène et le linalol peuvent provoquer des réactions allergiques.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé www.fagg.be, Division Vigilance, Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be, E-mail: adr@fagg-afmps.be.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Instructions et remarques concernant la stabilité du médicament

Veuillez respecter la date de péremption figurant sur l'étiquette.
Ne pas utiliser cette solution désinfectante après la date de péremption.
Conservation après ouverture : 1 an.

Conserver le récipient soigneusement fermé. Ne pas conserver à proximité de sources de chaleur ni exposer au rayonnement direct du soleil.

Élimination

Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. Ne pas éliminer les médicaments dans les égouts.

Composition

100 g de solution contient:

Substances actives :

Isopropylique	45,0 g
Propanol	30,0 g
Éthylsulfate de mécétronium	0,2 g

Excipients :

Glycérol 85 %,
Tétradécanol-1,
Parfum,
Bleu patenté V (E131),
Eau purifiée.

Forme pharmaceutique

Solution pour application cutanée

Contenants

Flacons de 50 ml, 100 ml, 350 ml, 500 ml, 1 000 ml de solution,
Bidons de 5 l, 25 l et 500 l de solution,
Fûts de 200 l de solution,

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

BODE Chemie GmbH
Melanchthonstrasse 27
22525 Hambourg
Allemagne

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

BE192841

Mode de délivrance

Délivrance libre

Date de la dernière révision/approbation du texte

XX/2025 - 11/2025