

## **PL voor de verpakkingen**

(flessen of bussen zonder buitenverpakking, vaten of verpakkingen)

## **Instructies voor gebruik**

Lees aandachtig en let op.

### **Sterillium**

Oplossing voor cutaan gebruik

Werkzame stoffen: **Isopropylique , Propanol, Éthylsulfate de mécétronium**

## **Inwrijfbaar desinfectiemiddel voor handen en huid**

### **Therapeutische indicaties**

Hygiënische en chirurgische handdesinfectie.

Huiddesinfectie voorafgaand aan injecties en puncties.

### **Contra-indicaties**

Sterillium is niet geschikt voor de desinfectie van slijmvliezen en mag niet gebruikt worden in de onmiddellijke nabijheid van de ogen of van open wonden.

Overgevoeligheid (allergie) voor de werkzame stoffen of voor een van de hulpstoffen. Dit geneesmiddel bevat geurstoffen met benzylalcohol, citraal, citronellol, coumarine, eugenol, farnesol, geraniol, hydroxycitronellal, limoneen en linalool, die allergische reacties kunnen veroorzaken.

### **Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**

Sterillium kan tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.

### **Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik**

Sterillium mag niet worden gebruikt bij pasgeborenen en te vroeg geboren kinderen.

Contact met de ogen moet worden vermeden.

Als de oplossing in contact komt met de ogen, spoel ze dan met geopende oogspleet gedurende enkele minuten onder stromend water.

Het overgieten van Sterillium van de ene verpakking naar de andere moet worden vermeden om besmetting te voorkomen. Als overgieten onvermijdelijk is, moet dit onder aseptische omstandigheden gebeuren (b.v. gebruik van steriele verpakkingen onder laminaire stroming).

Gebruik geen elektrische apparatuur totdat het preparaat is opgedroogd.

Niet in contact brengen met open vuur.

Niet gebruiken in de nabijheid van ontvlammingsbronnen. Vlampunt 23 °C, ontvlambaar.

Bij juist gebruik van het product zijn brand en explosie onwaarschijnlijk.

Bij het morsen van het ontsmettingsmiddel moeten de volgende maatregelen worden genomen:

Ruim de oplossing onmiddellijk op, verdun met veel water, ventileer de ruimte en verwijder gemakkelijk ontvlambare bronnen. Niet roken.

In geval van brand blussen met water, een brandblusser, schuim of CO<sub>2</sub>.

## **Geneesmiddelen buiten het zicht en bereik van kinderen houden.**

### **Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie**

Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

### **Dosering en wijze van toediening**

Sterillium wordt onverdund gebruikt.

*Voor hygiënische handdesinfectie:* Minstens 3 ml Sterillium moet binnen 30 seconden zonder spoelen op de droge handen worden gewreven.

*Voor chirurgische handdesinfectie:* Sterillium moet op droge handen en onderarmen worden aangebracht om ze volledig te bedekken. Zoveel porties als nodig om ze ten minste 1,5 minuten nat te houden moeten worden ingewreven zonder spoelen.

*Desinfectie van huid:* Sterillium moet voorafgaand aan injecties en puncties gedurende 15 seconden op de droge huid worden ingewreven. Houd voor puncties in gewrichten, lichaamsholten en holle organen en voor chirurgische ingrepen 1 minuut nat. Huid met veel talgklieren moet 10 minuten vochtig worden gehouden.

#### *Werkingsmechanisme*

Bij micro-organismen wijzigt Sterillium de permeabiliteit van het cytoplasmamembraan, werkt het door eiwitcoagulatie, en inactieveert het enzymen.

#### *Microbiologische werkzaamheid*

*In-vitro* en *in-vivo*-onderzoeken hebben aangetoond dat Sterillium werkzaam is tegen een reeks veel voorkomende bacteriën, schimmelpathogenen en een beperkt spectrum virucidale activiteit vertoont tegen omhulde virussen (incl. HIV, HBV, HCV) en niet-omhulde virussen (Adeno-, Noro- en Rotavirus). Sterillium vermindert de transiënte huidflora met meer dan 99,99 % binnen 30 seconden voor hygiënische desinfectie en is ook actief tegen de residente huidflora binnen 1,5 minuten in geval van chirurgische desinfectie.

### **Misbruik en overdosering**

Als het per ongeluk wordt ingeslikt, zijn de belangrijkste vergiftigingsverschijnselen vergelijkbaar met die van een intoxicatie met ethanol. Gevaar voor ademhalingsverlamming. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Vanaf 3 - 4 % en hoger: secundaire eliminatie van het gif door middel van hemodialyse.

### **Bijwerkingen**

Lichte droogheid of irritatie van de huid komen soms voor. In zo'n geval is het raadzaam de algehele huidverzorging te intensiveren. De frequentie van allergische reacties is zelden.

Dit geneesmiddel bevat geurstoffen met benzylalcohol, citraal, citronellol, coumarine, eugenol, farnesol, geraniol, hydroxycitronellal, limoneen en linalool.

Benzylalcohol, citraal, citronellol, coumarine, eugenol, farnesol, geraniol, hydroxycitronellal, limoneen en linalool kunnen allergische reacties veroorzaken.

#### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten [www.fagg.be](http://www.fagg.be), Afdeling Vigilantie, Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be), e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be).

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **Instructies en opmerkingen betreffende de stabiliteit van het geneesmiddel**

Let op de houdbaarheidsdatum op het etiket.  
Gebruik dit desinfectiemiddel niet meer na de houdbaarheidsdatum.  
Houdbaarheid na opening: 1 jaar.

De verpakking zorgvuldig gesloten houden. Niet bewaren in de nabijheid van verwarmingselementen of blootstellen aan direct zonlicht.

## **Afvoer**

Al het ongebruikte product of afvalmateriaal dient in overeenstemming met lokale voorschriften te worden vernietigd. Geneesmiddelen mogen niet door de gootsteen of de WC worden gespoeld.

## **Samenstelling**

100 g oplossing bevat:

### Medisch werkzame bestanddelen:

Isopropylique	45,0 g
Propanol	30,0 g
Éthylsulfate de mécétronium	0,2 g

### Overige stoffen:

Glycerol 85 %,  
1-tetradecanol,  
Parfum,  
Patentblauw V (E131),  
Gezuiverd water.

---

## **Doseringsvorm**

Oplossing voor cutaan gebruik

## **Inhoud**

Flessen van 50 ml, 100 ml, 350 ml, 500 ml, 1000 ml oplossing,  
Bussen van 5 l, 25 l en 500 l oplossing.  
Vaten van 200 l oplossing.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

## **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

BODE Chemie GmbH  
Melanchthonstrasse 27  
22525 Hamburg  
Duitsland

## **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

BE192841

## **Afleveringswijze**

Vrije aflevering

**Laatste herziening/goedkeuring van de tekst**

XX/2025 – 11/2025