

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Cedium Benzalkonium 1 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut **Cedium Benzalkonium 1 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung** Benzalkoniumchlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.



- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Cedium Benzalkonium und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Cedium Benzalkonium beachten?
3. Wie ist Cedium Benzalkonium anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cedium Benzalkonium aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. Was ist Cedium Benzalkonium und wofür wird es angewendet?

Cedium Benzalkonium ist eine Desinfektionslösung für die lokale Anwendung auf der Haut (äußerliche Anwendung). Cedium Benzalkonium wird verwendet, um kleine Verletzungen, oberflächliche Wunden, Schnitt- und Schürfwunden, Brandwunden und Insektenstiche zu desinfizieren und um die Haut vor dem Anbringen eines Pflasters zu reinigen, um Entzündungen vorzubeugen.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Cedium Benzalkonium beachten?

Cedium Benzalkonium darf nicht angewendet werden,

- Wenn Sie allergisch gegen Benzalkoniumchlorid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Bei bestehenden allergischen Erkrankungen: Hautausschlag, Hautflecken und Reizungen.
- Zusammen mit Seife oder hartem Wasser (kalkhaltiges Wasser).
- Auf der Schleimhaut (vor allem den Augen).

- Zusammen mit einem Folienverband (Okklusivverband).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Cedium Benzalkonium anwenden.

- Sie dürfen dieses Produkt nicht schlucken.
- Sie dürfen dieses Produkt nicht langfristig oder wiederholt anwenden.
- Bei einer Hautverletzung, die mit Fiebereinhergeht, ist eine allgemeine Behandlung gegen Infektionen erforderlich.
- Blut und Eiter können die Wirksamkeit dieses Produkts beeinträchtigen.
- Wenn Sie weitere Medikamente anwenden, lesen Sie den Abschnitt „Anwendung von Cedium Benzalkonium zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

Fragen Sie Ihren Arzt, wenn eine der obigen Warnungen auf Sie zutrifft oder dies in der Vergangenheit der Fall war.

Anwendung von Cedium Benzalkonium zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

- Nicht gleichzeitig mit anderen Desinfektionsmitteln anwenden.

Anwendung von Cedium Benzalkonium zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Dieses Arzneimittel dient der lokalen äußerlichen Anwendung. Unter Berücksichtigung der vorhergenannten Vorsichtsmaßnahmen kann dieses Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Es wird jedoch empfohlen, den behandelnden Arzt davon in Kenntnis zu setzen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

Cedium Benzalkonium enthält Benzalkoniumchlorid und Natrium

Dieses Arzneimittel enthält 1 mg Benzalkoniumchlorid pro ml. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Wenn Sie stillen, dürfen Sie dieses Arzneimittel nicht auf die Brust auftragen, da ihr Baby es mit der Milch aufnehmen könnte.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro ml, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

3. Wie ist Cedium Benzalkonium anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Flasche mit Sprühpumpe: die Lösung 2- bis 3-mal am Tag auf die Wunde aufsprühen.

Ohne Abwischen trocknen lassen.

Tropfen: einige Tropfen 2- bis 3-mal am Tag direkt auf die Wunde oder auf eine sterile Kompresse auftragen.

Ohne Abwischen trocknen lassen.

Wenn Sie die Haut zuerst mit Wasser und Seife waschen müssen, achten Sie darauf, alle Seifenreste sorgfältig zu beseitigen. Die Anwendung muss nach jeder Wäsche wiederholt werden. Das Produkt hinterlässt keine Flecken.

Behandlungsdauer möglichst kurz halten. Wenn keine Besserung nach 3 Tagen eintritt, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, wie lange Sie Cedium Benzalkonium anwenden müssen.

Wenn Sie eine größere Menge von Cedium Benzalkonium angewendet haben, als Sie sollten

Bei lokaler äußerer Anwendung sind die Risiken auf Überdosierung sehr klein.

Zu einer Überdosierung kann es kommen, wenn durch Unachtsamkeit oder Unkonzentriertheit eine große Menge der Lösung verschluckt wird.

Wenn Sie eine größere Menge von Cedium Benzalkonium angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

Folgende Symptome können auftreten: Übelkeit, Erbrechen, Atembeschwerden.

Behandlung: die Person Milch trinken lassen. Aufnahme ins Krankenhaus kann notwendig sein.

Wenn Sie die Anwendung von Cedium Benzalkonium vergessen haben

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

Wenn Sie die Anwendung von Cedium Benzalkonium abbrechen

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Bei Kontakt mit der Schleimhaut (Augen) sind Irritationen oder Brennen möglich.
- Bei häufigem oder langem Gebrauch kann es zu einer fortschreitenden Empfindlichkeit der Haut kommen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Belgien:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte – www.afmps.be - Abteilung Vigilanz: Website: www.notifierunefetindesirable.be, E-mail: adr@fagg-afmps.be.

Luxemburg:

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg - Website : www.guichet.lu/pharmakovigilanz.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Cedium Benzalkonium aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton nach "EXP" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Es gibt einen Monat und ein Jahr. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

Was Cedium Benzalkonium enthält

- Der Wirkstoff ist: Benzalkoniumchlorid 1 mg/ml.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Dinatriumedetat - Dinatriumphosphat-Dihydrat - Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat – Natriumchlorid - Gereinigtes Wasser.
Siehe Abschnitt 2, „Cedium Benzalkonium enthält Benzalkoniumchlorid und Natrium“.

Wie Cedium Benzalkonium aussieht und Inhalt der Packung

Cedium Benzalkonium wird angeboten in Form eines Tropfbehältnis mit 30 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut und einer Flasche (HDPE) mit 50 ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung mit Sprühpumpe (LDPE und PP).

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 – 2880 Bornem – Belgien

Zulassungsnummer:

Tropfbehältnis: BE009965

Flasche mit Sprühpumpe: BE192832

LU: 0564/05098222

Art der Abgabe: Freie Abgabe.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 07/2024.