

(De bijsluiter wordt vermeld op het etiket)

## **BIJSLUITER**

Origin

### **1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nederland

Vertegenwoordigd door:  
MSD Animal Health BVBA  
Lynx Binnenhof 5  
1200 Brussel

Fabr: Intervet Productions S.r.l. – Via Nettunense Km 20,3 – Aprilia - Italië

### **2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Origin

### **3. GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN**

1 g poeder bevat: amoxicillinetrihydraat: 800 mg (eq. aan 697 mg amoxicilline).

### **4. INDICATIES**

Behandeling van infecties veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige kiemen en rekening houdend met het vermogen van het antibioticum, op basis van zijn farmacokinetische eigenschappen, de plaats van infectie in werkzame concentraties te bereiken.

### **5. CONTRA-INDICATIES**

- Niet gebruiken in dieren die overgevoelig zijn aan penicillines of andere substanties van de  $\beta$ -lactam groep.
- Orale of parenterale toediening aan guinese biggetjes, hamsters, konijnen en woestijnratten.
- Niet gebruiken in dieren met ernstige nierfalen vergezeld van anurie en oligurie.
- Toediening in aanwezigheid van  $\beta$ -lactamase producerende bacteriën.

### **6. BIJWERKINGEN**

Origin kan in zeldzame gevallen allergische reacties veroorzaken. De mogelijkheid voor een allergische kruisreactie met andere penicillines moet in overweging genomen worden.

Gastro-intestinale klinische symptomen (diarree, braken) kunnen uitzonderlijk voorkomen.

### **7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Kip, varken.

### **8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG**

KIP**Drinkwatermethode:**

Dosis: 10 - 20 mg Origin/kg lichaamsgewicht per dag  
 equivalent aan 7 - 14 mg amoxicilline  
 Behandelingsduur: 3 - 5 opeenvolgende dagen

De hogere dosering is aan te raden bij behandeling van ernstige infecties.  
 Behandeling langs het drinkwater.

Berekening van de toe te dienen dosering in g/dag:

\* volgens lichaamsgewicht:

$\text{aantal dieren} \times \text{gemiddeld lichaamsgewicht (kg)} = \text{g/dag}$   
 100 (voor 10 mg/kg) of 50 (voor 20 mg/kg)

\* volgens dagelijkse drinkwateropname en leeftijd met gemiddeld waterverbruik:

- jonger dan 4 weken: 10 l/100 dieren
- ouder dan 4 weken: 20 l/100 dieren

- jonger dan 4 weken: 6 - 12 g/100 l drinkwaterverbruik/d.  
 - ouder dan 4 weken: 10 - 20 g/100 l drinkwaterverbruik/d.

VARKEN**Drinkwatermethode:**

Dosis: 20 mg Origin/kg lichaamsgewicht per dag  
 equivalent aan 14 mg amoxicilline  
 Behandelingsduur: 3 - 5 opeenvolgende dagen

Berekening van de toe te dienen dosering in g/dag:

\* volgens lichaamsgewicht:

$\text{aantal dieren} \times \text{gemiddeld lichaamsgewicht (kg)} = \text{g/dag}$   
 50 (voor 20 mg/kg)

\* volgens dagelijkse drinkwateropname en leeftijd met gemiddeld drinkwaterverbruik:

- jonger dan 4 maanden: 3 l/30 kg
- ouder dan 4 maanden: 5 l/60 kg

- jonger dan 4 maanden: 20 g/100 l drinkwaterverbruik/d.  
 - ouder dan 4 maanden: 30 g/100 l drinkwaterverbruik/d.

**9. AANWIJZING VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

Voor een juiste dosering dient het lichaamsgewicht zo correct mogelijk bepaald te worden, teneinde onderdosering te vermijden.

Bereiding drinkwatermethode:

- Strooi de berekende hoeveelheid granulaat uit over 5 - 10 liter water en roer tot een homogene verdeling bekomen wordt.
- Voeg dit water al roerend toe aan de hoeveelheid drinkwater die binnen de 2 uur verbruikt zal worden.
- De maximale oplosbaarheid van Origin bedraagt 3 g/L.

Origin best 1 maal per dag via het drinkwater toedienen.

De dieren ongeveer 2 uur voor de medicatie laten uitdorsten (minder lang in warme klimaten).

Indien gekozen wordt voor een continue medicatie, dan moet het gemedicineerd drinkwater minstens 2 maal per dag verversd worden.

Er op toezien dat de dieren tijdens de medicatie geen toegang hebben tot niet-gemedicineerd drinkwater. Het ongebruikte gemedicineerd water moet na 12 uur weggegoten worden.

De opname van het gemedicineerd water is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren; voor een juiste dosering dient de hoeveelheid amoxicilline aangepast te worden.

## 10. WACHTTIJD

Vlees: pluimvee: 24 h na de laatste behandeling

varken: 48 h na de laatste behandeling.

Niet toegelaten voor legkippen die eieren produceren voor humane consumptie.

## 11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Kamertemperatuur, bescherm tegen vocht en licht.

## 12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

In geval van allergische reactie, dient de behandeling stopgezet te worden.

Bij dieren met nierfalen moet de dosering nauwgezet geëvalueerd worden.

In sommige pathogene kiemen is resistentie in ontwikkeling.

Het product moet gebruikt worden op basis van gevoeligheidstesten (antibiogram).

Penicillines kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken na inspuiting, inhalatie, opname of huidcontact.

Overgevoeligheid voor penicillines kunnen leiden tot kruisreacties met cefalosporines en omgekeerd. Allergische reacties voor deze substanties kunnen uitzonderlijk zeer ernstig zijn.

Manipuleer dit product niet indien gekend is dat u overgevoelig bent voor  $\beta$ -lactam antibiotica, of indien geadviseerd werd niet te werken met dergelijke producten.

Behandel dit product met zorg om contact te vermijden. Neem de aanbevolen voorzorgsmaatregelen.

Het gebruik van handschoenen en een stofmasker is daarom aanbevolen.

In geval van contact met ogen of huid, was onmiddellijk met water.

Indien u na contact symptomen vertoont zoals huidirritatie, zoek onmiddellijk medische hulp en toon de dokter deze waarschuwing. Zwellen van het aangezicht, lippen of ogen of moeilijke ademhaling zijn ernstigere symptomen en vragen dringende medische aandacht.

Was uw handen na gebruik.

## 13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu zou terecht komen.

**14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

Januari 2015.

**15. OVERIGE INFORMATIE**

Op diergeneeskundig voorschrift.

BE-V169136