

B. NOTICE

NOTICE
Trichocure®

- 1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**
Titulaire d'enregistrement: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, BE-9800 Deinze.
Fabricant: Laboratoria Smeets, Fotografielaan 42, BE-2610 Wilrijk.
- 2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**
Trichocure®
- 3. LISTE DU (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**
Par comprimé:: Ronidazole 5 mg - Natr. benzoas - Silica colloïd. anhydr. - Maydis amyllum q.s. ad 100 mg.
- 4. INDICATION(S)**
Traitement de la trichomonose chez le pigeon non destiné à la consommation humaine.
- 5. CONTRA-INDICATIONS**
Ne pas administrer le produit à des pigeons destinés à la consommation humaine.
- 6. EFFETS INDÉSIRABLES**
On n'observe pas d'effets indésirables spécifiques chez les pigeons lors de l'administration de ronidazole.
- 7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)**
Pigeons non destiné à la consommation humaine.
- 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**
10 mg/kg.
Administrez 1 comprimé de TRICHOCURE par pigeon, directement dans le bec après alimentation. En cas d'infections graves, renouveler le traitement après 2 jours. Eventuellement répéter après une semaine.
Traitement systématique:
Administrez 1 comprimé de TRICHOCURE par pigeon, directement dans le bec après alimentation:
 - après un vol avec enlogement prolongé
 - après achat
 - pendant la saison de concours: tous les quinze jours
 - pendant le sevrage des jeunes
- 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**
Voie orale. 1 comprimé de TRICHOCURE par pigeon, directement dans le bec après alimentation.
- 10. TEMPS D'ATTENTE**
Trichocure est uniquement destiné à l'usage chez le pigeon voyageur non destiné à la consommation humaine.
La consommation des pigeons traités avec le Trichocure peut compromettre la santé du consommateur.
- 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**
Conserver à une température ambiante (15-25°C)

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**i) Les mesures de précaution spéciales dans le cadre de l'utilisation chez les espèces cibles**

Toujours administrer TRICHOCURE après le repas afin d'assurer un effet longue durée. Rincer soigneusement les abreuvoirs pour prévenir les réinfections. Traiter tous les pigeons de concours du pigeonnier en même temps en cas de contamination.

La consommation de pigeons traités au TRICHOCURE peut représenter un danger pour la santé du consommateur.

ii) Mesures de précaution spéciales que doit prendre la personne chargée d'administrer le médicament

Aucune

iii) Autres mesures de précaution

Aucune

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Les précautions nécessaires doivent être prises pour que des emballages non-utilisés ne contaminent pas l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

02/2012.

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Pour usage vétérinaire

Prescription Médicale

BE-V168332