

B. NOTICE

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire d'enregistrement: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, BE-9800 Deinze.

Fabricant: Laboratoria Smeets, Fotografielaan 42, BE-2610 Wilrijk.

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Tricho Plus®

3. LISTE DU (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Par sachet: Ronidazole 200 mg- Monokaliumhydrogeniumphosph.- lactose q.s. ad 4 g.

4. INDICATION(S)

Traitement de la trichomonose et de l'hexamitiasis chez le pigeon non destiné à la consommation humaine.

Traitement de la trichomonose, de la giardiose et de la cochlosomose chez l'oiseau de volière non destiné à la consommation humaine.

5. CONTRA-INDICATIONS

Ne pas administrer le produit à des pigeons et l'oiseau de volière destinés à la consommation humaine.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Néant.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Pigeons et oiseaux de volière non destiné à la consommation humaine.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

10 mg/kg, Administration orale

Pigeons

Dissoudre 1 sachet de TRICHO PLUS dans 2 litres d'eau (dose journalière pour environ 40 pigeons). Pendant le traitement, il faut éviter que les oiseaux boivent de l'eau provenant d'autres sources.

Renouveler la dose chaque jour. La durée du traitement de la trichomonose est normalement de 5 jours, pour l'hexamitiasis de 7 à 10 jours. En cas d'infections graves, le traitement doit être prolongé de 5 jours.

Durant la saison des concours on peut administrer par quinzaine 1 sachet de TRICHO PLUS dans 2 litres d'eau pendant 2 jours.

Avant et après la saison de concours et pendant la reproduction, il est indiqué d'administrer un sachet de TRICHO PLUS dans 2 litres de boisson pendant 5 jours.

Oiseaux de volière

Dissoudre 1 sachet de TRICHO PLUS dans 4 litres d'eau (dose journalière pour environ 80 oiseaux de volière). Renouvelez la dose chaque jour. La durée du traitement est normalement de 5 jours.

En cas de cochlosomose une deuxième période de traitement deux jours après la première période de traitement est recommandée. En cas d'infections graves, le traitement doit être prolongé de 5 jours.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Orale par l'eau de boisson. Dissoudre 1 sachet de TRICHO PLUS dans 2 litres d'eau.

10. TEMPS D'ATTENTE

Uniquement à l'usage chez le pigeon et oiseaux de volière non destiné à la consommation humaine.

La consommation des pigeons traités avec le TRICHO PLUS peut compromettre la santé du consommateur.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver à une température ambiante (15-25°C)

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**i) Mesures de précaution spéciales dans le cadre de l'utilisation chez les espèces cibles**

En cas d'infection, traiter simultanément tous les pigeons et oiseaux d'ornement du pigeonier.

Rincer soigneusement les abreuvoirs pour prévenir les réinfections.

La consommation de pigeons et oiseaux d'ornement traités au TRICHO PLUS peut représenter un danger pour la santé du consommateur.

ii) Mesures de précaution spéciales que doit prendre la personne chargée d'administrer le médicament

Aucune

iii) Autres mesures de précaution

Aucune

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Les précautions nécessaires doivent être prises pour que des emballages non-utilisés ne contaminent pas l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

02/2012.

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour usage vétérinaire

Prescription Médicale

BE-V149974