

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE
TRICHOCURE®

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Par comprimé : Ronidazole 5 mg

Additif: Benzoate de sodium (E211) 2 mg

Pour la liste complète des excipients : voir point 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé.

4. DONNÉES CLINIQUES

4.1. Espèces cibles

Pigeons non destinés à la consommation humaine.

4.2. Indications pour l'utilisation avec spécification de l' (des) espèce(s) cible(s)

Traitement de la trichomonose chez les pigeons qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

4.3. Contre-indications

Ne pas administrer le produit à des pigeons destinés à la consommation humaine.

4.4. Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Aucune.

4.5. Précautions d'emploi particulières :

i) Les mesures de précaution spéciales dans le cadre de l'utilisation chez les espèces cibles

Toujours administrer TRICHOCURE après le repas afin d'assurer un effet longue durée. Rincer soigneusement les abreuvoirs pour prévenir les réinfections. Traiter tous les pigeons du pigeonier en même temps en cas de contamination.

La consommation de pigeons traités au TRICHOCURE peut représenter un danger pour la santé du consommateur.

ii) Mesures de précaution spéciales que doit prendre la personne chargée d'administrer le médicament

Aucune

iii) Autres mesures de précaution

Aucune

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité)

On n'observe pas d'effets indésirables spécifiques chez les pigeons lors de l'administration de ronidazole.

4.7. Utilisation en période de gravidité, de lactation ou de ponte

Le TRICHOCURE n'est pas toxique pour les jeunes pigeons et peut sans danger être administré pendant la période de reproduction.

4.8. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction

Aucune.

4.9. Posologie et mode d'administration

10 mg/kg

Administrer 1 comprimé de TRICHOCURE par pigeon, directement dans le bec, après le repas. En cas d'infection grave, répéter l'opération deux jours plus tard. Eventuellement, répéter à nouveau une semaine après.

Traitement systématique :

- 1 comprimé de TRICHOCURE par pigeon à administrer dans le bec après le repas
- après un vol ayant occasionné une absence de longue durée, pendant les mois de vol
- au moment de l'achat de l'oiseau
- pendant la saison des concours : tous les 15 jours
- lors du sevrage des jeunes pigeons

4.10. Surdosage (symptômes, procédures en cas d'urgence, antidotes), si nécessaire

Non applicable.

4.11. Temps d'attente

Trichocure est uniquement destinée à l'usage chez le pigeon voyageur non destiné à la consommation humaine.

La consommation des pigeons traités avec le Trichocure peut compromettre la santé du consommateur.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Groupe pharmacothérapeutique: médicament anti-protozoaire, nitro-imidazoles.

Code vét. ATC: QP51AA08

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

Mécanisme d'action

On n'a pas encore entièrement explicité au juste le mécanisme d'action des nitro-imidazoles. Le groupe nitro est essentiel à l'activité biologique. On pense que ce groupe est réduit, ce qui entraîne une activité contre les agents pathogènes unicellulaires.

5.2. Propriétés pharmacocinétiques

Absorption

Lors de l'administration de TRICHOCURE, on obtient un effet "retard" si l'on prend le soin de nourrir les pigeons avant l'administration. En effet, cela ralentit l'élévation des niveaux de plasma qui est elle-même suivie d'une lente absorption.

Distribution

Le volume de distribution du ronidazole chez les pigeons de concours s'élève à environ 0,8 l / kg. Cela indique plutôt une liaison limitée du médicament aux protéines tissulaires. La structure moléculaire compacte du ronidazole assure également une bonne diffusion dans les tissus.

Elimination

L'élimination du ronidazole chez le pigeon n'atteint que 0,056 l / heure / kg. Le temps de demi-vie plasmatique d'élimination est d'environ 10 à 12 heures. Le pigeon élimine donc le ronidazole très lentement. Le médicament se métabolise en grande partie chez les pigeons de concours. La désintégration du cycle imidazole et la formation d'hydroxymétabolites revêtent ici une importance capitale. Avec TRICHOCURE, on observe une élimination ralentie due à la lenteur de l'absorption.

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1. Liste des excipients

Dioxyde de silicium colloïdal, anhydrique
Fécule de maïs

6.2. Incompatibilités

Aucune.

6.3. Durée de conservation

5 ans.

6.4. Précautions particulières pour la conservation

Conserver à température ambiante (15-25°C)

6.5. Nature et contenu du conditionnement

Conditionnement en blister aluminium PVC avec 20 comprimés par blister. Boîte de carton contenant 2 blisters.

6.6. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou d'éventuels déchets provenant de l'utilisation de ces médicaments

Les mesures de précaution nécessaires doivent être prises pour éviter que les produits non utilisés ne soient pas rejetés directement dans l'environnement.

6. 7. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Oropharma S.A.
Kappellestraat 70
BE-9800 Deinze

8. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V168332

9. DATE D'OCTROI DE LA PREMIERE AUTORISATION

23 février 1995

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE

02/2012.