

## **II. BIJSLUITER**

**BIJSLUITER**  
**SOLIGENTAL 3000 IE/ml oogdruppels, oplossing**

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE  
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR  
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Registratiehouder:

VIRBAC  
1ère avenue - 2065 m - L.I.D.  
06516 Carros  
Frankrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

VIRBAC  
1ère avenue - 2065 m - L.I.D.  
06516 Carros  
Frankrijk

of

LABIANA LIFE SCIENCE, S.A  
C/Venus, 26, Ind Can Parellada Terrassa  
08228 Barcelona  
Spanje

**2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

SOLIGENTAL 3000 IE/ml oogdruppels, oplossing

**3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDDD(E)L(EN)**

Elke ml bevat:

**Werkzaam bestanddeel:**

Gentamicine..... 3000IE (in sulfaat vorm)

**Hulpstoff(en):**

Dinatrium edetaat, Parahydroxybenzoïezuur

**4. INDICATIE(S)**

Bij honden en katten: behandeling van bacteriële conjunctivitis en keratoconjunctivitis veroorzaakt door gentamicine-gevoelige bacteriën, op geleide van een specifiek antibiogram.

**5. CONTRA-INDICATIE(S)**

Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor gentamicine, of andere aminoglycosiden.

**6. BIJWERKINGEN**

Zelden kan lokale intolerantie (conjunctivale ontstekingsreacties) worden waargenomen bij het begin van de behandeling.

Deze reacties zijn niet ernstig, altijd van voorbijgaande aard en verdwijnen spontaan zonder een specifieke behandeling.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

## **7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Hond en kat.

## **8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK**

900 I.E. gentamicine/dag gedurende 8 dagen: d.w.z. twee druppels 3 maal per dag gedurende 8 dagen.

## **9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

Dien de oplossing toe in het onderooglid m.b.v. de druppelteller toedienen

## **10. WACHTTIJD**

Niet van toepassing.

## **11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Geen speciale voorzorgen voor de bewaring.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de flacon.

Na het openen, binnen 15 dagen gebruiken.

## **12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)**

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Sluit de flacon na gebruik om besmetting van de oplossing te voorkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Personen met een bekende overgevoeligheid voor aminoglycosiden moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Na gebruik handen grondig wassen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:

Gentamicine passeert de placenta en kan bij hoge dosering daardoor effect hebben op de foetus. Soligental is echter een oogoplossing en de systemische absorptie van gentamicine is niet noemenswaardig. Het diergeneesmiddel kan daarom tijdens dracht en lactatie worden gebruikt.

Overdosering:

In geval van overdosering, kan de regeneratie van het hoornvliesepitheel worden vertraagd.

## **13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF AFVALMATERIAAL VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

## **14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

November 2017

NL: REG NL 9626

BE: BE-V210953

**KANALISATIE**

NL: UDD

BE: Op diergeneeskundig voorschrift