

Gebrauchsinformation: Information für Anwender
Corsodyl 2mg/ml, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle
Chlorhexidindigluconat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Corsodyl und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Corsodyl beachten?
3. Wie ist Corsodyl anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Corsodyl aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Corsodyl und wofür wird es angewendet?

- Corsodyl ist eine klare, rosafarbene Lösung mit Pfefferminzgeschmack.
- Corsodyl enthält Chlorhexidindigluconat. Diese Stoffe tötet die meisten Bakterienarten und auch bestimmte Arten von Pilzen.
- Corsodyl wird angewendet:
 - zur Vorbeugung und Bekämpfung von Zahnbelag.
 - zur Behandlung von Zahnfleischentzündungen.
 - bei Entzündungen in Zahnnähe.
 - zur Desinfizierung bei Eingriffen in Zahnnähe.
 - zur Behandlung von Aphten und sonstigen Mund- und Rachenentzündungen.

Corsodyl ist als Mundwasser, gel und als Spray erhältlich. Das Corsodyl Spray kann benutzt werden, wenn von der Corsodyl Mundwasser abgeraten wird, infolge eines Eingriffs in Zahnnähe oder bei körperbehinderten Personen von einer Mundspülung abzusehen ist.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Corsodyl beachten?

Corsodyl darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Chlorhexidindigluconat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Corsodyl anwenden.

- Benutzen Sie dieses Mittel nur im Mund.
- Corsodyl Spray darf nicht mit den Augen und Ohren in Kontakt kommen. Falls die Lösung dennoch in die Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser.
- Länger dauernde Behandlungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden.
- Corsodyl Spray darf nicht heruntergeschluckt werden.
- Bei Hautausschlag, Schwellung der Lippen, der Zunge, des Halses oder des Gesichts oder Schwierigkeiten beim Atmen beenden Sie die Einnahme von Corsodyl Spray und suchen Sie sofort ärztlichen Rat auf.
- Beenden Sie die Einnahme von Corsodyl Spray und informieren Sie Ihren Zahnarzt, wenn Schmerzen oder Irritationen im Mund auftreten.
- Enthält Alkohol. Bei Einnahme durch Kinder ärztlichen Rat einholen.

Kinder

Kinder unter 12 Jahren sollten dieses Produkt nicht ohne Anweisung des Arztes oder Apothekers verwenden.

Anwendung von Corsodyl zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden, selbst wenn es sich dabei nicht um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass die gleichzeitige Benutzung von Corsodyl und anderen Arzneimitteln zu Problemen führt.

Anwendung von Corsodyl zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Vorübergehend kann es zu Flecken auf den Zähnen oder der Zunge kommen. Diese Flecken sind nicht dauerhaft und können durch eine Reduzierung des Verzehr von verfärbenden Nahrungsmitteln wie Tee, Kaffee und Rotwein weitgehend verhindert werden. Die Flecken können durch Zähneputzen entfernt werden, in manchen Fällen kann jedoch eine professionelle Zahnreinigung erforderlich sein.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Falls die Gebrauchsanweisung beachtet wird, ist der Gebrauch von Corsodyl während der Schwangerschaft und der Stillzeit zulässig.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Corsodyl hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu steuern oder Maschinen zu bedienen, da das Produkt nicht vom Körper aufgenommen wird (auch nicht, wenn es versehentlich verschluckt wurde).

Corsodyl enthält Alkohol

Corsodyl enthält Alkohol. Wenn ein Kind das Mittel geschluckt hat, ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.

3. Wie ist Corsodyl anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Da viele normale Zahnpastas Stoffe enthalten, die nicht zusammen mit Corsodyl benutzt werden können, sollten Sie nach dem Zähneputzen den Mund spülen, bevor Sie Corsodyl benutzen.

Spray zur Anwendung in der Mundhöhle:

2-mal täglich auf die Zähne sprühen oder folgen Sie die Anweisung des Arztes oder Zahnarztes . Die tägliche Höchstdosis beträgt 12 Sprühanwendungen (0,14 ml/ Sprühanwendung) 2 Mal pro Tag.

Eine dauerhafte Anwendung von Corsodyl ist nur unter regelmäßiger Beaufsichtigung durch einen Arzt oder Zahnarzt zulässig.

Die Behandlung von Gingivitis sollte einen Monat andauern.

Prothesenstomatitis: Prothese reinigen und anschließend mit einem Chlorhexidinspray besprühen.

Wenn Sie eine größere Menge Corsodyl angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge Corsodyl angewendet haben, wenden Sie sich bitte sofort an einen Arzt oder Apotheker oder an das Antigiftzentrum (070/245-245). Da Corsodyl Alkohol enthält, sollten Sie einen Arzt zu Rate ziehen, wenn ein Kind es verschluckt hat.

Wenn Sie die Anwendung von Corsodyl vergessen haben

Wenn Sie die Anwendung von Corsodyl vergessen haben, Corsodyl anwenden und wie beschrieben (siehe „Wie ist Corsodyl anzuwenden?“) mit der Behandlung fortfahren.

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In einzelnen Fällen wurden Hautausschlag, Schwellung der Lippen, der Zunge, des Rachens oder des Gesichts oder Schwierigkeiten beim Atmen gemeldet. Diese Symptome können Anzeichen einer schwerwiegenden allergischen Reaktion sein. Brechen Sie die Anwendung von Corsodyl ab und suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie einen Hautausschlag, eine Schwellung der Lippen, der Zunge, im Hals oder im Gesicht bekommen oder wenn Sie Schwierigkeiten beim Atmen haben.

Sehr häufig (mehr als 1 von 10 Patienten): belegte Zunge

Häufig (mehr als 1 von 100 Patienten, aber weniger als 1 von 10 Patienten):

Zu Beginn der Behandlung kann eine Störung des Geschmackssinns eintreten. In einigen Fällen kann der Eindruck entstehen, die Zunge oder der Mund sei gereizt. Diese Symptome verschwinden jedoch meist im Laufe der Behandlung. Wenn die Bedingungen fortbestehen, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker aufsuchen. Zu den weiteren Reaktionen zählt Mundtrockenheit.

Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 Patienten): Es wurde auch über ungewöhnliche Verfärbung der Zähne und der Zunge, Schwellung des Mundes und der Speicheldrüsen, Ablösung der Mundschleimhaut und Hautreizungen berichtet.

Bei häufigem Gebrauch kann es zu einer bräunlichen Verfärbung der Zunge und der Zähne (einschl. Zahnfüllungen und Prothesen) kommen. In Rubrik 2 unter „Bei Anwendung von Corsodyl zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken“ lesen Sie, wie Sie dies verhindern können.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

<p>Belgien Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte Abteilung Vigilanz Postbus 97 B-1000 Brussel Madou Website: www.notifierunefetindesirable.be E-mail: adr@fagg-afmps.be</p>	<p>Luxemburg Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé Website: www.guichet.lu/pharmacovigilance</p>
---	--

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Corsodyl aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Bei Zimmertemperatur aufbewahren (15-25 °C).

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen Was Corsodyl enthält

- Der Wirkstoff ist: Chlorhexidindigluconat.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Äthanol, Pfefferminzöl, polyoxyl-40-hydriertes Rizinusöl, Sorbitol, Farbstoff Cochenille Rot (E 124), gereinigtes Wasser.

Wie Corsodyl aussieht und Inhalt der Packung

Spray zur Anwendung in der Mundhöhle erhältlich in einer Flasche von 60 ml mit Sprühpumpe

Abgabe:

Apothekenpflichtig

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:Pharmazeutischer Unternehmer

Haleon Belgium
Da Vincilaan 5,
B-1930 Zaventem

Hersteller

Farmaclair
Av. G. de Gaulle 440
F – 14200 Hérouville St Clair
Frankreich

Zulassungsnummer:

Corsodyl 2 mg/ml, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle: BE191764

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 11/2023