

Gebrauchsinformation: Information für Anwender
CORSODYL 10mg/g, Dentalgel
Chlorhexidindigluconat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Corsodyl Dentalgel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Corsodyl Dentalgel beachten?
3. Wie ist Corsodyl Dentalgel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Corsodyl Dentalgel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. Was ist Corsodyl Dentalgel und wofür wird es angewendet?

- Corsodyl Dentalgel enthält Chlorhexidindigluconat. Dieser Stoff tötet die meisten Bakterienarten und auch bestimmte Arten von Pilzen.
- Corsodyl Dentalgel wird angewendet:
 - zur Behandlung von Zahnfleischentzündungen.
 - nach einem Eingriff in Zahnnahe, um die Heilung des Zahnfleisches zu beschleunigen.
 - Für die Behandlung von wiederkehrenden Geschwüren und durch *Candida* verursachten Mundinfektionen (z. B. Stomatitis und Aphthen).
 - zur Kariesprophylaxe, wenn die herkömmlichen Methoden unzureichende Wirkung zeigen. Die gleichzeitige Behandlung der Krankheitsursache ist jedoch unbedingt notwendig.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Corsodyl Dentalgel beachten?

Corsodyl Dentalgel darf nicht angewendet werden,

- Wenn Sie allergisch gegen Chlorhexidindigluconat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Corsodyl Dentalgel anwenden.

- Benutzen Sie dieses Mittel nur im Mund.
- Corsodyl Dentalgel darf nicht mit den Augen und Ohren in Berührung kommen. Falls das Gel dennoch in die Augen gelangt, spülen Sie die diese sofort mit reichlich Wasser.
- Obwohl keine schädlichen Nebenwirkungen nach dem Schlucken von Corsodyl Dentalgel bekannt sind, darf Corsodyl Dentalgel nicht geschluckt werden. Vom Gebrauch bei kleinen Kindern ist daher abzuraten.
- Beenden Sie die Einnahme von Corsodyl Dentalgel und wenden Sie sich sofort an einen Arzt oder Apotheker, wenn eine allergische Reaktion (Hautausschlag, Schwellung der Lippen, der Zunge, des Rachens oder des Gesichts oder Schwierigkeiten beim Atmen) auftritt.
- Beenden Sie die Einnahme von Corsodyl Dentalgel und informieren Sie Ihren Zahnarzt, wenn Schmerzen oder Irritationen im Mund auftreten.

Kinder

Kinder unter 12 Jahren sollten dieses Produkt nicht ohne Anweisung des Arztes oder Apothekers verwenden.

Anwendung von Corsodyl Dentalgel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass die gleichzeitige Benutzung von Corsodyl Dentalgel und anderen Arzneimitteln zu Problemen führt.

Anwendung von Corsodyl Dentalgel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Vorübergehend kann es zu Flecken auf den Zähnen oder der Zunge kommen. Diese Flecken sind nicht dauerhaft und können durch eine Reduzierung des Verzehrs von verfärbenden Nahrungsmitteln wie Tee, Kaffee und Rotwein weitgehend verhindert werden. Die Flecken können durch Zähneputzen entfernt werden, in manchen Fällen kann jedoch eine professionelle Zahnreinigung erforderlich sein.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Falls die Gebrauchsanweisung beachtet wird, ist der Gebrauch von Corsodyl während der Schwangerschaft und der Stillzeit zulässig.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Corsodyl Dentalgel hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu steuern oder Maschinen zu bedienen, da das Produkt nicht vom Körper aufgenommen wird (auch nicht, wenn es versehentlich verschluckt wurde).

3. Wie ist Corsodyl Dentalgel anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Da viele normale Zahnpastas Stoffe enthalten, die nicht zusammen mit Corsodyl benutzt werden können, sollten Sie nach dem Zähneputzen den Mund spülen, bevor Sie Corsodyl benutzen.

Behandlung von Zahnfleischproblemen:

Zähne über einen Zeitraum von 2 Wochen 2-mal täglich mit 2,5 cm Corsodyl Dentalgel auf der angefeuchteten Zahnbürste für mindestens 1 Minute oder folgen Sie die Anweisung des Arztes oder Zahnarztes. Überschüssiges Produkt ausspucken. Mund nach Auftragen des Gels nicht ausspülen.

Behandlung von Aphthen:

Tragen Sie mit dem sauberen Zeigefinger oder einem Wattestäbchen 2-mal täglich 2,5 cm Corsodyl Dentalgel vorsichtig auf die Aphthen und ihre Umgebung auf. Gel nach dem Auftragen nicht durch Reiben oder Ausspülen entfernen.

Zur Verhinderung von Zahnkaries:

Der Zahnarzt muss eine vorgeformte und an die Zähne angepasste Hohlschiene anfertigen. 1-mal täglich 2,5 cm Corsodyl Dentalgel in die Hohlschiene geben und für 5 Minuten auf die Zähne auftragen, vorzugsweise abends. Benutzen Sie das Mittel über einen Zeitraum von 2 Wochen und wiederholen Sie die Behandlung eventuell nach 3 bis 4 Monaten.

Gleichzeitig müssen zusätzliche Vorbeugungsmaßnahmen getroffen werden, wie beispielsweise eine Einschränkung der Verwendung von Zucker und das täglich zweimalige Putzen der Zähne mit einer fluorhaltigen Zahnpasta.

Bei der Behandlung von Stomatitis aufgrund von Candida unter der Zahnprothese:

Etwa 2 cm Corsodyl Dentalgel unter der Zahnprothese auf die Hohlwölbung der gesamten Prothese auftragen und die Prothese für 10 Minuten im Mund halten. Danach muss die Zahnprothese herausgenommen und abgespült und der Mund mit Wasser ausgespült werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Corsodyl Dentalgel angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge Corsodyl Dentalgel angewendet haben, wenden Sie sich bitte sofort an einen Arzt oder Apotheker oder an das Antgiftzentrum (070/245-245).

Wenn Sie die Anwendung von Corsodyl Dentalgel vergessen haben

Wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben, wenden Sie Corsodyl Dentalgel an und fahren Sie fort mit der Behandlung wie beschrieben in „Wie ist Corsodyl Dentalgel anzuwenden?“.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In einzelnen Fällen wurden Hautausschlag, Schwellung der Lippen, der Zunge, des Rachens oder des Gesichts oder Schwierigkeiten beim Atmen gemeldet. Diese Symptome können Anzeichen einer schwerwiegenden allergischen Reaktion sein. Brechen Sie die Anwendung von Corsodyl Dentalgel ab und suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie einen Hautausschlag, eine Schwellung der Lippen, der Zunge, im Hals oder im Gesicht bekommen oder wenn Sie Schwierigkeiten beim Atmen haben.

Sehr häufig (mehr als 1 von 10 Patienten): belegte Zunge

Häufig (mehr als 1 von 100 Patienten, aber weniger als 1 von 10 Patienten):

Zu Beginn der Behandlung kann eine Störung des Geschmackssinns eintreten. In einigen Fällen kann der Eindruck entstehen, die Zunge oder der Mund sei gereizt. Diese Symptome verschwinden jedoch meist im Laufe der Behandlung. Wenn die Bedingungen fortbestehen, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker aufsuchen. Zu den weiteren Reaktionen zählt Mundtrockenheit.

Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 Patienten): Es wurde auch über ungewöhnliche Verfärbung der Zähne und der Zunge, Schwellung des Mundes und der Speicheldrüsen, Ablösung der Mundschleimhaut und Hautreizungen berichtet.

Bei häufigem Gebrauch kann es zu einer bräunlichen Verfärbung der Zunge und der Zähne (einschließlich Zahnfüllungen und Prothesen) In Rubrik 2 unter „Bei Anwendung von Corsodyl Dentalgel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken“ lesen Sie, wie Sie dies verhindern können.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über :

<p>Belgien Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte Abteilung Vigilanz Postbus 97 B-1000 Brussel Madou Website: www.notifieruneffetindesirable.be E-mail: adr@fagg-afmps.be</p>	<p>Luxemburg Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance</p>
---	---

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist dieses Arzneimittel aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
Nicht über 25°C lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton hinter „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem Öffnen der Tube noch 1 Monat haltbar.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Corsodyl Dentalgel enthält

-
- Der Wirkstoff ist: Chlorhexidindigluconat.
 - Die sonstigen Bestandteile sind: Pfefferminzöl, Levomenthol, polyoxyl-40-hydriertes Rizinusöl, Isopropanol, Natriumacetat, Hydroxypropylcellulose, Gereinigtes Wasser.

Wie Corsodyl Dentalgel aussieht und Inhalt der Packung

- Corsodyl Dentalgel ist ein durchsichtiges Gel.
- Corsodyl Dentalgel ist in einer Tube mit 50 g Gel erhältlich.

Abgabe:

Apothekenpflichtig

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**Pharmazeutischer Unternehmer**

Haleon Belgium
Da Vincilaan 5
B-1930 Zaventem

Hersteller:

Purna Pharmaceuticals nv,
Rijksweg 17,
2870 Puurs,
Belgien

Zulassungsnummer:

Corsodyl 10 mg/g, Dentalgel: BE104973
LU: 1988040177

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 11/2023