

Corsodyl 10 mg/g, gel voor dentaal gebruik

chloorhexidinedigluonaat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Corsodyl Gel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Corsodyl Gel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

- Corsodyl tandgel bevat chloorhexidinedigluonaat. Deze stof doodt de meeste soorten bacteriën en ook bepaalde schimmels.
- Corsodyl tandgel wordt gebruikt:
 - voor de behandeling van tandvleesontstekingen.
 - na parodontale ingrepen om genezing van het tandvlees te bevorderen.
 - voor de behandeling van terugkerende zweren en mondinfecties veroorzaakt door candida (bijvoorbeeld stomatitis en aften).
 - om cariës te voorkomen, wanneer gebruikelijke methodes niet volstaan. De gelijktijdige behandeling van de onderliggende oorzaak is noodzakelijk.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor chloorhexidinedigluonaat of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Gebruik dit middel alleen in de mond.
- Vermijd elk contact van Corsodyl tandgel met de ogen en oren. Als de gel toch in contact komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk en overvloedig met water.
- Hoewel er geen nadelige effecten bekend zijn ten gevolge van inslikken, mag Corsodyl tandgel niet worden doorslikt. Het gebruik ervan bij kleine kinderen wordt daarom afgeraden.
- Stop met het gebruik van de Corsodyl gel voor dentaal gebruik en raadpleeg onmiddellijk een arts of apotheker in geval van een allergische reactie (huiduitslag, zwelling van de lippen, de tong, de keel of het aangezicht, of moeilijk ademen).
- Stop met het gebruik van de Corsodyl gel voor dentaal gebruik en meld aan uw tandarts elke vorm van pijn of mondirritatie.

Kinderen

Raadpleeg een arts of apotheker vóór gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Corsodyl tandgel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen aanwijzingen dat gelijktijdig gebruik van Corsodyl tandgel en andere geneesmiddelen problemen veroorzaakt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Er kunnen tijdelijke vlekken op de tanden of de tong verschijnen. Deze vlekken zijn niet blijvend en kunnen grotendeels vermeden worden door de consumptie te verminderen van voedingsmiddelen en dranken die vlekken kunnen veroorzaken, zoals thee, koffie of rode wijn. De vlekken kunnen verwijderd worden door te poetsen, maar in bepaalde gevallen kan een professionele reiniging nodig zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Wanneer de gebruiksinstructies in acht wordt genomen, kan Corsodyl tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Corsodyl tandgel heeft geen effect op het vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen, want het product wordt niet door het lichaam geabsorbeerd (ook niet wanneer het per ongeluk wordt ingeslikt).

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Omdat veel normale tandpasta's stoffen bevatten die niet samen met Corsodyl kunnen worden gebruikt, moet u na het tanden poetsen de mond spoelen voordat u Corsodyl gebruikt.

Behandeling van tandvleesproblemen;

Poets uw tanden gedurende 2 weken tweemaal per dag met 2,5 cm Corsodyl tandgel die u op de vochtige tandenborstel aanbrengt. Poets minstens 1 minuut of volg het advies van de arts of de tandarts. Overtollig product opnieuw uitspugen. Niet spoelen na aanbrengen van de gel.

Behandeling van afters;

Breng met behulp van een propere wijsvinger of wattenstaafje tweemaal per dag voorzichtig 2,5 cm Corsodyl tandgel aan op en rond de afters aan. Niet verwijderen door te wrijven of te spoelen na het aanbrengen ervan.

Om tandcariës te voorkomen

De tandarts zal een voorg gevormd gootje maken dat is aangepast aan de tanden. Breng 2,5 cm Corsodyl tandgel in het gootje aan en plaats het dagelijks 5 minuten tegen de tanden, bij voorkeur 's avonds. Gebruik het middel gedurende 2 weken en herhaal de behandeling eventueel na 3 tot 4 maanden. Tegelijkertijd zijn andere preventieve maatregelen noodzakelijk, zoals vermindering van het gebruik van suiker en het tweemaal daags poetsen van de tanden met een fluoride houdende tandpasta.

Bij de behandeling van stomatitis door Candida onder de gebitsprothese

Breng ongeveer 2 cm Corsodyl tandgel aan ter hoogte van de binnenwelling van de prothese. Houd de prothese gedurende 10 minuten in de mond en spoel daarna de mond en de prothese.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel Corsodyl tandgel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245-245).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u vergeten bent Corsodyl tandgel te gebruiken, gebruik het dan alsnog en ga verder met de behandeling zoals beschreven in "Hoe gebruikt u dit middel?".

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Geïsoleerde gevallen van huiduitslag, zwelling van de lippen, de tong, de keel of het aangezicht, of moeilijk ademen zijn gemeld. Deze symptomen kunnen de uiting zijn van een ernstige allergische reactie. Stop met het gebruik van Corsodyl tandgel en zoek onmiddellijk medische hulp als u last krijgt van huiduitslag (netelroos), zwelling van lippen, tong, keel of het gezicht of wanneer u moeite heeft met ademen (dyspneu).

Zeer vaak (bij meer dan 1 patiënt op 10): beslagen tong

Vaak (bij meer dan 1 patiënt op 100, maar minder dan 1 patiënt op 10):

Aan het begin van de behandeling kan de smaak verstoord raken. Ook komt een branderig gevoel van de tong of de mond voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik. Indien ze aanhouden, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Andere reacties zijn onder meer een droge mond.

Zeer zelden (bij minder dan 1 patiënt op 10.000): een abnormale verkleuring van de tanden en de tong, zwelling van de mond en van de speekselklieren, korstvorming van het mondslijmvlies en huidirritatie werden eveneens gemeld.

In geval van herhaald gebruik kan een bruine verkleuring van de tong en de tanden (incl. vullingen en prothesen) optreden. In rubriek 2 onder “Waarop moet u letten met eten en drinken?” leest u hoe u dit kunt voorkomen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

Postbus 97

B-1000 Brussel Madou

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

E-mail: adr@fagg.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening van de tube nog 1 maand bewaren.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is chloorhexidinedigluconaat.
- De andere stoffen in dit middel zijn pepermuntolie, levomenthol, polyoxyl hydrogenated castor oil (= PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie), isopropylalcohol, natriumacetaat, hydroxypropylcellulose en gezuiverd water.

Hoe ziet Corsodyl tandgel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

- Corsodyl tandgel is een doorzichtige gel.
- Corsodyl tandgel is verkrijgbaar in een tube met 50 g gel.

Afleveringswijze:

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:**

Haleon Belgium
Da Vincilaan 5
B-1930 Zaventem

Fabrikant:

Purna Pharmaceuticals nv,
Rijksweg 17,
2870 Puurs,
België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

Corsodyl 10 mg/g, gel voor dentaal gebruik: BE104973

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2023