

**Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**  
**Corsodyl 2mg/ml, spray voor oromucosaal gebruik**  
Chloorhexidinedigluonaat

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Corsodyl en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. Wat is Corsodyl en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

- Corsodyl is een heldere roze oplossing met pepermuntsmak.
- Corsodyl bevat chloorhexidinedigluonaat. Deze stof doodt de meeste soorten bacteriën en ook bepaalde schimmels.
- Corsodyl wordt gebruikt:
  - bij het voorkómen en bestrijden van tandaanslag
  - bij tandvleesontstekingen
  - bij infecties van de zone rond de tand of kies
  - als ontsmettingsmiddel bij ingrepen in de omgeving van de tand of kies
  - tegen afters en andere mond- en keelinfecties.

Corsodyl is verkrijgbaar als mondspoeling, gel en als spray. De Corsodyl spray kan worden gebruikt wanneer de Corsodyl mondspoeling afgeraden wordt, na tandheelkundige ingrepen en bij lichamelijk gehandicapte patiënten.

### **2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

#### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor chloorhexidinedigluonaat of een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Gebruik dit middel alleen in de mond.
- Vermijd elk contact van Corsodyl-spray met de ogen en oren. Als de oplossing toch in contact komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk en overvloedig met water.
- Langdurig gebruik moet zo mogelijk vermeden worden.
- Corsodyl-spray mag niet worden ingeslikt.
- Stop met het gebruik van de Corsodyl-spray en raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van huiduitslag, zwelling van de lippen, de tong, de keel of het aangezicht, of moeilijk ademen.
- Stop met het gebruik van de Corsodyl-spray en meld aan uw tandarts elke vorm van pijn of mondirritatie.
- Bevat alcohol. Raadpleeg een arts in geval van inname door een kind.

### **Kinderen**

Raadpleeg een arts of apotheker vóór gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Corsodyl nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw artsofapotheker

---

Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Er zijn geen aanwijzingen dat gelijktijdig gebruik van Corsodyl en andere geneesmiddelen problemen veroorzaakt.

### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Er kunnen tijdelijke vlekken op de tanden of de tong verschijnen. Deze vlekken zijn niet blijvend en kunnen grotendeels vermeden worden door de consumptie te verminderen van voedingsmiddelen en dranken die vlekken kunnen veroorzaken, zoals thee, koffie of rode wijn. De vlekken kunnen verwijderd worden door te poetsen, maar in bepaalde gevallen kan een professionele reiniging nodig zijn.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw artsofapotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Wanneer de gebruiksinstructies in acht worden genomen, kan Corsodyl tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode worden gebruikt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Corsodyl heeft geen effect op het vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen, want het product wordt niet door het lichaam geabsorbeerd (ook niet wanneer het per ongeluk wordt doorgeslikt).

### **Corsodyl bevat alcohol**

Corsodyl bevat alcohol. Als een kind het heeft ingeslikt moet u een arts raadplegen.

## **3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw artsof apotheker.

Omdat veel normale tandpasta's stoffen bevatten die niet samen met Corsodyl kunnen worden gebruikt, moet u na het tanden poetsen de mond spoelen voordat u Corsodyl gebruikt.

Spray: Verstuif de spray tweemaal per dag op de tanden of volg het advies van de arts/tandarts. De maximale hoeveelheid bedraagt 12 verstuivingen (0,14 ml/verstuiving), tweemaal per dag.

Bij langdurig gebruik van Corsodyl is regelmatige controle door een arts of tandarts vereist. Wanneer Corsodyl wordt gebruikt voor de behandeling van een tandvleesontsteking wordt aangeraden het middel een maand voort te zetten.

Kunstgebit stomatitis: de prothese reinigen en daarna verstuiven met een spray op basis van chloorhexidine.

### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Wanneer u te veel Corsodyl heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245-245).

Aangezien Corsodyl alcohol bevat, dient u een arts of apotheker te raadplegen als een kind het heeft ingeslikt.

### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Gebruik, wanneer u merkt dat u vergeten bent Corsodyl te gebruiken, het middel alsnog en ga verder met de behandeling zoals beschreven in "Hoe gebruikt u dit middel?". Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Geïsoleerde gevallen van huiduitslag, zwelling van de lippen, de tong, de keel of het aangezicht, of moeilijk ademen zijn gemeld. Deze symptomen kunnen de uiting zijn van een ernstige allergische reactie. Stop met het gebruik van Corsodyl en zoek onmiddellijk medische hulp als u last krijgt van

---

huiduitslag (netelroos), zwelling van de lippen, tong, keel of het krijgt of wanneer u moeite heeft met ademen (dyspneu).

Zeer vaak (bij meer dan 1 patiënt op 10): beslagen tong.

Vaak (bij meer dan 1 patiënt op 100, maar minder dan 1 patiënt op 10):

Aan het begin van de behandeling kan de smaak verstoord raken. Ook komt een branderig gevoel van de tong of de mond voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik. Indien ze aanhouden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Andere reacties zijn onder meer een droge mond.

Zeer zelden (bij minder dan 1 patiënt op 10.000): een abnormale verkleuring van de tanden en de tong, zwelling van de mond en van de speekselklieren, korstvorming van het mondslijmvlies en huidirritatie werden eveneens gemeld.

In geval van herhaald gebruik kan een bruine verkleuring van de tong en de tanden (incl. vullingen en prothesen) optreden. In rubriek 2 onder "Waarop moet u letten met eten en drinken?" leest u hoe u dit kunt voorkomen.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

Postbus 97

B-1000 Brussel Madou

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

E-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. Hoe bewaart u dit middel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 °C).

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "EXP" De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stof in dit middel is chloorhexidinedigluconaat.
- De andere stoffen in dit middel zijn ethanol, pepermuntolie, polyoxyl hydrogenated castor oil (= PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie), sorbitol, kleurstof cochenillerood (E 124) en gezuiverd water.

### **Hoe ziet Corsodyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

De spray voor buccaal gebruik is verkrijgbaar in een fles van 60 ml met spraypompje.

### **Afleveringswijze:**

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### Houder voor de vergunning voor het in de handel brengen:

Haleon Belgium

Da Vincilaan 5

B-1930 Zaventem

---

**Fabrikant:**

Farmaclair

Av. G. de Gaulle 440

F – 14200 Hérouville St Clair

Frankrijk

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:**

Corosdyl 2mg/ml, spray voor oromucosaal gebruik: BE191764

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2023**