

Gebrauchsinformation: Information für Anwender
CORSODYL 2 mg/ml, Mundwasser
Chlorhexidindigluconat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Corsodyl und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Corsodyl beachten?
3. Wie ist Corsodyl anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Corsodyl aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Corsodyl und wofür wird es angewendet?

- Corsodyl ist eine klare, farblose Lösung mit Pfefferminzgeschmack.
- Corsodyl enthält Chlorhexidindigluconat. Diese Stoffe tötet die meisten Bakterienarten und auch bestimmte Arten von Pilzen.
- Corsodyl wird angewendet:
 - zur Vorbeugung und Bekämpfung von Zahnbelag.
 - zur Behandlung von Zahnfleischentzündungen.
 - bei Entzündungen in Zahnnähe.
 - zur Desinfizierung bei Eingriffen in Zahnnähe.
 - zur Behandlung von Aphten und sonstigen Mund- und Rachenentzündungen.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Corsodyl beachten?

Corsodyl darf nicht angewendet werden.

- wenn Sie allergisch gegen Chlorhexidindigluconat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Corsodyl anwenden.

- Benutzen Sie dieses Mittel nur im der Mund.
- Corsodyl darf nicht mit den Augen und Ohren in Kontakt kommen. Falls die Lösung dennoch in die Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser.
- Länger dauernde Behandlungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden.
- Corsodyl darf nicht heruntergeschluckt werden.
- Bei Hautausschlag, Schwellung der Lippen, der Zunge, des Rachens oder des Gesichts oder Schwierigkeiten beim Atmen beenden Sie die Einnahme von Corsodyl und suchen Sie sofort ärztlichen Rat auf.
- Beenden Sie die Einnahme von Corsodyl und informieren Sie Ihren Zahnarzt, wenn Schmerzen oder Irritationen im Mund auftreten.

Kinder

Kinder unter 12 Jahren sollten dieses Produkt nicht ohne Anweisung des Arztes oder Apothekers verwenden.

Anwendung von Corsodyl zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden, selbst wenn es sich dabei nicht um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass die gleichzeitige Benutzung von Corsodyl und anderen Arzneimitteln zu Problemen führt.

Anwendung von Corsodyl zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Vorübergehend kann es zu Flecken auf den Zähnen oder der Zunge kommen. Diese Flecken sind nicht dauerhaft und können durch eine Reduzierung des Verzehrs von verfärbenden Nahrungsmitteln wie Tee, Kaffee und Rotwein weitgehend verhindert werden. Die Flecken können durch Zähneputzen entfernt werden, in manchen Fällen kann jedoch eine professionelle Zahnreinigung erforderlich sein.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Falls die Gebrauchsanweisung beachtet wird, ist der Gebrauch von Corsodyl während der Schwangerschaft und der Stillzeit zulässig.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Corsodyl hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu steuern oder Maschinen zu bedienen, da das Produkt nicht vom Körper aufgenommen wird (auch nicht, wenn es versehentliche verschluckt wurde).

3. Wie ist Corsodyl anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Da viele normale Zahnpastas Stoffe enthalten, die nicht zusammen mit Corsodyl benutzt werden können, sollten Sie nach dem Zähneputzen den Mund spülen, bevor Sie Corsodyl benutzen

Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle:

Spülen Sie den Mund 2-mal täglich für 1 Minute mit ca. 10 ml Lösung (die Kappe bis zum Markierungsring füllen) oder folgen Sie die Anweisung des Arztes oder Zahnarztes.

Das Produkt sollte nicht geschluckt und nach 1 Minute Spülung ausgespuckt werden. Nach Gebrauch ausspucken.

Eine dauerhafte Anwendung von Corsodyl ist nur unter regelmäßiger Beaufsichtigung durch einen Arzt oder Zahnarzt zulässig. Die Behandlung von Gingivitis sollte einen Monat andauern.

Prothesenstomatitis: Prothese zweimal täglich reinigen und 15 Minuten lang in Mundspülung legen.

Wenn Sie eine größere Menge Corsodyl angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge Corsodyl angewendet haben, wenden Sie sich bitte sofort an einen Arzt oder Apotheker oder an das Antigiftzentrum (070/245-245).

Wenn Sie die Anwendung von Corsodyl vergessen haben

Wenn Sie die Anwendung von Corsodyl vergessen haben, Corsodyl anwenden und wie beschrieben (siehe „Wie ist Corsodyl anzuwenden?“) mit der Behandlung fortfahren.

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In einzelnen Fällen wurden Hautausschlag, Schwellung der Lippen, der Zunge, des Rachens oder des Gesichts oder Schwierigkeiten beim Atmen gemeldet Diese Symptome können Anzeichen einer schwerwiegenden allergischen Reaktion sein. Brechen Sie die Anwendung von Corsodyl ab und

suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie einen Hautausschlag, eine Schwellung der Lippen, der Zunge, im Hals oder im Gesicht bekommen oder wenn Sie Schwierigkeiten beim Atmen haben.

Sehr häufig (mehr als 1 von 10 Patienten): belegte Zunge

Häufig (mehr als 1 von 100 Patienten, aber weniger als 1 von 10 Patienten):

Zu Beginn der Behandlung kann eine Störung des Geschmackssinns eintreten. In einigen Fällen kann der Eindruck entstehen, die Zunge oder der Mund sei gereizt. Diese Symptome verschwinden jedoch meist im Laufe der Behandlung. Wenn die Bedingungen fortbestehen, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker aufsuchen. Zu den weiteren Reaktionen zählt Mundtrockenheit.

Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 Patienten): Es wurde auch über ungewöhnliche Verfärbung der Zähne und der Zunge, Schwellung des Mundes und der Speicheldrüsen, Ablösung der Mundschleimhaut und Hautreizungen berichtet.

Bei häufigem Gebrauch kann es zu einer bräunlichen Verfärbung der Zunge und der Zähne (einschl. Zahnfüllungen und Prothesen) kommen. In Rubrik 2 unter „Bei Anwendung von Corsodyl zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken“ lesen Sie, wie Sie dies verhindern können.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

<p>Belgien Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte Abteilung Vigilanz Postbus 97 B-1000 Brussel Madou Website: www.notifieruneffetindesirable.be E-mail: adr@fagg-afmps.be</p>	<p>Luxemburg Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance</p>
---	---

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist dieses Arzneimittel aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem Öffnen der Flausche ist das Produkt 6 Monate haltbar.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Corsodyl enthält

- Der Wirkstoff ist: Chlorhexidindigluconat.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Glycerol, Macrogolglycerol-Hydroxystearaat, Sorbitol-Flüssigkeit (nicht kristallisierend), Optamint 291616-Aroma und gereinigtes Wasser.

Wie Corsodyl aussieht und Inhalt der Packung

Mundwasser erhältlich in einer Flasche mit 300 ml und 600 ml.

Abgabe: Apothekenpflichtig

Pharmazeutischer Unternehmer und HerstellerPharmazeutischer Unternehmer

Haleon Belgium
Da Vincilaan 5
B-1930 Zaventem

Hersteller:

Omega Pharma GmbH & Co. KG
Benzstraße 25
D – 71083 Herrenberg
Deutschland

Zulassungsnummer:

BE106802
LU: 1993100178

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 11/2023