

Notice : information de l'utilisateur
CORSODYL 2mg/ml, solution pour bain de bouche
digluconate de chlorhexidine

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?:

1. Qu'est-ce que Corsodyl et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Corsodyl
3. Comment utiliser Corsodyl?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Corsodyl?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Corsodyl et dans quel cas est-il utilisé ?

- Corsodyl est une solution claire incolore au goût de menthe poivrée.
- Corsodyl contient de la digluconate de chlorhexidine. Cette substance tue la plupart des bactéries et également certains champignons.
- Corsodyl est utilisé
 - pour prévenir et combattre les dépôts dentaires
 - dans les inflammations de la gencive
 - dans les infections de la zone périphérique des dents
 - comme désinfectant lors d'interventions à proximité des dents
 - contre les aphtes et autres infections de la bouche et de la gorge.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Corsodyl?

- **N'utilisez jamais Corsodyl:** si vous êtes allergique à la digluconate de chlorhexidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Corsodyl.

- Utilisez ce médicament uniquement dans la bouche.
- Eviter tout contact du Corsodyl avec les yeux et les oreilles. Cependant, si la solution entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Eviter dans la mesure du possible les traitements prolongés.
- Corsodyl ne peut être avalé.
- Arrêter la prise de Corsodyl et consulter immédiatement un médecin en cas de rash, de gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du visage, ou de difficultés à respirer.
- Arrêter la prise de Corsodyl et signaler à votre dentiste toute douleur ou irritation de la bouche.

Enfants

Les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas utiliser le produit sauf sur recommandation d'un médecin ou d'un pharmacien.

Autres médicaments et Corsodyl

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament, même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance.

Il n'existe pas d'indication attestant que l'utilisation simultanée du Corsodyl et d'autres médicaments risque d'entraîner des problèmes.

Corsodyl avec des aliments et boissons

Des taches provisoires sur les dents ou la langue peuvent apparaître. Ces taches ne sont pas permanentes et peuvent être évitées en grande partie en réduisant la consommation d'aliments et de

boissons pouvant tacher, tels que thé, café ou vin rouge. Les taches peuvent être éliminées au brossage mais, dans certains cas, un nettoyage professionnel peut s'avérer nécessaire.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Si les instructions d'utilisation sont respectées, Corsodyl peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Corsodyl n'a pas d'effet sur la capacité de conduire un véhicule ou d'opérer des machines car il n'y a pas d'absorption par le corps, même s'il est avalé accidentellement.

3. Comment utiliser Corsodyl?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Étant donné que bon nombre de dentifrices ordinaires contiennent des substances ne pouvant être utilisées avec Corsodyl, vous devez, après le brossage des dents, vous rincer la bouche avant d'utiliser Corsodyl.

Solution pour bain de bouche:

Se rincer votre bouche deux fois par jour durant 1 minute avec environ 10 ml de la solution (= un bouchon rempli jusqu'au-trait) ou conformément aux indications du médecin/dentiste. Le produit ne doit pas être avalé et doit être craché après le rinçage d'une minute. Recraché après utilisation.

L'utilisation prolongée de Corsodyl nécessite un contrôle régulier par un médecin ou un dentiste.

Si Corsodyl est utilisé pour le traitement d'une gingivite, il est recommandé d'utiliser ce médicament pendant un mois.

Stomatite prothétique :

Nettoyer la prothèse et la tremper dans la solution pour bain de bouche pendant quinze minutes deux fois par jour.

Si vous avez utilisé plus de Corsodyl que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop de Corsodyl, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Anti-Poison (070/245-245).

Si vous oubliez d'utiliser Corsodyl

Si vous avez oublié d'utiliser Corsodyl, veuillez utiliser Corsodyl et poursuivre le traitement comme précisé dans la section « Comment utiliser Corsodyl ».

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Des cas isolés de rash, de gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du visage, ou des difficultés à respirer ont été rapportés. Ces symptômes peuvent traduire une réaction allergique sévère. Arrêtez d'utiliser Corsodyl et consultez immédiatement un médecin si vous souffrez des éruptions cutanées (urticaire), gonflement des lèvres, la langue, la gorge ou du visage ou si vous avez des difficultés à respirer (dyspnée).

Très fréquent (chez plus de 1 patient sur 10): langue chargée

Fréquent (chez plus de 1 patient sur 100, mais moins de 1 patient sur 10):

Au début du traitement, une perturbation du goût peut être éprouvée, ainsi qu'une sensation de brûlure de la langue ou de la bouche. Ces symptômes disparaissent le plus souvent si l'on poursuit le traitement. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin ou pharmacien. D'autres réactions incluent bouche sèche.

Très rare (chez moins de 1 patient sur 10.000): une coloration anormale des dents et de la langue, un gonflement de la bouche et des glandes salivaires, une desquamation des muqueuses de la bouche, et des irritations cutanées ont également été rapportés.

L'utilisation fréquente peut entraîner une coloration brunâtre de la langue et des dents (y compris des matériaux d'obturation et des prothèses). La section « Corsodyl avec des aliments ou des boissons », **dans la rubrique 2**, explique comment éviter cette coloration.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles Madou Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be E-mail: adr@afmps.be	Luxembourg Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance
--	---

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Corsodyl

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température inférieure à 25°C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Se conserve 6 mois après ouverture du flacon.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Corsodyl

- La substance active est la digluconate de chlorhexidine.
- Les autres composants sont: Glycérol, hydroxystéarate de macroglycérol, sorbitol liquide (non-cristallisant), arôme Optamint 291616 et eau purifiée.

Qu'est ce que Corsodyl et contenu de l'emballage extérieur

La solution pour bain de bouche est disponible en flacon de 300 ml et de 600 ml.

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Haleon Belgium
Da Vincilaan 5

B-1930 Zaventem

Fabricant:

Omega Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 25

D – 71083 Herrenberg

Allemagne

Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché:

BE106802

LU : 1993100178

La dernière date à laquelle cette notice a été rapprouvée est: 11/2023