

## **Notice : information du patient**

### **Amoxiclav Sandoz 500 mg/125 mg comprimés pelliculés**

#### **amoxicilline/acide clavulanique**

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### **Que contient cette notice ?:**

1. Qu'est-ce qu'Amoxiclav Sandoz et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Amoxiclav Sandoz ?
3. Comment prendre Amoxiclav Sandoz ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Amoxiclav Sandoz ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. Qu'est-ce qu'Amoxiclav Sandoz et dans quel cas est-il utilisé ?**

Amoxiclav Sandoz est un antibiotique qui agit en tuant les bactéries qui provoquent des infections. Il contient deux médicaments différents appelés amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines » dont l'activité peut parfois être arrêtée (le médicament est inactivé). L'autre composant actif (l'acide clavulanique) empêche que cela ne se produise.

Amoxiclav Sandoz est utilisé chez les adultes et les enfants pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus
- infections des voies respiratoires
- infections des voies urinaires
- infections de la peau et des tissus mous, y compris les infections dentaires
- infections osseuses et articulaires.

#### **2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Amoxiclav Sandoz ?**

##### **Ne prenez jamais Amoxiclav Sandoz**

- si vous êtes allergique à l'amoxicilline, l'acide clavulanique, la pénicilline, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6
- si vous avez déjà présenté une réaction allergique sévère à n'importe quel autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge
- si vous avez déjà eu des problèmes de foie ou une jaunisse (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

**Ne prenez pas Amoxiclav Sandoz si l'une des situations ci-dessus s'applique à votre cas.** En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Amoxiclav Sandoz.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Amoxiclav Sandoz, si vous :

- avez une mononucléose infectieuse
- êtes traité pour des problèmes au niveau du foie ou des reins
- n'urinez pas régulièrement.

Si vous n'avez pas la certitude que l'un des éléments ci-dessus s'applique à votre cas, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Amoxiclav Sandoz.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de votre infection. En fonction des résultats, vous pourrez recevoir un dosage différent d'Amoxiclav Sandoz ou un autre médicament.

### **Affections que vous devez surveiller**

Amoxiclav Sandoz peut aggraver certaines affections existantes ou provoquer des effets secondaires graves. Ces effets comportent notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Vous devez être vigilant à l'égard de certains symptômes pendant que vous prenez Amoxiclav Sandoz, afin de réduire le risque de certains problèmes. Voir '*Affections que vous devez surveiller*' à la **Rubrique 4**.

### **Tests sanguins et urinaires**

Si vous subissez des tests sanguins (tels que des tests du nombre de globules rouges ou des tests fonctionnels hépatiques) ou des tests urinaires (pour le glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmier(ère) que vous prenez Amoxiclav Sandoz. En effet, Amoxiclav Sandoz peut influencer les résultats de ces types de tests.

### **Autres médicaments et Amoxiclav Sandoz**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Si vous prenez de l'**allopurinol** (pour le traitement de la goutte) avec Amoxiclav Sandoz, vous risquez davantage de présenter une réaction cutanée allergique.

Si vous prenez du **probénécide** (utilisé dans le traitement de la goutte), l'utilisation concomitante de probénécide peut réduire l'excrétion de l'amoxicilline et n'est pas recommandée.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la **warfarine**) sont pris avec Amoxiclav Sandoz, des tests sanguins supplémentaires peuvent être nécessaires.

**Méthotrexate** (utilisé dans le traitement de cancer et du psoriasis sévère), les pénicillines peuvent réduire l'excrétion du méthotrexate entraînant une possible augmentation des effets indésirables.

Amoxiclav Sandoz peut affecter la manière dont agit le **mycophénolate mofétil** (un médicament utilisé pour prévenir le rejet d'un organe greffé).

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Amoxiclav Sandoz peut avoir des effets indésirables, et les symptômes peuvent vous rendre inapte à la

conduite.

Ne conduisez pas de véhicule ou n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

### **3. Comment prendre Amoxiclav Sandoz ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### **Adultes et enfants pesant 40 kg et plus**

La dose recommandée est de:

- 1 comprimé trois fois par jour

#### **Enfants pesant moins de 40 kg**

Les enfants âgés de 6 ans ou moins doivent de préférence être traités avec Amoxiclav Sandoz suspension buvable ou sachets.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien lorsque vous donnez des comprimés d'Amoxiclav Sandoz à des enfants pesant moins de 40 kg. Les comprimés ne sont pas adaptés pour les enfants pesant moins de 25 kg.

#### **Patients avec problèmes rénaux et hépatiques**

- Si vous avez des problèmes rénaux, la dose pourrait être modifiée. Votre médecin pourra choisir un dosage différent ou un autre médicament.
- Si vous avez des problèmes de foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront être réalisées pour vérifier comment fonctionne votre foie.

#### **Comment prendre Amoxiclav Sandoz**

- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau au cours d'un repas.
- Répartissez les prises de manière uniforme sur la journée, à intervalles d'au moins 4 heures. Ne prenez pas 2 doses en 1 heure.
- Ne prenez pas Amoxiclav Sandoz pendant plus de 2 semaines. Si vous ne vous sentez toujours pas bien, retournez voir votre médecin.

#### **Si vous avez pris plus d'Amoxiclav Sandoz que vous n'auriez dû**

Si vous prenez trop d'Amoxiclav Sandoz, les signes pourraient comporter une irritation gastrique (nausées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en à votre médecin dès que possible. Prenez la boîte ou le flacon de médicament pour la/le montrer au médecin.

Si vous avez pris trop d'Amoxiclav Sandoz, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

#### **Si vous oubliez de prendre Amoxiclav Sandoz**

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Vous ne devez pas prendre la dose suivante trop tôt, mais attendre environ 4 heures avant de la prendre. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### **Si vous arrêtez de prendre Amoxiclav Sandoz**

Continuez à prendre Amoxiclav Sandoz jusqu'à la fin du traitement, même si vous vous sentez mieux. Vous avez besoin de chaque dose pour vous aider à combattre l'infection. Si certaines bactéries survivent, elles peuvent provoquer une réapparition de l'infection.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

##### Réactions nécessitant une attention particulière

###### Réactions allergiques

- éruption cutanée
- inflammation des vaisseaux sanguins (*vascularite*) pouvant apparaître sous la forme de taches rouges ou violettes sur la peau, mais pouvant également toucher d'autres parties du corps
- fièvre, douleurs articulaires, ganglions dans le cou, l'aisselle et l'aîne
- gonflement, parfois du visage ou au niveau de la gorge (*angio-œdème*), entraînant des difficultés respiratoires
- malaise brutal avec chute de la pression artérielle
- douleurs thoraciques dans un contexte de réactions allergiques, qui peuvent être le symptôme d'un infarctus du myocarde déclenché par une allergie (syndrome de Kounis)

Si vous présentez un de ces symptômes, **contactez un médecin immédiatement. Arrêtez de prendre Amoxiclav Sandoz.**

###### Inflammation du gros intestin

Inflammation du gros intestin, entraînant une diarrhée aqueuse généralement avec du sang et du mucus, des douleurs gastriques et/ou une fièvre.

###### Inflammation aiguë du pancréas (pancréatite aiguë)

Si vous ressentez une douleur intense et continue au niveau de l'estomac, cela peut être un signe de pancréatite aiguë.

###### Syndrome d'entérocologie induite par les médicaments (SEIM)

Le SEIM a été rapporté principalement chez des enfants recevant de l'amoxicilline/acide clavulanique. Il s'agit d'un certain type de réaction allergique avec comme principal symptôme des vomissements répétés (1 à 4 heures après l'administration du médicament). Les autres symptômes peuvent inclure des douleurs abdominales, une léthargie, des diarrhées et une tension artérielle basse.

Si vous présentez ces symptômes, **demandez conseil le plus tôt possible à votre médecin.**

###### Effets indésirables très fréquents (peuvent toucher plus de 1 personne sur 10)

- diarrhée (chez l'adulte).

###### Effets indésirables fréquents (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

- muguet (*candida* - infection à champignons du vagin, de la bouche ou des plis cutanés)
- nausées, en particulier lors de prise de doses élevées. Si vous présentez cet effet indésirable, prenez Amoxiclav Sandoz au cours d'un repas.
- vomissements
- diarrhée (chez l'enfant).

###### Effets indésirables peu fréquents (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

- éruption cutanée, démangeaisons
- éruption prurigineuse surélevée (*urticatoire*)
- indigestion
- étourdissements
- maux de tête.

Effets indésirables peu fréquents qui peuvent se manifester dans vos tests sanguins :

- augmentation de certaines substances (*enzymes*) produites par le foie.

**Effets indésirables rares** (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 1000)

- éruption cutanée, pouvant former des vésicules et ressemblant à de petites cibles (points noirs centraux entourés d'une zone plus pâle, avec un anneau foncé autour du bord – *érythème polymorphe*).

Si vous remarquez l'un de ces symptômes, contactez un médecin de toute urgence.

Effets indésirables rares qui peuvent se manifester dans vos tests sanguins :

- faible nombre de cellules impliquées dans la coagulation du sang
- faible nombre de globules blancs

**Fréquence indéterminée** (la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

D'autres effets indésirables se sont produits chez un très petit nombre de personnes, mais leur fréquence exacte est inconnue.

- Réactions allergiques (voir ci-dessus)
- Inflammation du gros intestin (voir ci-dessus)
- Cristaux dans les urines entraînant des lésions rénales aiguës
- Éruption cutanée avec des cloques disposées en cercle et des croûtes au niveau du centre ou ayant un aspect de collier de perles (dermatose à IgA linéaire)
- Inflammation des membranes protectrices enveloppant le cerveau (*méningite aseptique*)
- Réactions cutanées graves :
  - éruption cutanée étendue avec vésicules et desquamation de la peau, en particulier autour de la bouche, du nez, des yeux et des organes génitaux (*syndrome de Stevens-Johnson*), et une forme plus sévère, provoquant un décollement important de la peau (plus de 30 % de la surface corporelle : *nécrolyse épidermique toxique*)
  - éruption cutanée rouge étendue avec de petites vésicules contenant du pus (*dermatite bulleuse exfoliative*)
  - éruption squameuse rouge avec élévations sous la peau et vésicules (*pustulose exanthématique*)
  - symptômes de type grippal accompagnés d'une éruption cutanée, de fièvre, de ganglions enflés, et de résultats anormaux des tests sanguins [dont une augmentation des globules blancs (éosinophilie) et des enzymes hépatiques [syndromes d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS)].

**Contactez un médecin immédiatement si vous présentez l'un de ces symptômes.**

- inflammation du foie (*hépatite*)
- jaunisse, provoquée par des augmentations du taux sanguin de bilirubine (une substance produite dans le foie), qui peut donner une coloration jaune au niveau de votre peau et du blanc de vos yeux
- inflammation des tubules dans le rein
- le sang met plus de temps à coaguler
- hyperactivité
- convulsions (chez les personnes prenant des doses élevées d'Amoxiclav Sandoz ou ayant des problèmes rénaux)
- langue noire qui semble recouverte de poils

Effets indésirables qui peuvent se manifester dans les tests sanguins ou urinaires:

- réduction sévère du nombre de globules blancs
- diminution du nombre de globules rouges (*anémie hémolytique*)

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence fédérale des médicaments

et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, 1000 BRUXELLES Madou, Site internet : [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be), e-mail : [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. Comment conserver Amoxiclav Sandoz ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et la boîte après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

### Ce que contient Amoxiclav Sandoz

- Les substances actives sont l'amoxicilline et l'acide clavulanique. Chaque comprimé pelliculé contient 500 mg d'amoxicilline et 125 mg d'acide clavulanique.
- Les autres composants sont stéarate de magnésium, talc, povidone K25, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, citrate de triéthyle, hypromellose, éthylcellulose, laurylsulfate de sodium, alcool cétylique, dioxyde de titane (E 171).

### Aspect d'Amoxiclav Sandoz et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés pelliculés sont blanc cassé, ovales, biconvexes et rainurés sur les deux faces.

### Contenu de l'emballage :

Bandes scellées en feuille d'aluminium revêtues de polyéthylène.

### Tailles d'emballages :

Emballage simple de 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 36, 100x1 comprimés pelliculés

Emballage hospitalier de 100 comprimés pelliculés

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

*Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché*

Sandoz nv/sa, Telecom Gardens, Medialaan 40, B-1800 Vilvorde

### *Fabricant*

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Autriche

### Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché

BE209063

### Mode de délivrance

Sur prescription médicale.

**Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :**

AT	Curam 625 mg – Filmtabletten
BE	Amoxiclav Sandoz 500 mg/125 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten
DE	Bioclavid 500/125 mg Filmtabletten
DK	Bioclavid
FI	Bioclavid 500 mg/125 mg kalvopäällysteinen tabletti
GR	Bioclavid (500+125) mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
NL	AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR SANDOZ TABLET 500/125, filmomhulde tabletten 500/125 mg
PT	Amoxicilina + Ácido Clavulânico Sandoz 500 mg + 125 mg Comprimidos revestidos

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 04/2023.**

### **Conseils/éducation médicale**

Les antibiotiques sont utilisés pour traiter des infections provoquées par des bactéries. Ils n'ont aucun effet contre les infections provoquées par des virus.

Parfois, une infection provoquée par des bactéries ne répond pas à une cure d'un antibiotique. L'une des principales raisons pour lesquelles cela se produit est que les bactéries responsables de l'infection sont résistantes à l'antibiotique pris. Cela signifie qu'elles peuvent survivre et même se multiplier malgré l'antibiotique.

Les bactéries peuvent devenir résistantes aux antibiotiques pour de nombreuses raisons. Une utilisation prudente des antibiotiques peut contribuer à réduire le risque que les bactéries n'y deviennent résistantes.

Lorsque votre médecin prescrit une cure d'antibiotique, cette cure est destinée à traiter uniquement votre maladie actuelle. Si vous respectez les conseils suivants, cela aidera à empêcher le développement de bactéries résistantes qui pourraient empêcher l'antibiotique d'agir.

1. Il est très important que vous preniez l'antibiotique à la bonne dose, aux bonnes heures et pendant le bon nombre de jours. Lisez les instructions figurant sur l'étiquette et, si quelque chose ne vous paraît pas clair, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous l'expliquer.
2. Vous ne devez prendre un antibiotique que s'il vous a été prescrit spécifiquement, et vous devez l'utiliser uniquement pour traiter l'infection pour laquelle il a été prescrit.
3. Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques qui ont été prescrits à d'autres personnes, même si elles ont eu une infection similaire à la vôtre.
4. Vous ne devez pas donner à d'autres personnes des antibiotiques qui vous ont été prescrits.
5. S'il vous reste un quelconque antibiotique après avoir pris votre traitement selon les instructions de votre médecin, vous devez ramener les médicaments restants à une pharmacie afin qu'ils puissent être éliminés de manière appropriée.