

**B. PACKUNGSBEILAGE**

KENNZEICHNUNG  
AVICAS®

- 1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**  
Registrierungsinhaber: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, 9800 Deinze.  
Hersteller: Qualiphar Laboratoria, Rijksweg 9, 2880 Bornem
- 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**  
Avicas®
- 3. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**  
EinenTablette enthält: Febantel 15 mg - Cellulos microcristall. - Sod. Starch Glycoll. - Polysorb. - Polyvidon. - Silic. colloid. anhydr. - Magn. stear. - Lactose q.s. ad 105 mg.
- 4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**  
Behandlung von Wurminfektionen bei Tauben von *Ascaridia colombae* (Spulwurm) und *Capillaria* spp. (Haarwurm).
- 5. GEGENANZEIGEN**  
Nicht behandeln während der Mauser und nicht anwenden bei Tauben, die ihre Jungen füttern.  
Nur zu verwenden bei Tauben die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
- 6. NEBENWIRKUNGEN**  
Keine Nebenwirkungen bei therapeutischer Dosierung.
- 7. ZIELTIERART(EN)**  
Tauben, die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
- 8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**  
Dosierung: 30 mg/kg. Das stimmt überein mit 1 Tablette pro Taube unmittelbar in den Schnabel. 8 Tage später nochmals wiederholen.  
Bei schwerem *Capillaria* Befall: 2 aufeinanderfolgende Tage behandeln und 1 Woche später nochmals 2 Tage.
- 9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**  
Orale Verabreichung. 1 Tablette pro Taube unmittelbar in den Schnabel.
- 10. WARTEZEIT**  
Nur zu verwenden bei Tauben die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.  
Der Verzehr von Tauben behandelt mit Avicas kann Probleme für die Gesundheit des Konsumenten verursachen.
- 11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**  
Bei Zimmertemperatur lagern (15 - 25°C).  
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- 12. BESONDERE WARNHINWEISE**  
Bei Infektion alle Tauben im Schlag zusammen behandeln. Nach der Behandlung den Schlag gut säubern, um Reinfektion zu vermeiden.  
Zum heute is keinen nachteiligen Einfluß von Febantel auf die Fortpflanzung festgelegt.  
Eine häufige und wiederholte Anwendung kann zu einer Resistenz führen.

Der Verzehr von Tauben behandelt mit Avicas kann Probleme für die Gesundheit des Konsumenten verursachen.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Man soll die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen nehmen, so daß nicht-angewendete-Produkten nicht in die Umwelt hinkommen.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

02/2012

**15. WEITERE ANGABEN**

Tierärztliche Verwendung  
Rezeptfreie Abgabe

BE-V168323