

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

### NORIT CARBOMIX, 50 g Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

*Aktivkohle*

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Norit Carbomix und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Norit Carbomix beachten?
3. Wie ist Norit Carbomix einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Norit Carbomix aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Norit Carbomix und wofür wird es angewendet?**

Norit Carbomix enthält Aktivkohle Diese wird Schadstoffen im Magen-Darmkanal binden und auf dieser Weise abführen.

Norit Carbomix wird gebraucht als Hilfsmittel bei der Behandlung von Vergiftungen und bei Durchfallsymptome. Manchmal wird Norit Carbomix in Form einer Magenspülung verabreicht. Dies erfolgt meistens im Krankenhaus.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von norit carbomix beachten?**

##### **Norit Carbomix darf nicht eingenommen werden**

- wenn Sie allergisch gegen Aktivkohle oder einen der in Abschnitt 6. sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittel sind;
- bei Vergiftungen (verursacht) durch **starke Säuren, Basen oder Erdöhlaltige** Stoffen;
- unmittelbar vor einer inner **Untersuchung der Speiseröhre oder der Magen** (Endoskopie);
- nicht gebrauchen bei Patienten mit **vermindertem Bewusstsein** oder **Schluckschwierigkeiten** wegen des Risikos des Ansaugens von Norit Carbomix in die Lunge.

## Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Norit Carbomix ist erforderlich:

- Wenn Sie noch andere Arzneimittel oder orale Antikonzeptiva nehmen sollten sie auch die Rubrik: „Einnahme von Norit Carbomix zusammen mit anderen Arzneimittel“ lesen.
- Wenn bei Vergiftung auch ein **anderes Gegengift** durch den Mund verabreicht werden muß, sollten Sie kein Norit Carbomix verwenden.
- Norit Carbomix in sehr hohen Dosen kann sich mit Verdauungsenzymen und Vitaminen verbinden, was manchmal zu **Verdauungsproblemen** und zum **Vitaminmangel** führen kann.
- Norit Carbomix fleckt Kleidung.
- Bitte sprechen Sie Ihren Arzt bevor Sie Norit Carbomix anwenden

### Einnahme von Norit Carbomix zusammen mit anderen Arzneimitteln

Norit Carbomix kann im Darm eine Menge Stoffe an sich binden. Hierdurch können auch Medikamente gebunden und mit dem Stuhlgang mit ausgetrieben werden. Auf dieser Weise wird eine ungenügende Menge Arzneimittel aufgenommen und kann die Wirkung beeinträchtigt werden.

Nachstehende Produkte können mit Norit Carbomix verbunden werden: manche **Antibiotika, Blutgerinnungsmittel, Brechmittel**.

- Die Wirkung oraler Antikontrazeptiva (“**die Pille**“) kann bei gleichzeitiger Verabreichung von Aktivkohle gestört werden. Darum sollte man während der Behandlung mit Norit nach einer anderen und verlässlichen Verhütungsmethode vorgehen.**Aspirin** (Schmerzmittel und Blutverdünner) und **Furosemid** (urineproduktions fördernd Mittel) können sich auch an Norit binden. Eine Dosisanpassung kann nötig sein.

**Fenytoin** und **Carbamazepin** (beide gebraucht bei Fallsucht (Epilepsie) binden sich auch an Norit Carbomix. Bei gleichzeitiger Therapie müssen die Gehalte dieser Arzneimittel kontrolliert werden. Eine Dosisanpassung kann nötig sein.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.,

### Einnahme von Norit Carbomix zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Norit Carbomix kann Verdauungsenzymen und Vitaminen binden wenn es in sehr hohen Dosen verabreicht wird. Dies kann mitunter Anlaß geben zu Verdauungsschwierigkeiten und Vitaminmangel.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Norit Carbomix kann, insofern bekannt, während der Schwangerschaft und Stillzeit problemlos genommen werden.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

## 3. Wie ist Norit Carbomix einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apotheker in. ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn keine Besserung auftritt nach 7 Tagen, sollten Sie wiederum Ihren Arzt fragen um Rat.

Nehmen Sie Norit Carbomix immer durch den Mund ein.

*Bereitung der Suspension:*

Füllen Sie die Flasche mit Wasser bis zur roten Marke (ungefähr 300 ml Wasser) und schütteln Sie die abgeschlossen Flasche kräftig während einer Minute. Die Flasche vorsichtig öffnen.

Die übliche Dosis:

	<b>Dose</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Durchfall</b>	2,5 g bis 3,5 g pro Tag.	Bei ernster Diarrhö muß das Flüssigkeitsgleichgewicht wiederhergestellt werden.  Der Arzt kann dies erreichen indem er Ihnen Salzlösungen einspritzt.
<b>Vergiftungen</b>	- <u>Erwachsenen:</u> - <b>1 bis 2 Flaschen</b> Norit Carbomix (dies entspricht 50 bis 100 g Aktivkohle) bald möglichenfalls verabreichen Bei bestimmtes ernste Vergiftungen wird jede 4 bis 6 Stunden noch 20 g verabreicht. - <u>Kinder:</u> 1 g Aktivkohle/kg Körpergewicht	Diese Dosis ist eine vorgeschlagene Dosis. Befolgen Sie immer ganz genau die Hinweise Ihres Arztes.  Nach der Einnahme von Norit Carbomix könnte der Arzt Eine Magenspülung durchführen oder Norit Carbomix suspension durch eine Magensonde verabreichen.

**Wenn Sie eine größere Menge von Norit Carbomix eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie eine größere Menge von Norit Carbomix haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antifizentrum (070/245.245).

**Wenn Sie die Einnahme von Norit Carbomix vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

**Wenn Sie die Einnahme von Norit Carbomix abbrechen**

Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe werden Nebenwirkungen nach abnehmender Schwere gereiht: sehr häufig ( $\geq 1/10$ ); häufig ( $\geq 1/100, < 1/10$ ); gelegentlich ( $\geq 1/1.000, < 1/100$ ); selten ( $\geq 1/10.000, < 1/1.000$ ); sehr selten ( $< 1/10.000$ ), nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Flüssigkeits- und Elektrolytstörungen könnten vorkommen.

#### Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums

Ansaugung in die Lunge können gelegentlich auftreten. (siehe auch Rubrik "Norit Carbomix darf nicht eingenommen werden?")

#### Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

*Sehr häufig:* schwarzer Stuhlgang, was keinen schädlichen Einfluss hat.

*Häufig:* Brechen und Verstopfung.

*Gelegentlich:* Magen- und Darm Obstruktion

*Sehr selten:* akute Blinddarmentzündung.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Abteilung Vigilanz, Avenue Galilée - Galileelaan 5/03, 1210 Brüssel, Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be), E-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Norit Carbomix aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Die Suspension ist maximal 3 Tagen Haltbar im Kühlschrank bei ca. 6°C.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf den Packung nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Sie dürfen Norit Carbomix nicht verwenden, wenn Sie Folgendes bemerken: dass das Granulat verfärbt ist.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was Norit Carbomix enthält**

- Der Wirkstoff ist Aktivkohle.
- Die sonstigen Bestandteile sind Zitronensäure, Arabisches Gummi, Glycerin.

##### **Wie Norit Carbomix aussieht und Inhalt der Packung**

Norit Carbomix, 50 g Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen:  
Flasche von 500ml mit 61,5 g Granulat.

##### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

###### *Pharmazeutischer Unternehmer*

KELA pharma nv  
Sint Lenaartseweg 48  
B-2320 Hoogstraten

###### *Hersteller*

Cabot Norit Nederland B.V.

Mr. Ovingkanaal O.Z.3  
NL- 7891 EV Klazienaveen

**Zulassungsnummer**

Norit Carbomix, 50 g Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen:  
Flasche: BE084874

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte  
in Verbindung mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

**Ausgabe**

Freie Abgabe

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 08/2021.**