

Notice : information de l'utilisateur
NORIT CARBOMIX 50 g, granulés pour suspension buvable
Charbon activé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 de jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que Norit Carbomix et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Norit Carbomix ?
3. Comment prendre Norit Carbomix ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Norit Carbomix ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Norit Carbomix et dans quel cas est-il utilisé ?

Norit contient du charbon activé. Celui-ci liera les produits nocifs dans le tube digestif et les éliminera de cette manière.

Norit Carbomix est utilisé comme thérapeutique d'appoint dans le traitement des intoxications et des symptômes de la diarrhée. Parfois Norit Carbomix est administré sous forme d'un lavage gastrique. Ceci se passe généralement en clinique.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 de jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Norit Carbomix ?

Ne prenez jamais Norit Carbomix

- si vous êtes **allergique** au charbon activé ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6;
- lors d'intoxications (provoquées) par **des bases, acides fortes** ou des dérivés du **pétrole**;
- juste avant un **examen interne de l'œsophage ou de l'estomac** (endoscopie);
- chez des patients à **conscience réduite** ou avec **des problèmes de déglutition** à cause du risque d'aspiration du Norit Carbomix dans les poumons.

Avertissements et précautions

Faites attention avec Norit Carbomix :

- Si vous prenez déjà d'autres médicaments ou avec des contraceptifs oraux, veuillez lire également la rubrique "Autres médicaments et Norit".

- Si un **autre antidote oral** doit être administré en cas d'intoxication, n'utilisez pas Norit Carbomix.
- A très haute dose, Norit Carbomix peut fixer des enzymes digestifs et des vitamines quand il est donné à de très fortes doses. Ceci peut parfois provoquer **des troubles digestifs et une carence en vitamines**.
- Norit Carbomix tache les vêtements.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Norit Carbomix.

Autres médicaments et Norit

Dans les intestins Norit Carbomix peut se fixer à toute une série de produits. En conséquence des médicaments peuvent, eux aussi, être fixés et évacués avec la défécation. De cette façon, le médicament peut être résorbé insuffisamment et l'action de ce médicament peut diminuer.

- Les produits suivants peuvent être fixés par Norit Carbomix : certains **antibiotiques, les anticoagulants, les médicaments vomitifs**.
- L'activité des contraceptifs oraux ("**la pilule**") peut être perturbée par l'usage simultané du Norit Carbomix. C'est pour cela qu'on doit utiliser, au cours du traitement, un autre moyen anticonceptionnel fiable.
- **Aspirine** (un antidouleur et un anticoagulant) et **furosémide** (un diurétique) peuvent également se lier au Norit Carbomix. Une adaptation du dosage peut être nécessaire.
- **Phénytoïne** et **carbamazépine** (les deux utilisés en cas d'épilepsie) se lient aussi au Norit Carbomix. En cas de thérapie concomitante la concentration de ces médicaments dans le sang doit être contrôlée. Une adaptation du dosage peut être nécessaire.

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez tout autre médicament.

Norit Carbomix avec des aliments et boissons

A très haute dose, Norit Carbomix peut fixer des enzymes digestifs et des vitamines. Cela peut parfois provoquer des troubles digestifs et une carence en vitamines.

Grossesse et allaitement

Norit Carbomix peut, d'après les données dont on dispose, être utilisé sans inconvénient pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Sans objet.

3. Comment prendre Norit Carbomix ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien ou en cas de doute.

S'il n'apparaît pas d'amélioration après 7 jours contactez votre médecin.

Prenez Norit Carbomix toujours par la bouche

Préparation de la suspension :

Remplir le flacon jusqu'à la ligne rouge avec de l'eau (ca 300 ml d'eau) et agiter la bouteille fermée énergiquement pendant une minute. Ouvrir le flacon avec précaution.

Le dosage habituel

	Le dosage	Remarques
Diarrhée	2,5 g jusqu'à 3,5 g par jour.	En cas de diarrhée aiguë l'équilibre hydroélectrique doit être rétabli. Ceci peut être fait par le médecin qui vous injectera des sels minéraux.
Les intoxications	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Adultes :</u> 1 à 2 bouteilles Norit Carbomix (ceci est 50 à 100 g de charbon activé) administrez aussi vite que possible. Chez certaines intoxications sévères des doses de 20 g toutes les 4 à 6 heures sont administrés en surplus. - <u>Enfants :</u> 1 g/kg de poids corporel. 	<p>Cette dose est une dose indicative. Suivez toujours scrupuleusement les indications du médecin.</p> <p>Après la prise de Norit Carbomix le médecin peut éventuellement procéder à un rinçage gastrique ou administrer le Norit Carbomix suspension par sonde gastrique.</p>

Si vous avez pris plus de Norit Carbomix que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop de Norit Carbomix, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Norit Carbomix

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Norit Carbomix

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Norit Carbomix peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Au sein de chaque fréquence de groupe, les effets indésirables doivent être présentés suivant un ordre décroissant de gravité : très fréquent ($\geq 1/10$); fréquent ($\geq 1/100$, $< 1/10$); peu fréquent ($\geq 1/1\ 000$, $< 1/100$); rare ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1\ 000$); très rare ($< 1/10\ 000$), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Des troubles de liquide et d'électrolytes peuvent survenir.

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

Une aspiration pulmonaire peut survenir. (Voir la rubrique "Ne prenez jamais Norit Carbomix")

Affections gastro-intestinales

Très fréquent : une coloration noire des selles, ceci n'a aucun effet nuisible.

Fréquent : vomissement et constipation.

Peu fréquent : une obstruction de l'estomac.

Très rare : une appendicite aiguë.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, www.afmps.be, Division Vigilance : site internet: www.notifieruneffetindesirable.be, e-mail: adr@fagg-afmps.be.

Luxembourg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé, Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Norit Carbomix ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

La suspension se conserve au maximum 3 jours en glacière à 6°C environ.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que la poudre est décolorée.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Norit Carbomix ?

- La substance active est le charbon activé.
- Les autres composants sont acide citrique, gomme arabique, glycérol.

Aspect de Norit Carbomix et contenu de l'emballage extérieur

Norit Carbomix 50 g, granulés pour suspension buvable : flacon de 500 ml avec 61,5 g de granulé.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Ceres Pharmaceuticals NV
Kortrijksesteenweg 1091 bus B
B-9051 Sint-Denijs-Westrem

Fabricant

Norit Nederland B.V.
Mr. Ovingkanaal O.Z.3
NL-7891 EV Klazienaveen

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

Norit Carbomix, 50 g, granulés pour suspension buvable (flacon) :

BE : BE084874
LU : 2008069823

Pour toute information concernant ce médicament prenez contact avec votre médecin ou pharmacien.

Conditions de prescription et de délivrance

Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 07/2025.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 07/2025.